

# 6ο Εργαστήριο

Για την αριθμητική επίλυση ενός προβλήματος αρχικών τιμών (Π.Α.Τ.)

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad t \in [a, b], \quad y(0) = y_0$$

Θεωρήσαμε πεπλεγμένες μονοβηματικές μεθόδους όπως η πεπλεγμένη Euler ή Τραπεζίου.

Σε προηγούμενο εργαστήριο είδαμε ότι για να υπολογίσουμε την τιμή  $y_{n+1}$  χρειάζεται να λύσουμε (στη γενική περίπτωση που η  $f$  είναι μη γραμμική ως προς  $y$ ) μια μη γραμμική εξίσωση. Ένας τρόπος είναι χρησιμοποιήσουμε μια επαναληπτική διαδικασία όπως στον υπολογισμό του σταθερού σημείου. Έτσι, σε κάθε βήμα του αλγορίθμου της πεπλεγμένης Euler, για τον υπολογισμό δηλαδή του  $y_{n+1}$  θέτουμε

$$g(s) = y_n + hf(t_{n+1}, s),$$

και αναζητούμε  $s^*$  τέτοιο ώστε

$$s^* = g(s^*).$$

Επειδή μπορούμε μόνο να προσεγγίσουμε το  $s^*$ , την προσέγγιση  $s_k$  που θα υπολογίσουμε χρησιμοποιώντας την επαναληπτική διαδικασία του σταθερού σημείου, θα θέσουμε ως  $y_{n+1}$ , δηλαδή θεωρούμε την ακολουθία

$$s_{k+1} = g(s_k), \quad k = 0, \dots,$$

για δοσμένο  $tol$ , υπολογίζουμε το  $s_k$  τέτοιο ώστε  $|s_k - s_{k-1}| \leq tol$  και θέτουμε

$$y_{n+1} = s_k$$

και προχωράμε για την επόμενη προσέγγιση της μεθόδου πεπεπλεγμένης Euler.

Την ίδια διαδικασία μπορούμε να εφαρμόσουμε και για πολυβηματικές μεθόδους. Θεωρείστε τη μέθοδο Adams Multon(2) και τη BDF(2)

**Μέθοδος Adams Multon(2)** Για δοσμένα  $y_0, y_1$ ,

$$y_{n+2} = y_{n+1} + h\left(\frac{5}{12}f(t_{n+2}, y_{n+2}) + \frac{2}{3}f(t_{n+1}, y_{n+1}) - \frac{1}{12}f(t_n, y_n)\right), \quad n = 0, \dots, N -$$

**Μέθοδος BDF(2)** Για δοσμένα  $y_0, y_1$ ,

$$y_{n+2} - \frac{4}{3}y_{n+1} + \frac{1}{3}y_n = \frac{2}{3}hf(t_{n+2}, y_{n+2}), \quad n = 0, \dots, N - 2.$$

**Άσκηση 1:** Έστω  $y(t) = (t^2 + 1)^2$ , στο  $[0, 2]$  η οποία είναι λύση στο

$$y'(t) = 4t(y(t))^{1/2}, \quad t \in [0, 2], \quad y(0) = 1.$$

Θεωρείστε τις μεθόδους Adams Multon(2) και τη BDF(2), ένα διαμερισμό του  $[0, 2]$  σε  $N + 1$  σημεία, και για να υλοποιήσετε αυτές τις δύο μεθόδους χρησιμοποιήστε τις

αρχικές τιμές  $y_0 = 1$  και  $y_1$  να δίνεται από την άμεση μέθοδο του Euler. Βρείτε το σφάλμα  $\max_{0 \leq n \leq N} |y_n - y(t_n)|$ , για  $N = 20, 40, 80, 160$  καθώς και τις τιμές για  $t = 0.5, 1, 1.5, 2$ . Παρατηρήστε ότι καθώς το  $N$  αυξάνει ή το  $h$  ελαττώνετε οι τιμές  $y_n$

τείνουν να σταθεροποιηθούν. (Δηλαδή η μέθοδος φαίνεται να συγκλίνει)

**Άσκηση 2:** Έστω  $y(t) = (t^2 + 1)^2$ , στο  $[0, 2]$  η οποία είναι λύση στο

$$y'(t) = 4t(y(t))^{1/2}, \quad t \in [0, 2], \quad y(0) = 1.$$

Θεωρείστε τη ακόλουθη 2-βηματική μέθοδο:

Για δοσμένα  $y_0, y_1$ ,

$$y_{n+2} - y_{n+1} = \frac{h}{12}(4f(t_{n+2}, y_{n+2}) + 8f(t_{n+1}, y_{n+1}) - f(t_n, y_n)), \quad n = 0, \dots, N-2.$$

Θεωρήστε ένα διαμερισμό του  $[0, 2]$  σε  $N + 1$  σημεία, και για να υλοποιήσετε αυτές τις δύο μεθόδους χρησιμοποιήστε τις αρχικές τιμές  $y_0 = 1$  και  $y_1$  να δίνεται από την άμεση μέθοδο του Euler. Βρείτε το σφάλμα  $\max_{0 \leq n \leq N} |y_n - y(t_n)|$ , για  $N = 20, 40, 80, 160$  καθώς και τις προσεγγίσεις για  $t = 0.5, 1, 1.5, 2$ . Παρατηρήστε ότι καθώς το  $N$  αυξάνει ή το  $h$  ελαττώνετε οι τιμές  $y_n$  τείνουν να σταθεροποιηθούν. (Δηλαδή η μέθοδος φαίνεται να συγκλίνει), όμως το σφάλμα δεν μειώνεται!

**Άσκηση 3:** Θεωρείστε τις προσεγγίσεις  $y_n$  που προκύπτουν στην προηγούμενη Άσκηση

2, και τη συνάρτηση  $\tilde{y}(t) = (\frac{11}{12}t^2 + 1)^2$ . Υπολογίστε τα σφάλματα

$\max_{0 \leq n \leq N} |y_n - \tilde{y}(t_n)|$ , για  $N = 20, 40, 80, 160$ . Τείνουν αυτά στο 0;

**Παρατήρηση για τις Ασκήσεις 2 και 3:** Η μέθοδος που θεωρήσαμε στην Άσκηση 2, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι είναι ευσταθής αλλά όχι συνεπής (ελέγχουμε αν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά πολυώνυμα ικανοποιούν τις απαραίτητες συνθήκες).

Επομένως σύμφωνα με τη θεωρία βλέπουμε ότι δεν είναι συγκλίνουσα και άρα οι προσεγγίσεις  $y_n$  για το ΠΑΤ της Άσκησης 2 δεν θα συγκλίνουν στην λύση του ΠΑΤ  $y(t)$ , αλλά σε μία άλλη συνάρτηση την  $\tilde{y}(t)$ . Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η  $\tilde{y}$  είναι λύση του ΠΑΤ

$$y'(t) = \frac{11}{12}4t(y(t))^{1/2}, \quad t \in [0, 2], \quad y(0) = 1.$$

Δηλαδή οι προσεγγίσεις που παίρνουμε με μια μη συνεπή λύση οδηγούν στη λύση ενός άλλου προβλήματος από αυτό που θέλουμε να λύσουμε!

**Άσκηση 4:** Έστω  $y(t) = e^{-10t}$ , στο  $[0, 2]$  η οποία είναι λύση στο

$$y'(t) = -10y(t), \quad t \in [0, 2], \quad y(0) = 1.$$

Θεωρείστε τη ακόλουθη μέθοδο:

Για δοσμένα  $y_0, y_1$ ,

$$y_{n+2} + y_{n+1} - 2y_n = \frac{h}{4}(f(t_{n+2}, y_{n+2}) + 8f(t_{n+1}, y_{n+1}) + 3f(t_n, y_n)), \quad n = 0, \dots, N$$

Θεωρήστε ένα διαμερισμό του  $[0, 2]$  σε  $N + 1$  σημεία, και για να υλοποιήσετε αυτές τις δύο μεθόδους χρησιμοποιήστε τις αρχικές τιμές  $y_0 = 1$  και  $y_1$  να δίνεται από την άμεση μέθοδο του Euler. Βρείτε το σφάλμα  $\max_{0 \leq n \leq N} |y_n - y(t_n)|$ , για  $N = 20, 40, 80, 160$

καθώς και τις προσεγγίσεις για  $t = 0.5, 1, 1.5, 2$ . Παρατηρήστε ότι καθώς το  $N$  αυξάνει ή το  $h$  ελαττώνετε, οι τιμές  $y_n$  γίνονται πολύ μεγάλες. (Δηλαδή η μέθοδος φαίνεται να αποκλίνει και να είναι ασταθής).

**Παρατήρηση:** Η μέθοδος που θεωρήσαμε, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι ευσταθής αλλά είναι συνεπής. Επομένως βλέπουμε ότι δεν είναι συγκλίνουσα και άρα οι προσεγγίσεις  $y_n$  για το ΠΑΤ της άσκησης δεν θα συγκλίνουν στην λύση του ΠΑΤ  $y(t)$ .

## Συστήματα Διαφορικών εξισώσεων

Θεωρούμε τώρα το ακόλουθο σύστημα διαφορικών εξισώσεων

$$x'(t) = \frac{5}{100}x(t)\left(1 - \frac{1}{100}y(t)\right), \quad y'(t) = \frac{1}{10}y(t)\left(\frac{5}{1000}x(t) - 2\right), \quad t \in [0, 150], x(0) =$$

Αυτό είναι ένα σύστημα που περιγράφει τη εξέλιξη του πλυθυσμού λαγών και αλεπούδων, όπου  $x(t)$  είναι ο πλυθυσμός των λαγών και  $y(t)$  των αλεπούδων.

**Άσκηση 5:** Θεωρείστε το παραπάνω σύστημα Δ.Ε. και μια διαμέριση του  $[0, 150]$ , με  $N = 2500$  και εφαρμόστε τη άμεση μέθοδο του Euler, τη μέθοδο του μέσου και τη μέθοδο Adams-Bashforth(2) για συστήματα για να βρείτε τις προσεγγίσεις  $(x_n, y_n)$  των  $(x(t_n), y(t_n))$ ,  $n = 0, \dots, N$ .

1. Δημιουργείστε τη γραφική παράσταση των λύσεων ως προς το χρόνο  $t$ .
2. Δημιουργείστε τη γραφική παράσταση των 2 προσεγγίσεων  $(x_n, y_n)$  στο πεδίο  $xy$ .
3. Ποιός είναι ο πλυθυσμός των λαγών και των αλεπούδων για χρόνο  $t = 150$ ;
4. Αν μεταβάλετε (αυξήσετε ή μειώσετε) τον αριθμό των σημείων  $N$ , ο πλυθυσμός στο χρόνο  $t = 150$  μεταβάλετε πολύ;
5. Ποιά μέθοδο πιστεύετε ότι δίνει καλύτερα αποτελέσματα;