

## ΕΡΓΟΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Μεταπτυχιακό)

4ο Φυλλάδιο Ασκήσεων-Χειμερινό Εξάμηνο 2017

Παρακαλώ να μου παραδώσετε τις λύσεις σας την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου.

- (1) (1.5 μονάδες) Για  $x \in [0, 1]$  έστω  $a_1(x), a_2(x), \dots$  οι συντελεστές στο ανάπτυγμα του  $x$  σε συνεχή κλάσματα. Δείξτε ότι για (Lebesgue) σχεδόν κάθε  $x \in [0, 1]$  ο αρμονικός μέσος όρος της ακολουθίας  $(a_n(x))$ , δηλαδή το όριο

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1(x)} + \dots + \frac{1}{a_n(x)}},$$

υπάρχει. Εκφράστε το όριο ως σειρά αριθμών.

- (2) (1.5 μονάδες) Έστω  $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$  εργοδικό δυναμικό σύστημα και  $f$  μετρήσιμη συνάρτηση ώστε  $\int_X f^- d\mu < +\infty$  και  $\int_X f^+ d\mu = +\infty$ . Δείξτε ότι σχεδόν για κάθε  $x \in X$  έχουμε

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(T^n x) = +\infty.$$

- (3) (1.5 μονάδες) Έστω  $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$  δυναμικό σύστημα,  $f \in L^1(\mu)$ , και  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Δείξτε ότι σχεδόν για κάθε  $x \in X$  το παρακάτω όριο υπάρχει

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{in\alpha} f(T^n x).$$

- (4) (2 μονάδες) Έστω  $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$  εργοδικό δυναμικό σύστημα και  $A \in \mathcal{B}$  με  $\mu(A) > 0$ . Το εργοδικό θεώρημα δίνει ότι σχεδόν για κάθε  $x \in X$  το σύνολο  $\Lambda_x = \{n \in \mathbb{N}: T^n x \in A\}$  έχει πυκνότητα  $\mu(A)$ . Είναι σωστό ότι σχεδόν για κάθε  $x \in X$  το σύνολο  $\Lambda_x$  έχει φραγμένα κενά;

- (5) (2 μονάδες) Έστω  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ακολουθία θετικών ακεραίων ώστε:

(i)  $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i a_n t} \rightarrow 0$  για κάθε  $t \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ .

(ii) Για κάθε  $d \in \mathbb{N}$  το σύνολο  $\{n \in \mathbb{N}: d | a_n\}$  έχει θετική πυκνότητα.

Δείξτε ότι η ακολουθία  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  είναι ακολουθία επαναφοράς.

- (6) (3 μονάδες) (i) Έστω  $\alpha$  άρρητος. Δείξτε ότι για κάθε δυναμικό σύστημα  $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$  και  $f \in L^2(\mu)$  έχουμε

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \left( e^{2\pi i n^2 \alpha} \int \bar{f} \cdot T^n f \, d\mu \right) = 0.$$

- (ii) Χρησιμοποιήστε το (i) για να δείξετε ότι εάν ο  $\alpha$  είναι άρρητος, τότε το σύνολο

$$R = \{n \in \mathbb{N}: \{n^2 \alpha\} \in [1/2, 3/4]\}$$

είναι σύνολο επαναφοράς.