


1 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

Εισαγωγή

Το διάνυσμα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έννοιας που αναπτύχθηκε μέσα από τη στενή αλληλεπίδραση Μαθηματικών και Φυσικής. Ο “κανόνας του παραλληλόγραμμου”, σύμφωνα με τον οποίο το μέτρο και η κατεύθυνση δύο δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα εκφράζονται από τη διαγώνιο του παραλληλόγραμμου που σχηματίζουν, ήταν γνωστός με διάφορες μορφές στους Αρχαίους Έλληνες επιστήμονες. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, για παράδειγμα, στο έργο του “Μηχανικά” αποδεικνύει με χρήση αναλογιών την ακόλουθη γεωμετρική πρόταση:

Αν ένα σημείο Σ κινείται με ομαλή κίνηση κατά μήκος μιας ευθείας AB , ενώ συγχρόνως η AB κινείται παράλληλα προς τον εαυτό της με το άκρο A να διαγράφει μια ευθεία AG , τότε η πραγματική τροχιά του Σ (η “συνισταμένη κίνηση”) θα είναι η διαγώνιος AD του παραλληλόγραμμου $ABGA$.




Αυτός ο “κανόνας” χρησιμοποιήθηκε πολλούς αιώνες για το γεωμετρικό προσδιορισμό της συνισταμένης, χωρίς όμως να θεωρείται ένα νέο είδος πρόσθεσης ευθυγράμμων τμημάτων, διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιείται στην Ευκλείδεια Γεωμετρία. Για να γίνει αυτό, χρειάστηκε από τη μια μεριά η αποδοχή και συστηματική χρήση των αρνητικών αριθμών στα Μαθηματικά και από την άλλη η μελέτη φυσικών ποσοτήτων όπως η ταχύτητα, η δύναμη, η ορμή και η επιτάχυνση, που χαρακτηρίζονται τόσο από το μέτρο όσο και από τη διεύθυνσή τους. Αυτές οι εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο τις έννοιες της προσανατολισμένης κίνησης και του προσανατολισμένου ευθύγραμμου τμήματος, τις πρώτες ιδέες των οποίων συναντάμε σε έργα επιστημόνων του 17ου αιώνα όπως οι J. Wallis, I. Newton και G.W. Leibniz.


Η ανάπτυξη ενός συστηματικού λογισμού με προσανατολισμένα ευθύγραμμα τμήματα άρχισε στα τέλη του 18ου αιώνα, για να δοθεί μια γεωμετρική ερμηνεία στους αρνητικούς αριθμούς, αλλά και για να βρεθεί ένας τρόπος αναλυτικής έκφρασης του μήκους και της διεύθυνσης των ευθύγραμμων τμημάτων. Πρωτοποριακό υπήρξε προς αυτή την κατεύθυνση το έργο των C. Wessel (1799) και R.

Argand (1806). Ξεκινώντας από την απλή περίπτωση των προσανατολισμένων τμημάτων που βρίσκονται στην ίδια ευθεία, προχώρησαν στον ορισμό των πράξεων με τυχαία τμήματα του επιπέδου. Συγκεκριμένα, οι ορισμοί του Wessel ήταν οι εξής:

Το άθροισμα διαδοχικών προσανατολισμένων τμημάτων είναι το τμήμα που ενώνει την αρχή του πρώτου με το τέλος του τελευταίου.



Το γινόμενο δύο προσανατολισμένων τμημάτων που σχηματίζουν γωνίες φ και ω αντιστοίχως με ένα μοναδιαίο τμήμα, είναι το τμήμα που έχει μήκος το γινόμενο των μηκών των δύο τμημάτων και σχηματίζει γωνία $\varphi + \omega$ με το μοναδιαίο τμήμα.



Στις εργασίες των Wessel και Argand (και ορισμένες άλλες που δημοσιεύτηκαν εκείνη την εποχή) υπάρχουν οι βασικές ιδέες που συγκροτούν σήμερα το Διανυσματικό Λογισμό του επιπέδου. Η ουσιαστική ανάπτυξη του κλάδου αρχίζει όμως μερικές δεκαετίες αργότερα, όταν επιχειρείται η γενίκευση αυτών των ιδεών στον τρισδιάστατο χώρο και η θεμελίωση μιας γενικής μαθηματικής θεωρίας. Καθοριστικό υπήρξε προς αυτήν την κατεύθυνση του έργο του W. Hamilton (1843) και του H. Grassmann (1844). Ο W. Hamilton χρησιμοποίησε τον όρο διάνυσμα (vector). Ο όρος vector προέρχεται κατά μία εκδοχή από το λατινικό ρήμα “vehere” που σημαίνει μεταφέρω. Ο H. Grassmann χρησιμοποίησε τους όρους **εσωτερικό** και **εξωτερικό γινόμενο**.

Η παραπέρα εξέλιξη του Διανυσματικού Λογισμού επηρεάστηκε αποφασιστικά από τις εξελίξεις στη Φυσική κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Η χρήση της θεωρίας του Hamilton από τον ιδρυτή της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας J.C. Maxwell (1873) οδήγησε σε ορισμένες τροποποιήσεις, με βάση τις οποίες οι φυσικοί J.W. Gibbs και O. Heaviside δημιούργησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1880 τη σύγχρονη θεωρία του Διανυσματικού Λογισμού (στοιχεία της οποίας παρουσιάζονται σ' αυτό το κεφάλαιο). Τέλος το 1888, ο G. Peano, με βάση τη θεωρία του Grassmann θεμελίωσε αξιωματικά την έννοια του διανυσματικού χώρου.


1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

Ορισμός του Διανύσματος

Υπάρχουν μεγέθη, όπως είναι η μάζα, ο όγκος, η πυκνότητα, η θερμοκρασία κτλ., τα οποία προσδιορίζονται από το μέτρο τους και από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης. Τα μεγέθη αυτά λέγονται **μονόμετρα** ή **βαθμωτά**.

Υπάρχουν όμως και μεγέθη, όπως είναι η δύναμη, η ταχύτητα, η επιτάχυνση, η μετατόπιση, η μαγνητική επαγωγή κτλ., που για να τα προσδιορίσουμε, εκτός από το μέτρο τους και τη μονάδα μέτρησης, χρειαζόμαστε τη διεύθυνση και τη φορά τους. Τέτοια μεγέθη λέγονται **διανυσματικά** μεγέθη ή απλώς **διανύσματα**.


- Στη Γεωμετρία το **διάνυσμα** ορίζεται ως ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ως ένα ευθύγραμμο τμήμα του οποίου τα άκρα θεωρούνται διατεταγμένα. Το πρώτο άκρο λέγεται **αρχή** ή **σημείο εφαρμογής** του διανύσματος, ενώ το δεύτερο λέγεται **πέρας** του διανύσματος. Το διάνυσμα με αρχή το A και πέρας το B συμβολίζεται με $\overrightarrow{AB}$ και παριστάνεται με ένα βέλος που ξεκινάει από το A και καταλήγει στο B .



Αν η αρχή και το πέρας ενός διανύσματος συμπίπτουν, τότε το διάνυσμα λέγεται **μηδενικό διάνυσμα**. Έτσι, για παράδειγμα, το διάνυσμα $\overrightarrow{AA}$ είναι μηδενικό διάνυσμα.


Για το συμβολισμό των διανυσμάτων χρησιμοποιούμε πολλές φορές τα μικρά γράμματα του ελληνικού ή του λατινικού αλφάβητου επιγραμμισμένα με βέλος για παράδειγμα, $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \dots, \vec{u}, \vec{v}, \dots$

- Η απόσταση των άκρων ενός διανύσματος $\overrightarrow{AB}$, δηλαδή το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος AB , λέγεται **μέτρο** ή **μήκος** του διανύσματος $\overrightarrow{AB}$ και συμβολίζεται με $|\overrightarrow{AB}|$. Αν το διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ έχει μέτρο 1, τότε λέγεται **μοναδιαίο** διάνυσμα.




- Η ευθεία πάνω στην οποία βρίσκεται ένα μη μηδενικό διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ λέγεται **φορέας** του $\overrightarrow{AB}$.

Ως φορέα ενός μηδενικού διανύσματος $\overrightarrow{AA}$ μπορούμε να θεωρούμε οποιαδήποτε από τις ευθείες που διέρχονται από το A .



Αν ο φορέας ενός διανύσματος $\overrightarrow{AB}$ είναι παράλληλος ή συμπίπτει με μια ευθεία ζ , τότε λέμε ότι το $\overrightarrow{AB}$ είναι παράλληλο προς τη ζ και γράφουμε $\overrightarrow{AB} // \zeta$.

• Δύο μη μηδενικά διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$, που έχουν τον ίδιο φορέα ή παράλληλους φορείς, λέγονται **παράλληλα ή συγγραμμικά** διανύσματα. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι τα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$ έχουν **ίδια διεύθυνση** και γράφουμε $\overrightarrow{AB} // \overrightarrow{\Gamma\Delta}$.




Τα συγγραμμικά διανύσματα διακρίνονται σε ομόρροπα και αντίρροπα. Συγκεκριμένα:


— Δύο μη μηδενικά διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$ λέγονται **ομόρροπα**:

α) όταν έχουν παράλληλους φορείς και βρίσκονται στο ίδιο ημιεπίπεδο ως προς την ευθεία $A\Gamma$ που ενώνει τις αρχές τους ή
β) όταν έχουν τον ίδιο φορέα και μία από τις ημιευθείες AB και $\Gamma\Delta$ περιέχει την άλλη.

Στις περιπτώσεις αυτές λέμε ότι τα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$ έχουν την **ίδια κατεύθυνση** (ίδια διεύθυνση και ίδια φορά) και γράφουμε $\overrightarrow{AB} \uparrow \uparrow \overrightarrow{\Gamma\Delta}$.




— Δύο μη μηδενικά διανύσματα $\overline{AB}$ και $\overline{\Gamma\Delta}$ λέγονται **αντίρροπα**, όταν είναι συγγραμμικά και δεν είναι ομόρροπα. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι τα διανύσματα $\overline{AB}$ και $\overline{\Gamma\Delta}$ έχουν **αντίθετη κατεύθυνση** (ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά) και γράφουμε $\overline{AB} \updownarrow \overline{\Gamma\Delta}$.



Ίσα Διανύσματα

Δύο μη μηδενικά διανύσματα λέγονται **ίσα** όταν έχουν την ίδια κατεύθυνση και ίσα μέτρα. Για να δηλώσουμε ότι δύο διανύσματα $\overline{AB}$ και $\overline{\Gamma\Delta}$ είναι ίσα, γράφουμε $\overline{AB} = \overline{\Gamma\Delta}$. Τα μηδενικά διανύσματα θεωρούνται ίσα μεταξύ τους και συμβολίζονται με $\vec{0}$.



Εύκολα αποδεικνύεται ότι:

- Αν $\overline{AB} = \overline{\Gamma\Delta}$, τότε $\overline{A\Gamma} = \overline{B\Delta}$, $\overline{\Delta B} = \overline{\Gamma A}$ και $\overline{BA} = \overline{\Delta\Gamma}$.
- Αν M είναι το μέσον του AB , τότε $\overline{AM} = \overline{MB}$ και αντιστρόφως.



Αντίθετα Διανύσματα


Δύο διανύσματα λέγονται **αντίθετα**, όταν έχουν αντίθετη κατεύθυνση και ίσα μέτρα. Για να δηλώσουμε ότι δύο διανύσματα $\overline{AB}$ και $\overline{\Gamma\Delta}$ είναι αντίθετα, γράφουμε

$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA} \text{ ή } \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}.$$

Είναι φανερό ότι


$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$$

Ειδικότερα, έχουμε $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.



Γωνία δύο Διανυσμάτων


Έστω δύο μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{b}$. Με αρχή ένα σημείο O παίρνουμε τα διανύσματα $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$.



Την κυρτή γωνία $\widehat{AOB}$, που ορίζουν οι ημιευθείες OA και OB , την ονομάζουμε **γωνία των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{b}$** και τη συμβολίζουμε με $(\vec{a}, \vec{b})$ ή $(\vec{b}, \vec{a})$ ή ακόμα, αν δεν προκαλείται σύγχυση, με ένα μικρό γράμμα, για παράδειγμα θ . Εύκολα αποδεικνύεται ότι η γωνία των $\vec{a}$ και $\vec{b}$ είναι ανεξάρτητη από την επιλογή του σημείου O . Είναι φανερό επίσης ότι $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ ή σε ακτίνια $0 \leq \theta \leq \pi$ και ειδικότερα:

- $\theta = 0$, αν $\vec{a} \uparrow \vec{b}$.
- $\theta = \pi$, αν $\vec{a} \downarrow \vec{b}$.

Αν $\theta = \frac{\pi}{2}$, τότε λέμε ότι τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι **ορθογώνια** ή **κάθετα** και γράφουμε $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta}$.



Αν ένα από τα διανύσματα $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ είναι το μηδενικό διάνυσμα, τότε ως γωνία των $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ μπορούμε να θεωρήσουμε οποιαδήποτε γωνία θ με $0 \leq \theta \leq \pi$.

Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το μηδενικό διάνυσμα, $\vec{0}$, είναι ομόρροπο ή αντίρροπο ή ακόμη και κάθετο σε κάθε άλλο διάνυσμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Έστω M το μέσο της πλευράς AG ενός τριγώνου ABG . Με αρχή το M γράφουμε τα διανύσματα $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{GB}$ και $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{BA}$. Να αποδειχτεί ότι το A είναι το μέσο του DE .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αρκεί να δείξουμε ότι $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AE}$. Πράγματι, επειδή $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{GB}$, είναι

$$\overrightarrow{MG} = \overrightarrow{AB} \quad (1)$$

Όμως το M είναι μέσο του AG . Άρα,

$$\overrightarrow{MG} = \overrightarrow{AM} \quad (2)$$


Επομένως, λόγω των (1) και (2), έχουμε $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM}$, οπότε:

$$\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BM} \quad (3)$$

Επειδή επιπλέον $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{BA}$, έχουμε

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BM} \quad (4)$$

Έτσι, από τις σχέσεις (3) και (4) έχουμε $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AE}$. ■




1.2 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ


Πρόσθεση Διανυσμάτων

Έστω δύο διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$. Με αρχή ένα σημείο O παίρνουμε διάνυσμα $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ και στη συνέχεια με αρχή το A παίρνουμε διάνυσμα $\overrightarrow{AM} = \vec{\beta}$. Το διάνυσμα $\overrightarrow{OM}$ λέγεται **άθροισμα** ή **συνισταμένη** των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ και συμβολίζεται με $\vec{a} + \vec{\beta}$.

Θα αποδείξουμε ότι το άθροισμα των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ είναι ανεξάρτητο της επιλογής του σημείου O . Πράγματι, αν O' είναι ένα άλλο σημείο και πάρουμε τα διανύσματα $\overrightarrow{O'A'} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{A'M'} = \vec{\beta}$, επειδή $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{O'A'} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{A'M'} = \vec{\beta}$, έχουμε $\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{AA'}$ και $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{MM'}$. Επομένως, $\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{MM'}$, που συνεπάγεται ότι και $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{O'M'}$.



Το άθροισμα δύο διανυσμάτων βρίσκεται και με το λεγόμενο **κανόνα του παραλληλόγραμμου**. Δηλαδή, αν με αρχή ένα σημείο O πάρουμε τα διανύσματα $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{OB} = \vec{\beta}$, τότε το άθροισμα $\vec{a} + \vec{\beta}$ ορίζεται από τη διαγώνιο OM του παραλληλόγραμμου που έχει προσκείμενες πλευρές τις OA και OB .



Ιδιότητες Πρόσθεσης Διανυσμάτων

Για την πρόσθεση των διανυσμάτων ισχύουν οι γνωστές ιδιότητες της πρόσθεσης πραγματικών αριθμών. Δηλαδή, αν $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$, $\vec{\gamma}$ είναι τρία διανύσματα, τότε:

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| (1) | $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{\beta} + \vec{\alpha}$ | (Αντιμεταθετική ιδιότητα) |
| (2) | $(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma} = \vec{\alpha} + (\vec{\beta} + \vec{\gamma})$ | (Προσεταιριστική ιδιότητα) |
| (3) | $\vec{\alpha} + \vec{0} = \vec{\alpha}$ | |
| (4) | $\vec{\alpha} + (-\vec{\alpha}) = \vec{0}$. | |

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

- Από το προηγούμενο σχήμα έχουμε:

$$\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{OA} + \vec{AM} = \vec{OM}$$

και

$$\vec{\beta} + \vec{\alpha} = \vec{OB} + \vec{BM} = \vec{OM}.$$

Επομένως, $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{\beta} + \vec{\alpha}$.

- Από το διπλανό σχήμα έχουμε:

$$(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma} = (\vec{OA} + \vec{AB}) + \vec{BG} = \vec{OB} + \vec{BG} = \vec{OG} \text{ και}$$


$$\vec{\alpha} + (\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = \vec{OA} + (\vec{AB} + \vec{BG}) = \vec{OA} + \vec{AG} = \vec{OG}.$$

Επομένως, $(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma} = \vec{\alpha} + (\vec{\beta} + \vec{\gamma})$.


- Οι ιδιότητες (3) και (4) είναι προφανείς. ■

Η προσεταιριστική ιδιότητα μας επιτρέπει να συμβολίζουμε καθένα από τα ίσα αθροίσματα $(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma}$ και $\vec{\alpha} + (\vec{\beta} + \vec{\gamma})$ με $\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma}$, το οποίο θα λέμε άθροισμα των τριών διανυσμάτων $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$. Το άθροισμα περισσότερων διανυσμάτων $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3, \dots, \vec{\alpha}_n$, $n \geq 3$ ορίζεται επαγωγικά ως εξής:

$$\vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2 + \vec{\alpha}_3 + \dots + \vec{\alpha}_n = (\vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2 + \vec{\alpha}_3 + \dots + \vec{\alpha}_{n-1}) + \vec{\alpha}_n.$$



Για παράδειγμα, $\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 + \vec{a}_4 = (\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3) + \vec{a}_4$




Δηλαδή, για να προσθέσουμε n διανύσματα $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_n$, τα καθιστούμε διαδοχικά, οπότε το άθροισμά τους θα είναι το διάνυσμα που έχει ως αρχή την αρχή του πρώτου και ως πέρας το πέρας του τελευταίου. Επειδή μάλιστα ισχύουν η αντιμεταθετική και η προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης, το άθροισμα δε μεταβάλλεται αν αλλάξει η σειρά των προσθετέων ή αν μερικοί από αυτούς αντικατασταθούν με το άθροισμά τους.

Αφαίρεση Διανυσμάτων

Η διαφορά $\vec{a} - \vec{\beta}$ του διανύσματος $\vec{\beta}$ από το διάνυσμα $\vec{a}$ ορίζεται ως άθροισμα των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $-\vec{\beta}$. Δηλαδή

$$\vec{a} - \vec{\beta} = \vec{a} + (-\vec{\beta})$$




Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν έχουμε δύο διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$, τότε υπάρχει μοναδικό διάνυσμα $\vec{x}$, τέτοιο, ώστε $\vec{\beta} + \vec{x} = \vec{a}$. Πράγματι,

$$\vec{\beta} + \vec{x} = \vec{a} \Leftrightarrow (-\vec{\beta}) + (\vec{\beta} + \vec{x}) = (-\vec{\beta}) + \vec{a} \Leftrightarrow \vec{0} + \vec{x} = \vec{a} + (-\vec{\beta}) \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{a} - \vec{\beta}.$$

Διάνυσμα Θέσεως

Έστω O ένα σταθερό σημείο του χώρου. Τότε για κάθε σημείο M του χώρου ορίζεται το διάνυσμα $\overrightarrow{OM}$, το οποίο λέγεται **διάνυσμα θέσεως του M** ή **διανυσματική ακτίνα του M** . Το σημείο O , που είναι η κοινή αρχή όλων των διανυσματικών ακτίνων των σημείων του χώρου, λέγεται **σημείο αναφοράς** στο χώρο.



Αν O είναι ένα σημείο αναφοράς, τότε για οποιοδήποτε διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ έχουμε $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$ και επομένως

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

Δηλαδή:

“Κάθε διάνυσμα στο χώρο είναι ίσο με τη διανυσματική ακτίνα του πέρατος μείον τη διανυσματική ακτίνα της αρχής”.


Μέτρο Αθροίσματος Διανυσμάτων

Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε το άθροισμα των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$. Από την τριγωνική ανισότητα γνωρίζουμε όμως ότι

$$|(OA) - (AB)| \leq (OB) \leq (OA) + (AB)$$

και επομένως

$$||\vec{a}| - |\vec{\beta}|| \leq |\vec{a} + \vec{\beta}| \leq |\vec{a}| + |\vec{\beta}|$$




ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Για τέσσερα σημεία A, B, Γ, Δ να αποδειχτεί ότι $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Delta\Gamma} = \overrightarrow{\Delta B} + \overrightarrow{A\Gamma}$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αν O είναι ένα σημείο αναφοράς, τότε έχουμε:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Delta\Gamma} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{O\Gamma} - \overrightarrow{O\Delta} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{O\Delta} + \overrightarrow{O\Gamma} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{\Delta B} + \overrightarrow{A\Gamma}.$$




2. Να αποδειχτεί ότι $|\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma}| \leq |\vec{\alpha}| + |\vec{\beta}| + |\vec{\gamma}|$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έχουμε $|\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma}| = |(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma}| \leq |\vec{\alpha} + \vec{\beta}| + |\vec{\gamma}| \leq |\vec{\alpha}| + |\vec{\beta}| + |\vec{\gamma}|$.


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Οι δυνάμεις $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_5$ ασκούνται στο σώμα Σ . Ποια δύναμη χρειάζεται, ώστε να μην αφήσει το σώμα Σ να μετακινηθεί από τη θέση του;




2. Δίνεται ένα τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ και έστω $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ και $\vec{\delta}$ τα αντίστοιχα διανύσματα θέσεως ως προς ένα σημείο αναφοράς O . Τι μπορείτε να πείτε για το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ αν:
- (i) $\vec{\alpha} + \vec{\gamma} = \vec{\beta} + \vec{\delta}$ (ii) $|\vec{\alpha} - \vec{\gamma}| = |\vec{\beta} - \vec{\delta}|$
 (iii) $\vec{\alpha} + \vec{\gamma} = \vec{\beta} + \vec{\delta}$ και $|\vec{\alpha} - \vec{\gamma}| = |\vec{\beta} - \vec{\delta}|$
3. Να εκφράσετε το διάνυσμα $\vec{x}$ σε καθένα από τα παρακάτω σχήματα ως συνάρτηση των άλλων διανυσμάτων που δίνονται:


i)



ii)



iii)



4. Αν για δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Delta E$ ισχύει $\overline{AB} + \overline{A\Gamma} = \overline{A\Delta} + \overline{AE}$, να δείξετε ότι το τετράπλευρο $B\Delta\Gamma E$ είναι παραλληλόγραμμο.
5. Δίνονται τέσσερα σημεία A, B, Γ, Δ και έστω O , το μέσο του τμήματος $A\Gamma$. Να αποδείξετε ότι $\overline{OB} + \overline{O\Delta} = \overline{AB} - \overline{\Delta\Gamma}$.
6. Δίνεται κανονικό εξάγωνο $AB\Gamma\Delta E Z$. Αν $\overline{AB} = \vec{a}$ και $\overline{B\Gamma} = \vec{\beta}$, να εκφράσετε το διάνυσμα $\overline{\Gamma\Delta}$ ως συνάρτηση των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.
7. Για ένα τυχαίο εξάγωνο $P_1P_2P_3P_4P_5P_6$ να αποδείξετε ότι

$$\overrightarrow{P_1P_3} + \overrightarrow{P_2P_4} + \overrightarrow{P_3P_5} + \overrightarrow{P_4P_6} + \overrightarrow{P_5P_1} + \overrightarrow{P_6P_2} = \vec{0}$$

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ


Ορισμός Πολλαπλασιασμού Αριθμού με Διάνυσμα

Έστω λ ένας πραγματικός αριθμός με $\lambda \neq 0$ και $\vec{a}$ ένα μη μηδενικό διάνυσμα. Ονομάζουμε **γινόμενο του λ με το $\vec{a}$** και το συμβολίζουμε με $\lambda \cdot \vec{a}$ ή $\lambda\vec{a}$ ένα διάνυσμα το οποίο:

- είναι ομόρροπο του $\vec{a}$, αν $\lambda > 0$ και αντίρροπο του $\vec{a}$, αν $\lambda < 0$ και
- έχει μέτρο $|\lambda| |\vec{a}|$.

Αν είναι $\lambda = 0$ ή $\vec{a} = \vec{0}$, τότε ορίζουμε ως $\lambda \cdot \vec{a}$ το μηδενικό διάνυσμα $\vec{0}$.

Για παράδειγμα, αν το διάνυσμα $\vec{a}$ του διπλανού σχήματος έχει μέτρο 2, τότε το διάνυσμα $3\vec{a}$ είναι ομόρροπο με το $\vec{a}$ και έχει μέτρο $|3\vec{a}| = 3|\vec{a}| = 3 \cdot 2 = 6$, ενώ το διάνυσμα $-3\vec{a}$ είναι αντίρροπο με το $\vec{a}$, αλλά έχει και αυτό μέτρο ίσο με $|-3\vec{a}| = |-3| \cdot |\vec{a}| = 3 \cdot 2 = 6$.



Το γινόμενο $\frac{1}{\lambda} \cdot \vec{a}$ το συμβολίζουμε και με $\frac{\vec{a}}{\lambda}$.

Ιδιότητες Πολλαπλασιασμού Αριθμού με Διάνυσμα

Για το γινόμενο πραγματικού αριθμού με διάνυσμα ισχύουν οι επόμενες ιδιότητες:

- | | |
|-----|--|
| (1) | $\lambda(\vec{a} + \vec{\beta}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{\beta}$ |
| (2) | $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$ |
| (3) | $\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$ |

ΑΠΟΔΕΙΞΗ*

(1) Υποθέτουμε ότι τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ είναι μη μηδενικά και ότι $\lambda \neq 0$. Παίρνουμε ένα σημείο O και σχεδιάζουμε τα διανύσματα $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{AB} = \vec{\beta}$. Τότε είναι $\vec{OB} = \vec{a} + \vec{\beta}$.


Σχεδιάζουμε επιπλέον τα διανύσματα

$\vec{OA'} = \lambda\vec{a}$ και $\vec{OB'} = \lambda(\vec{a} + \vec{\beta})$. Επειδή

$$\frac{(OA')}{(OA)} = \frac{(OB')}{(OB)} = |\lambda|,$$

τα τρίγωνα OAB και $OA'B'$ είναι όμοια και επομένως η πλευρά $A'B'$ είναι παράλληλη με την AB και ισχύει


$$\frac{(A'B')}{(AB)} = |\lambda|.$$



Αυτό σημαίνει ότι $\overrightarrow{A'B'} = \lambda \cdot \overrightarrow{AB} = \lambda \vec{\beta}$.
Επομένως, επειδή $\overrightarrow{OB'} = \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{A'B'}$, έχουμε
 $\lambda(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) = \lambda \vec{\alpha} + \lambda \vec{\beta}$.

Η ιδιότητα ισχύει προφανώς και όταν ένα τουλάχιστον από τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι το μηδενικό ή όταν ο αριθμός λ είναι μηδέν.

Η απόδειξη των ιδιοτήτων (2) και (3) αφήνεται ως άσκηση. ■



Ως συνέπεια του ορισμού του γινομένου αριθμού με διάνυσμα και των παραπάνω ιδιοτήτων έχουμε:

- (i) $\lambda \vec{\alpha} = \vec{0} \Leftrightarrow \lambda = 0 \text{ ή } \vec{\alpha} = \vec{0}$
- (ii) $(-\lambda \vec{\alpha}) = \lambda(-\vec{\alpha}) = -(\lambda \vec{\alpha})$
- (iii) $\lambda(\vec{\alpha} - \vec{\beta}) = \lambda \vec{\alpha} - \lambda \vec{\beta}$
- (iv) $(\lambda - \mu)\vec{\alpha} = \lambda \vec{\alpha} - \mu \vec{\alpha}$
- (v) Αν $\lambda \vec{\alpha} = \lambda \vec{\beta}$ και $\lambda \neq 0$, τότε $\vec{\alpha} = \vec{\beta}$
- (vi) Αν $\lambda \vec{\alpha} = \mu \vec{\alpha}$ και $\vec{\alpha} \neq \vec{0}$, τότε $\lambda = \mu$.

Γραμμικός Συνδυασμός Διανυσμάτων

Ας θεωρήσουμε δύο διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$. Από τα διανύσματα αυτά “παράγονται”, για παράδειγμα, τα διανύσματα $\vec{\gamma} = 3\vec{\alpha} + 5\vec{\beta}$, $\vec{\delta} = -2\vec{\alpha} + 3\vec{\beta}$ κτλ.

Καθένα από τα διανύσματα αυτά λέγεται γραμμικός συνδυασμός των $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$. Γενικά, ονομάζεται **γραμμικός συνδυασμός** δύο διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ κάθε διάνυσμα της μορφής $\vec{v} = \kappa \vec{\alpha} + \lambda \vec{\beta}$, όπου $\kappa, \lambda \in \mathbf{R}$.

Ανάλογα ορίζεται και ο γραμμικός συνδυασμός τριών ή περισσότερων διανυσμάτων. Έτσι, για παράδειγμα, το διάνυσμα $\vec{v} = 3\vec{\alpha} - 2\vec{\beta} + 5\vec{\gamma}$ είναι ένας γραμμικός συνδυασμός των $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$.

Συνθήκη Παράλληλίας Διανυσμάτων

Όπως είδαμε, αν δύο διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$, όπου $\vec{\beta} \neq \vec{0}$, συνδέονται με τη σχέση $\vec{\alpha} = \lambda \vec{\beta}$, τότε τα διανύσματα αυτά είναι παράλληλα. Ισχύει όμως και το αντίστροφο. Δηλαδή, αν τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι παράλληλα και $\vec{\beta} \neq \vec{0}$, τότε υπάρχει μοναδικός αριθμός λ τέτοιος ώστε $\vec{\alpha} = \lambda \cdot \vec{\beta}$. Πράγματι, αν θέσουμε $\kappa = \frac{|\vec{\alpha}|}{|\vec{\beta}|}$, τότε $|\vec{\alpha}| = \kappa |\vec{\beta}|$. Συνεπώς:

- Αν $\vec{\alpha} \uparrow \vec{\beta}$, τότε $\vec{\alpha} = \kappa \vec{\beta}$.
- Αν $\vec{\alpha} \updownarrow \vec{\beta}$, τότε $\vec{\alpha} = -\kappa \vec{\beta}$.
- Αν $\vec{\alpha} = \vec{0}$, τότε $\vec{\alpha} = 0 \cdot \vec{\beta}$.

Σε κάθε λοιπόν περίπτωση υπάρχει λ και μάλιστα μοναδικός (ιδιότητα iv), τέτοιος, ώστε $\vec{\alpha} = \lambda \cdot \vec{\beta}$. Επομένως:

ΘΕΩΡΗΜΑ


Αν $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ είναι δύο διανύσματα, με $\vec{\beta} \neq \vec{0}$, τότε

$$\vec{\alpha} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{\alpha} = \lambda \vec{\beta}, \lambda \in \mathbf{R}.$$

Για παράδειγμα, στο παρακάτω σχήμα αν Δ και E είναι τα μέσα των πλευρών AB και AG του τριγώνου $AB\Gamma$, έχουμε:

$$\overrightarrow{B\Gamma} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A\Gamma} = 2\overrightarrow{\Delta A} + 2\overrightarrow{AE} = 2(\overrightarrow{\Delta A} + \overrightarrow{AE}) = 2\overrightarrow{\Delta E}.$$

Αφού λοιπόν $\overrightarrow{B\Gamma} = 2\overrightarrow{\Delta E}$, συμπεραίνουμε ότι $\Delta E // B\Gamma$ και $|\overrightarrow{B\Gamma}| = 2|\overrightarrow{\Delta E}|$, που σημαίνει ότι $\Delta E = \frac{1}{2} B\Gamma$. Ξαναβρίσκουμε δηλαδή τη γνωστή μας από την Ευκλείδεια Γεωμετρία σχέση $\Delta E = // \frac{B\Gamma}{2}$.



Διανυσματική Ακτίνα Μέσου Τμήματος

Ας πάρουμε ένα διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ και ένα σημείο αναφοράς O . Επειδή $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$, έχουμε


$$\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM},$$

οπότε

$$2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$$

και άρα


$$\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2}$$



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1* Να αποδειχτεί ότι:

- (i) Ένα σημείο G είναι το βαρύκεντρο ενός τριγώνου $AB\Gamma$, αν και μόνο αν ισχύει $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{G\Gamma} = \vec{0}$ και
 (ii) Αν G είναι το βαρύκεντρο του $AB\Gamma$, τότε για οποιοδήποτε σημείο O ισχύει $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{O\Gamma})$.



ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(i) Γνωρίζουμε από την Ευκλείδεια Γεωμετρία ότι αν G είναι το κέντρο βάρους του τριγώνου $AB\Gamma$, τότε $AG = 2G\Delta$, όπου $A\Delta$ η διάμεσος του τριγώνου. Επομένως, ισχύει $\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{G\Delta}$, οπότε έχουμε

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{G\Gamma} = \overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{G\Delta} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{GG} = \vec{0}.$$

Αντιστρόφως, αν για ένα σημείο G ισχύει $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{G\Gamma} = \vec{0}$, τότε θα έχουμε $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{G\Delta} = \vec{0}$, όπου Δ το μέσον της $B\Gamma$, οπότε θα ισχύει $\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{G\Delta}$. Έτσι, το σημείο G ανήκει στη διάμεσο $A\Delta$ και ισχύει $AG = 2G\Delta$. Άρα, το G είναι το κέντρο βάρους του τριγώνου $AB\Gamma$.

(ii) Από τη σχέση $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{G\Gamma} = \vec{0}$ έχουμε: $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{O\Gamma} - \overrightarrow{OG} = \vec{0}$. Άρα

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{O\Gamma})$$

- 2.** Να αποδειχτεί ότι τα ευθύγραμμα τμήματα που ορίζουν τα μέσα των απέναντι πλευρών ενός τετραπλεύρου και τα μέσα των διαγωνίων του διέρχονται από το ίδιο σημείο και διχοτομούνται από το σημείο αυτό.


ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}, \vec{\delta}$ τα διανύσματα θέσεως των κορυφών A, B, Γ, Δ , αντιστοίχως, ενός τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$ ως προς ένα σημείο αναφοράς O .

Τα διανύσματα θέσεως των μέσων H της $B\Gamma$ και Θ της $A\Delta$ είναι $\frac{1}{2}(\vec{\beta} + \vec{\gamma})$ και $\frac{1}{2}(\vec{\alpha} + \vec{\delta})$ αντιστοίχως και το διάνυσμα θέσεως του μέσου G του $H\Theta$ είναι το

$$\frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}(\vec{\beta} + \vec{\gamma}) + \frac{1}{2}(\vec{\alpha} + \vec{\delta}) \right] = \frac{1}{4}(\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} + \vec{\delta}).$$


Ομοίως βρίσκουμε ότι το διάνυσμα θέσεως των μέσων των τμημάτων EZ και IK είναι το $\frac{1}{4}(\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} + \vec{\delta})$. Άρα τα τμήματα $H\Theta$, EZ και IK διέρχονται από το ίδιο σημείο και διχοτομούνται από αυτό.



ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

- Αν $\vec{\alpha}$ είναι ένα διάνυσμα, τι μπορείτε να πείτε για το μέτρο και την κατεύθυνση του διανύσματος $\vec{\alpha}_0 = \frac{1}{|\vec{\alpha}|} \cdot \vec{\alpha}$;
- Να βρείτε το διάνυσμα $\vec{x}$ σε καθεμιά από τις περιπτώσεις:
 - $\frac{1}{2}(\vec{x} + \vec{\alpha}) = \frac{1}{3}(\vec{x} + \vec{\beta})$
 - $\vec{x} + 3(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) = 4(\vec{\alpha} - \vec{\beta}) - 3\vec{x}$.
- Αν στο διπλανό σχήμα είναι $(BM) = 2(M\Gamma)$, να αποδείξετε ότι $\vec{x} = \frac{1}{3}(\vec{\beta} + 2\vec{\gamma})$.




4. Στο διπλανό σχήμα έχουμε:


$$\Delta E = 2EB, \overline{AB} = \vec{\alpha}, \overline{\Delta\Gamma} = 2\vec{\alpha} \text{ και } \overline{\Delta A} = \vec{\beta}.$$

(i) Να εκφράσετε συναρτήσει των $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ τα διανύσματα $\overline{\Delta B}$, $\overline{EB}$, $\overline{\Gamma B}$, $\overline{AE}$ και $\overline{E\Gamma}$.

(ii) Από τις εκφράσεις των $\overline{AE}$ και $\overline{E\Gamma}$ ποιο συμπέρασμα προκύπτει για τα σημεία A , E και Γ ;



5. Στο παρακάτω σχήμα να αποδείξετε ότι τα σημεία A , Γ και E είναι συνευθειακά.



6. Αν $\overline{AK} + 3\overline{BK} - 2\overline{BA} = \overline{BL} + 3\overline{AM}$, να αποδείξετε ότι τα σημεία K , L και M είναι συνευθειακά.

7. Αν AD , BE και ΓZ είναι διάμεσοι τριγώνου $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι $\overline{AD} + \overline{BE} + \overline{\Gamma Z} = \vec{0}$.

8. Αν K , L , M είναι τα μέσα των πλευρών $B\Gamma$, ΓA , AB , αντίστοιχως, τριγώνου $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε σημείο O ισχύει:
 $\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OG} = \overline{OK} + \overline{OL} + \overline{OM}$.


9. Αν M και N είναι τα μέσα των διαγωνίων $A\Gamma$ και BD , αντίστοιχως, ενός τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$, να αποδείξετε ότι $\overline{AB} + \overline{AD} + \overline{\Gamma B} + \overline{\Gamma\Delta} = 4\overline{MN}$.

10. Δίνεται το μη μηδενικό διάνυσμα $\overline{AB}$ και σημείο Γ τέτοιο ώστε να ισχύει $\overline{A\Gamma} = \lambda \overline{AB}$ και $\overline{B\Gamma} = \mu \overline{AB}$. Να αποδείξετε ότι $\lambda - \mu = 1$.



11. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Αν $\overline{AD} = \kappa \overline{AB} + \lambda \overline{A\Gamma}$ και $\overline{AE} = \lambda \overline{AB} + \kappa \overline{A\Gamma}$ να αποδείξετε ότι $\overline{DE} \parallel \overline{B\Gamma}$.

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Στο διπλανό σχήμα είναι $\overline{AD} = \frac{1}{3}\overline{AB}$ και $\overline{AE} = -\frac{1}{3}\overline{AG}$. Αν G είναι το κέντρο βάρους του τριγώνου $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AG\Delta E$ είναι παραλληλόγραμμο.



2. Θεωρούμε ένα παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και δύο σημεία E και Z τέτοια, ώστε $\overline{AE} = \kappa \overline{AD}$ και $\overline{AZ} = \lambda \overline{AB}$, όπου $\lambda = \frac{\kappa}{\kappa - 1}$, με $\kappa \neq 1$. Να αποδείξετε ότι τα σημεία E , Γ και Z είναι συνευθειακά.
3. Να αποδείξετε ότι αν ισχύουν δύο από τις σχέσεις $x\overline{KA} + y\overline{KB} + z\overline{KG} = \vec{0}$, $x\overline{LA} + y\overline{LB} + z\overline{LG} = \vec{0}$, $x + y + z = 0$, τότε θα ισχύει και η τρίτη (το σημείο K είναι διαφορετικό από το A).
4. Αν $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{r}$ είναι οι διανυσματικές ακτίνες των σημείων A , B και M αντιστοίχως και $\frac{MA}{MB} = \frac{\kappa}{\lambda}$, να αποδείξετε ότι αν το M είναι εσωτερικό του AB , τότε $\vec{r} = \frac{\lambda \vec{a} + \kappa \vec{\beta}}{\lambda + \kappa}$, ενώ αν το M είναι εξωτερικό του AB , τότε $\vec{r} = \frac{\lambda \vec{a} - \kappa \vec{\beta}}{\lambda - \kappa}$.



5. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Να βρείτε σημείο M τέτοιο, ώστε να ισχύει $\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MG} = \overline{MD}$
6. Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ και έστω M και N τα μέσα των διαγωνίων του $A\Gamma$ και $B\Delta$ αντιστοίχως. Να αποδείξετε ότι αν $4\overline{MN} = \overline{AD} - \overline{BG}$, τότε το τετράπλευρο αυτό είναι παραλληλόγραμμο.


7. Αν G και G' είναι τα βαρύκεντρα δύο τριγώνων $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$, να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{\Gamma\Gamma'} = 3\overrightarrow{GG'}$.

8. Δίνονται τα σημεία A, B και Γ . Να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε σημείο M το διάνυσμα $3\overrightarrow{MA} - 5\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{M\Gamma}$ είναι σταθερό.

9. Στο διπλανό σχήμα το $AB\Gamma\Delta$ είναι τραπέζιο με $(AB) = 2(\Gamma\Delta)$, το $K\Delta\Gamma B$ παραλληλόγραμμο και το I μέσο του $\Gamma\Delta$. Να αποδείξετε ότι:

(i) $\overrightarrow{K\Gamma} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{KA}$ και $\overrightarrow{K\Delta} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{KB}$

(ii) τα σημεία I, K, A είναι συνευθειακά.



1.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Άξονας

Πάνω σε μια ευθεία $x'x$ επιλέγουμε δύο σημεία O και I , έτσι ώστε το διάνυσμα $\overrightarrow{OI}$ να έχει μέτρο 1 και να βρίσκεται στην ημιευθεία Ox . Λέμε τότε ότι έχουμε έναν **άξονα** με **αρχή το O** και **μοναδιαίο διάνυσμα το $\overrightarrow{OI} = \vec{i}$** και τον συμβολίζουμε με $x'x$. Η ημιευθεία Ox λέγεται **θετικός ημιάξονας Ox** , ενώ η Ox' λέγεται **αρνητικός ημιάξονας Ox'** .




Αν, τώρα, πάνω στον άξονα $x'x$ πάρουμε ένα σημείο M , επειδή $\overrightarrow{OM} // \vec{i}$, θα υπάρξει ακριβώς ένας πραγματικός αριθμός x τέτοιος ώστε $\overrightarrow{OM} = x \cdot \vec{i}$. Τον αριθμό

x τον ονομάζουμε **τετμημένη** του M . Αλλά και αντιστρόφως, από την ισότητα $\overrightarrow{OM} = x \cdot \vec{i}$ προκύπτει ότι σε κάθε πραγματικό αριθμό x αντιστοιχεί μοναδικό σημείο M του άξονα $x'x$ με τετμημένη x . Το σημείο αυτό συμβολίζεται με $M(x)$.

Καρτεσιανό Επίπεδο

Πάνω σε ένα επίπεδο σχεδιάζουμε δύο κάθετους άξονες $x'x$ και $y'y$ με κοινή αρχή O και μοναδιαία διανύσματα τα $\vec{i}$ και $\vec{j}$. Λέμε τότε ότι έχουμε ένα **ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο** ή απλούστερα ένα **σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο** ή ακόμα ένα **καρτεσιανό επίπεδο** και το συμβολίζουμε με Oxy . Το σύστημα Oxy λέγεται ορθοκανονικό, γιατί είναι ορθογώνιο και κανονικό. Ορθογώνιο είναι, γιατί οι άξονες $x'x$ και $y'y$ είναι κάθετοι, και κανονικό, γιατί τα διανύσματα $\vec{i}$ και $\vec{j}$ είναι ισομήκη.



Πάνω στο καρτεσιανό επίπεδο Oxy παίρνουμε ένα σημείο M . Από το M φέρνουμε την παράλληλη στον $y'y$, που τέμνει τον $x'x$ στο M_1 , και την παράλληλη στον $x'x$, που τέμνει τον $y'y$ στο M_2 . Αν x είναι η τετμημένη του M_1 ως προς τον άξονα $x'x$ και y η τετμημένη του M_2 ως προς τον άξονα $y'y$, τότε ο x λέγεται **τετμημένη** του M και ο y **τεταγμένη** του M . Η τετμημένη και η τεταγμένη λέγονται **συντεταγμένες του M** . Έτσι σε κάθε σημείο M του επιπέδου αντιστοιχεί ένα ζεύγος συντεταγμένων.

Αλλά και *αντιστρόφως* σε κάθε ζεύγος (x, y) πραγματικών αριθμών αντιστοιχεί μοναδικό σημείο του επιπέδου, το οποίο βρίσκεται ως εξής: Πάνω στον άξονα $x'x$ παίρνουμε το σημείο $M_1(x)$ και στον $y'y$ το σημείο $M_2(y)$. Από τα M_1 και M_2 φέρνουμε παράλληλες στους άξονες $y'y$ και $x'x$ αντιστοίχως, που τέμνονται στο M . Το σημείο M είναι το ζητούμενο. Ένα σημείο M με τετμημένη x και τεταγμένη y συμβολίζεται και με $M(x, y)$ ή απλά με (x, y) .

Συντεταγμένες Διανύσματος

Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και $\vec{a}$ ένα διάνυσμα του επιπέδου. Με αρχή το O σχεδιάζουμε το διάνυσμα $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$. Αν A_1 και A_2 είναι οι προβολές του A στους άξονες $x'x$ και $y'y$ αντιστοίχως, έχουμε:

$$\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} \quad (1)$$

Αν x, y είναι οι συντεταγμένες του A , τότε ισχύει $\overrightarrow{OA_1} = x\vec{i}$ και $\overrightarrow{OA_2} = y\vec{j}$. Επομένως η ισότητα (1) γράφεται

$$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

Αποδείξαμε δηλαδή ότι το $\vec{a}$ είναι **γραμμικός συνδυασμός** των $\vec{i}$ και $\vec{j}$.

Στην παραπάνω κατασκευή οι αριθμοί x και y είναι μοναδικοί. Θα αποδείξουμε τώρα ότι και η έκφραση του $\vec{a}$ ως γραμμικού συνδυασμού των $\vec{i}$ και $\vec{j}$ είναι μοναδική. Πράγματι, έστω ότι ισχύει και

$$\vec{a} = x'\vec{i} + y'\vec{j}.$$

Τότε θα έχουμε

$$x\vec{i} + y\vec{j} = x'\vec{i} + y'\vec{j}$$

$$(x - x')\vec{i} = (y' - y)\vec{j}$$


Αν υποθέσουμε ότι $x \neq x'$, δηλαδή ότι $x - x' \neq 0$, τότε θα ισχύει

$$\vec{i} = \frac{y' - y}{x - x'} \vec{j}$$

Η σχέση αυτή, όμως, δηλώνει ότι $\vec{i} // \vec{j}$, που είναι άτοπο, αφού τα $\vec{i}$ και $\vec{j}$ δεν είναι συγγραμμικά. Επομένως $x = x'$, που συνεπάγεται ότι και $y = y'$. Ωστε:

“Κάθε διάνυσμα $\vec{a}$ του επιπέδου γράφεται κατά μοναδικό τρόπο στη μορφή $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j}$ ”.

Τα διανύσματα $x\vec{i}$ και $y\vec{j}$ λέγονται **συνιστώσες** του διανύσματος $\vec{a}$ κατά τη διεύθυνση των $\vec{i}$ και $\vec{j}$ αντιστοίχως, ενώ οι αριθμοί x, y λέγονται **συντεταγμένες** του $\vec{a}$ στο σύστημα Oxy . Πιο συγκεκριμένα, ο x λέγεται **τετμημένη** του $\vec{a}$ και ο



y λέγεται **τεταγμένη** του $\vec{a}$. Από τον τρόπο που ορίστηκαν οι συντεταγμένες ενός διανύσματος προκύπτει ότι:

“Δύο διανύσματα είναι ίσα αν και μόνο αν οι αντίστοιχες συντεταγμένες τους είναι ίσες”.

Καθένα από τα ίσα διανύσματα με τετμημένη x και τεταγμένη y , θα το συμβολίζουμε με το διατεταγμένο ζεύγος (x, y) .

Συντεταγμένες Γραμμικού Συνδυασμού Διανυσμάτων

Αν γνωρίζουμε τις συντεταγμένες δύο διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{b}$ του καρτεσιανού επιπέδου, τότε μπορούμε να βρούμε τις συντεταγμένες του αθροίσματος $\vec{a} + \vec{b}$, του γινομένου $\lambda\vec{a}$, $\lambda \in \mathbf{R}$ και γενικά κάθε γραμμικού συνδυασμού των $\vec{a}$ και $\vec{b}$. Πράγματι, αν $\vec{a} = (x_1, y_1)$ και $\vec{b} = (x_2, y_2)$, τότε έχουμε:

- $\vec{a} + \vec{b} = (x_1\vec{i} + y_1\vec{j}) + (x_2\vec{i} + y_2\vec{j}) = (x_1 + x_2)\vec{i} + (y_1 + y_2)\vec{j}$
- $\lambda\vec{a} = \lambda(x_1\vec{i} + y_1\vec{j}) = (\lambda x_1)\vec{i} + (\lambda y_1)\vec{j}$

Επομένως

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \quad \text{και} \quad \lambda\vec{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$$

ή ισοδύναμα

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$\lambda(x_1, y_1) = (\lambda x_1, \lambda y_1)$$

Γενικότερα, για το γραμμικό συνδυασμό $\lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$ έχουμε:

$$\lambda\vec{a} + \mu\vec{b} = (\lambda x_1, \lambda y_1) + (\mu x_2, \mu y_2) = (\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2).$$

Για παράδειγμα, αν $\vec{a} = (1, -1)$ και $\vec{b} = (1, 2)$, τότε

$$\vec{a} + \vec{b} = (1, -1) + (1, 2) = (2, 1),$$

$$2\vec{a} = 2(1, -1) = (2, -2),$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (1, -1) - (1, 2) = (1, -1) + (-1, -2) = (0, -3),$$

και $2\vec{a} - \vec{b} = 2(1, -1) - (1, 2) = (2, -2) + (-1, -2) = (1, -4)$

Συντεταγμένες Μέσου Τμήματος

Ας θεωρήσουμε δύο σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ του καρτεσιανού επιπέδου και ας υποθέσουμε ότι (x, y) είναι οι συντεταγμένες του μέσου M του AB .


Επειδή $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$, και

$$\overrightarrow{OM} = (x, y), \quad \overrightarrow{OA} = (x_1, y_1), \quad \overrightarrow{OB} = (x_2, y_2),$$

έχουμε

$$(x, y) = \frac{1}{2}[(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$


Επομένως ισχύει



$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad \text{και} \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}.$$

Συντεταγμένες Διανύσματος με Γνωστά Άκρα

Ας θεωρήσουμε δύο σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ του καρτεσιανού επιπέδου και ας υποθέσουμε ότι (x, y) είναι οι συντεταγμένες του διανύσματος $\overrightarrow{AB}$. Επειδή, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{AB} = (x, y)$, $\overrightarrow{OB} = (x_2, y_2)$, και $\overrightarrow{OA} = (x_1, y_1)$, έχουμε:



$$(x, y) = (x_2, y_2) - (x_1, y_1) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$

Επομένως:

Οι συντεταγμένες (x, y) του διανύσματος με άκρα τα σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ δίνονται από τις σχέσεις

$$x = x_2 - x_1 \quad \text{και} \quad y = y_2 - y_1.$$

Δηλαδή


τετμημένη του $\overline{AB}$ = τετμημένη του B - τετμημένη του A

τεταγμένη του $\overline{AB}$ = τεταγμένη του B - τεταγμένη του A .

Για παράδειγμα, το διάνυσμα $\overline{AB}$ με αρχή το $A(1,2)$ και πέρας το $B(3,7)$ έχει συντεταγμένες $x = 3 - 1 = 2$ και $y = 7 - 2 = 5$, δηλαδή είναι ίσο με το $\vec{a} = (2,5)$.

Μέτρο Διανύσματος

• Έστω $\vec{a} = (x, y)$ ένα διάνυσμα του καρτεσιανού επιπέδου και A το σημείο με διανυσματική ακτίνα $\overline{OA} = \vec{a}$. Αν A_1 και A_2 είναι οι προβολές του A στους άξονες x και y αντίστοιχως, επειδή το σημείο A έχει τετμημένη x και τεταγμένη y , θα ισχύει $(OA_1) = |x|$ και $(OA_2) = |y|$. Έτσι θα έχουμε:



$$|\vec{a}|^2 = (OA)^2 = (OA_1)^2 + (A_1A)^2 = (OA_1)^2 + (OA_2)^2 = |x|^2 + |y|^2 = x^2 + y^2.$$


Επομένως:

$$\text{Αν } \vec{a} = (x, y), \text{ τότε } |\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (1)$$

Για παράδειγμα, αν $\vec{a} = (5, 12)$, τότε $|\vec{a}| = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$.

• Ας θεωρήσουμε τώρα δύο σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ του καρτεσιανού επιπέδου. Επειδή η απόσταση (AB) των σημείων A και B είναι ίση με το μέτρο του διανύσματος $\overline{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$, σύμφωνα με τον τύπο (1) θα ισχύει:

$$(AB) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (2)$$



Επομένως:

Η απόσταση των σημείων $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ είναι ίση με

$$(AB) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Για παράδειγμα, η απόσταση των σημείων $A(2, -7)$ και $B(5, -3)$ είναι ίση με $(AB) = \sqrt{(5-2)^2 + (-3+7)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1.** Αν $A(-2, 1)$ και $B(1, 4)$ είναι οι δύο κορυφές του παραλληλόγραμμου $AB\Gamma\Delta$ και $K(2, -3)$ το κέντρο του, να βρεθούν οι συντεταγμένες των κορυφών Γ και Δ .

ΛΥΣΗ


Αν $\Gamma(x_1, y_1)$ και $\Delta(x_2, y_2)$ είναι οι δύο άλλες κορυφές του παραλληλόγραμμου, επειδή το K είναι το μέσον των $A\Gamma$ και $B\Delta$, έχουμε:

$$\begin{cases} \frac{x_1 + (-2)}{2} = 2 \\ \frac{y_1 + 1}{2} = -3 \end{cases} \quad \text{και} \quad \begin{cases} \frac{x_2 + 1}{2} = 2 \\ \frac{y_2 + 4}{2} = -3 \end{cases}.$$

Επομένως,

$$\begin{cases} x_1 = 6 \\ y_1 = -7 \end{cases} \quad \text{και} \quad \begin{cases} x_2 = 3 \\ y_2 = -10 \end{cases}.$$


Άρα, οι συντεταγμένες των κορυφών Γ και Δ είναι $(6, -7)$ και $(3, -10)$ αντιστοίχως.



- 2.*** Να βρεθούν οι συντεταγμένες του κέντρου βάρους G του τριγώνου $AB\Gamma$, αν είναι γνωστές οι συντεταγμένες των κορυφών του.

ΛΥΣΗ

Αν (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) είναι οι συντεταγμένες των κορυφών A , B , Γ αντιστοίχως και (x, y) είναι οι συντεταγμένες του κέντρου βάρους του



$AB\Gamma$, επειδή $\overline{OG} = \frac{\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OG}}{3}$ (Εφαρμ. 1 § 1.3), θα έχουμε:

$$\begin{aligned}(x, y) &= \frac{(x_1, y_1) + (x_2, y_2) + (x_3, y_3)}{3} \\ &= \frac{(x_1 + x_2 + x_3, y_1 + y_2 + y_3)}{3} = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)\end{aligned}$$

Άρα

$$x = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \quad y = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}.$$

Συνθήκη Παράλληλίας Διανυσμάτων

Έστω $\vec{\alpha} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ δύο διανύσματα του καρτεσιανού επιπέδου.

— Αν τα διανύσματα είναι παράλληλα και υποθέσουμε ότι $\vec{\beta} \neq \vec{0}$, τότε θα υπάρχει $\lambda \in \mathbf{R}$, τέτοιος, ώστε $\vec{\alpha} = \lambda \vec{\beta}$. Επομένως, θα έχουμε $(x_1, y_1) = \lambda(x_2, y_2)$ ή ισοδύναμα:

$$x_1 = \lambda x_2 \quad \text{και} \quad y_1 = \lambda y_2,$$

οπότε θα ισχύει $x_1 y_2 - y_1 x_2 = \lambda x_2 y_2 - \lambda y_2 x_2 = 0$ ή ισοδύναμα $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0$.

— Αν $\vec{\beta} = \vec{0}$, τότε θα ισχύει $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$.

Δείξαμε δηλαδή ότι αν τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι παράλληλα, τότε

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0.$$

• Αντιστρόφως, αν $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0$, τότε τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ θα είναι παράλληλα.

Πράγματι, επειδή $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0$, έχουμε $x_1 y_2 = x_2 y_1$.

Επομένως,

— Αν $x_2 \neq 0$, τότε $y_1 = \frac{x_1}{x_2} y_2$, οπότε, αν θέσουμε $\frac{x_1}{x_2} = \lambda$, θα έχουμε

$$x_1 = \lambda x_2 \quad \text{και} \quad y_1 = \lambda y_2.$$

Άρα, $\vec{\alpha} = \lambda \vec{\beta}$ και συνεπώς $\vec{\alpha} // \vec{\beta}$.

— Αν $x_2 = 0$, τότε $x_1 y_2 = 0$, οπότε αν $x_1 = 0$, τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ θα είναι παράλληλα προς τον άξονα των τεταγμένων, άρα και μεταξύ τους παράλληλα, ενώ, αν $y_2 = 0$, τότε το $\vec{\beta}$ θα είναι το μηδενικό διάνυσμα και άρα, παράλληλο προς το $\vec{\alpha}$.

Αποδείξαμε λοιπόν ότι

$$\vec{\alpha} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (1)$$

Την ορίζουσα $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$, που έχει ως 1η τη γραμμή τις συντεταγμένες του διανύσματος $\vec{\alpha}$ και ως 2η γραμμή τις συντεταγμένες του διανύσματος $\vec{\beta}$, τη λέμε **ορίζουσα των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$** (με τη σειρά που δίνονται) και θα τη συμβολίζουμε με $\det(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$. Έτσι, η παραπάνω ισοδυναμία διατυπώνεται ως εξής:

$$\vec{\alpha} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \det(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = 0$$

Για παράδειγμα:

— Τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (\sqrt{3}, -1)$ και $\vec{\beta} = (3, -\sqrt{3})$ είναι παράλληλα, αφού

$$\det(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \begin{vmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 3 & -\sqrt{3} \end{vmatrix} = -3 + 3 = 0, \text{ ενώ}$$


— Τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (2, 3)$ και $\vec{\beta} = (-1, 2)$ δεν είναι παράλληλα, αφού

$$\det(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 + 3 = 7 \neq 0.$$

Συντελεστής Διεύθυνσης Διανύσματος

• Έστω $\vec{\alpha} = (x, y)$ ένα μη μηδενικό διάνυσμα και A το σημείο του επιπέδου για το οποίο ισχύει $\overrightarrow{OA} = \vec{\alpha}$. Τη γωνία φ , που διαγράφει ο ημιάξονας Ox αν στραφεί γύρω από το O κατά τη θετική φορά μέχρι να συμπέσει με την ημιευθεία OA , την ονομάζουμε **γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα $\vec{\alpha}$ με τον άξονα $x'x$** . Είναι φανερό ότι

$$0 \leq \varphi < 2\pi.$$



Για τη γωνία φ , όπως είναι γνωστό από την Τριγωνομετρία, αν το $\vec{a}$ δεν είναι παράλληλο προς τον άξονα $y'y$, ισχύει

$$\varepsilon\varphi\varphi = \frac{y}{x}.$$

Το πηλίκο $\frac{y}{x}$ της τεταγμένης προς την τετμημένη του διανύσματος $\vec{a} = (x, y)$, με $x \neq 0$, το λέμε **συντελεστή διεύθυνσης** του $\vec{a}$ και τον συμβολίζουμε με $\lambda_{\vec{a}}$ ή απλώς με λ . Επομένως:

$$\lambda = \frac{y}{x} = \varepsilon\varphi\varphi$$

Είναι φανερό ότι

— Αν $y = 0$, δηλαδή αν $\vec{a} // x'x$, τότε ο συντελεστής διεύθυνσης του διανύσματος $\vec{a}$ είναι ο $\lambda = 0$.

— Αν $x = 0$, δηλαδή αν $\vec{a} // y'y$, τότε **δεν ορίζεται** συντελεστής διεύθυνσης του διανύσματος $\vec{a}$.

• Ας θεωρήσουμε τώρα δύο διανύσματα $\vec{a} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ με συντελεστές διεύθυνσης λ_1 και λ_2 αντιστοίχως. Τότε έχουμε τις ισοδυναμίες:

$$\vec{a} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow x_1 y_2 = x_2 y_1 \Leftrightarrow \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2.$$

Επομένως, η συνθήκη παραλληλίας για δύο διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ με συντελεστές διεύθυνσης λ_1 και λ_2 διατυπώνεται ως εξής:

$$\vec{a} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2$$

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Να βρεθούν οι τιμές του $\mu \in \mathbb{R}$ για τις οποίες τα σημεία $A(1, 0)$, $B(-\mu^2, 3)$ και $\Gamma(-5\mu, 9)$ είναι συνευθειακά.

ΛΥΣΗ

Τα σημεία A, B, Γ είναι συνευθειακά, αν και μόνο αν τα διανύσματα $\overrightarrow{AB} = (-\mu^2 - 1, 3)$ και $\overrightarrow{AG} = (-5\mu - 1, 9)$ είναι παράλληλα, δηλαδή, αν και μόνο αν $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AG}) = 0$.

Έχουμε λοιπόν

$$\begin{aligned}\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AG}) &= 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -\mu^2 - 1 & 3 \\ -5\mu - 1 & 9 \end{vmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow -9\mu^2 - 9 + 15\mu + 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow 3\mu^2 - 5\mu + 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \mu = 1 \quad \text{ή} \quad \mu = \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ


Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Ποια είναι η θέση στο καρτεσιανό επίπεδο των σημείων $M(x, y)$ για τα οποία ισχύει:
 (i) $|x| = 2$ (ii) $|x| < 2$ (iii) $|y| > 2$ (iv) $|x| = |y|$.
2. Να βρείτε τις αποστάσεις των παρακάτω σημείων από τους άξονες $x'x$ και $y'y'$:
 $A(-1, 2)$, $B(3, 4)$, $\Gamma(-5, -6)$, $\Delta(\alpha - 1, \beta + 2)$, $M(x, y)$.
3. Δίνεται το διάνυσμα $\vec{\alpha} = (\lambda^2 - 4, \lambda^2 - 3\lambda + 2)$, $\lambda \in \mathbf{R}$. Για ποια τιμή του λ είναι:
 (i) $\vec{\alpha} = \vec{0}$; (ii) $\vec{\alpha} \neq \vec{0}$ και $\vec{\alpha} // x'x$;
4. Δίνονται τα διανύσματα
 $\vec{\alpha} = (\lambda^2 - 3\lambda + 2, 2\lambda^2 - 3\lambda - 2)$ και $\vec{\beta} = (\lambda^2 - 5\lambda + 6, -3\lambda^2 + 7\lambda - 2)$. Να βρείτε το $\lambda \in \mathbf{R}$, ώστε να είναι $\vec{\alpha} = \vec{\beta}$.
5. Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό x , ώστε τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (x, 1)$ και $\vec{\beta} = (4, x)$ να είναι ομόρροπα.
6. Αν $\vec{u} = (3, 4)$, ποιο διάνυσμα είναι συγγραμμικό με το $\vec{u}$ και έχει διπλάσιο μέτρο από το $\vec{u}$;

7. Στο διπλανό σύστημα συντεταγμένων είναι $\overrightarrow{OA} = \vec{i}$ και $\overrightarrow{OB} = \vec{j}$. Να εκφράσετε ως συνάρτηση την $\vec{i}$ και $\vec{j}$:

α) Τα διανύσματα θέσεως των σημείων Γ, Δ, E, Z, K και H .

β) Τα διανύσματα $\overrightarrow{\Gamma\Delta}, \overrightarrow{KA}, \overrightarrow{H\Delta}, \overrightarrow{K\Delta}, \overrightarrow{H\Theta}, \overrightarrow{ZA}$ και $\overrightarrow{KZ}$.



8. Δίνονται τα σημεία $A(-1, 6)$ και $B(-9, -2)$. Να βρείτε (i) Το σημείο του άξονα $x'x$ που ισαπέχει από τα A και B (ii) Το σημείο του άξονα yy' που ισαπέχει από τα A και B .

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Αν τα σημεία $K\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$, $\Lambda\left(3, \frac{7}{2}\right)$, $M\left(4, \frac{5}{2}\right)$, $N(3, 1)$ και $\Xi\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ είναι τα μέσα των πλευρών $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta, \Delta E$ και EA , αντιστοίχως, του πενταγώνου $AB\Gamma\Delta E$, να βρεθούν οι συντεταγμένες των κορυφών του πενταγώνου.

2. Σε ένα σύστημα συντεταγμένων οι τετμημένες δύο σημείων A και B είναι οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - (\lambda^2 - 4\lambda + 3)x - 17 = 0$. Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbf{R}$, ώστε το μέσον του τμήματος AB να έχει τετμημένη ίση με 4.

3. Δίνονται τα σημεία $M_1(\kappa_1, \lambda_1)$, $M_2(\kappa_2, \lambda_2)$, $M_3(\kappa_3, \lambda_3)$ και $M_4(\kappa_4, \lambda_4)$. Να αποδείξετε ότι, αν τα σημεία αυτά είναι τα μέσα των διαδοχικών πλευρών ενός τετραπλεύρου, τότε ισχύει

$$\kappa_1 + \kappa_3 = \kappa_2 + \kappa_4 \quad \text{και} \quad \lambda_1 + \lambda_3 = \lambda_2 + \lambda_4.$$


4. Για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, x, y$ να αποδείξετε ότι:

$$\sqrt{(x - \alpha_1)^2 + (y - \beta_1)^2} + \sqrt{(x - \alpha_2)^2 + (y - \beta_2)^2} \geq \sqrt{(\alpha_2 - \alpha_1)^2 + (\beta_2 - \beta_1)^2}.$$

5. Δίνονται δύο μη συγγραμμικά διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ ενός επιπέδου. Να αποδείξετε ότι οποιοδήποτε διάνυσμα $\vec{r}$ του επιπέδου αυτού μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός των $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ κατά μοναδικό τρόπο.

1.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

Γνωρίζουμε ότι το έργο που παράγεται από μια δύναμη $\vec{F}$ όταν μετατοπίζει το σημείο εφαρμογής της από το O στο A είναι ίσο με το γινόμενο $|\vec{F}| \cdot (OA) \cdot \sin \varphi$. Το γινόμενο αυτό συμβολίζεται με $\vec{F} \cdot \overrightarrow{OA}$ και λέγεται **εσωτερικό γινόμενο** της δύναμης $\vec{F}$ με το διάνυσμα $\overrightarrow{OA}$. Γενικότερα, έχουμε τον ακόλουθο ορισμό:



ΟΡΙΣΜΟΣ

- Ονομάζουμε **εσωτερικό γινόμενο** δύο μη μηδενικών διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{b}$ και το συμβολίζουμε με $\vec{a} \cdot \vec{b}$ τον πραγματικό αριθμό

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi,$$

όπου φ η γωνία των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{b}$.

- Αν $\vec{a} = \vec{0}$ ή $\vec{b} = \vec{0}$, τότε ορίζουμε $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

Για παράδειγμα, το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{b}$ με $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 8$ και $\varphi = \frac{\pi}{3}$ είναι

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 8 \cdot \sin \frac{\pi}{3} = 3 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 12.$$

Άμεσες συνέπειες του παραπάνω ορισμού είναι οι εξής:

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (Αντιμεταθετική ιδιότητα)
- Αν $\vec{a} \perp \vec{b}$, τότε $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ και αντιστρόφως.
- Αν $\vec{a} \uparrow \vec{b}$, τότε $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ και αντιστρόφως.
- Αν $\vec{a} \downarrow \vec{b}$, τότε $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ και αντιστρόφως.

Το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{a}$ συμβολίζεται με $\vec{a}^2$ και λέγεται **τετράγωνο του $\vec{a}$** . Έχουμε: $\vec{a}^2 = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \sin 0 = |\vec{a}|^2$. Επομένως


$$\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2.$$

Ειδικότερα, για τα μοναδιαία διανύσματα $\vec{i}$ και $\vec{j}$ του καρτεσιανού επίπεδου ισχύουν:

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{i} = 0 \quad \text{και} \quad \vec{i}^2 = \vec{j}^2 = 1$$

Αναλυτική Έκφραση Εσωτερικού Γινομένου

Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να εκφράσουμε το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων $\vec{a} = (x_1, y_1)$ και $\vec{b} = (x_2, y_2)$ συναρτήσει των συντεταγμένων τους. Με αρχή το O παίρνουμε τα διανύσματα $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$. Από το νόμο των συνημιτόνων στο τρίγωνο OAB έχουμε την ισότητα



$$(AB)^2 = (OA)^2 + (OB)^2 - 2(OA)(OB)\cos\hat{AOB},$$

η οποία ισχύει και στην περίπτωση που τα σημεία O, A, B είναι συνευθειακά. Όμως είναι

$$(AB)^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2, \quad (OA)^2 = x_1^2 + y_1^2 \quad \text{και} \quad (OB)^2 = x_2^2 + y_2^2.$$

Επομένως, έχουμε διαδοχικά:

$$(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 - 2(OA)(OB)\cos\hat{AOB}$$

$$x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + y_1^2 + y_2^2 - 2y_1y_2 = x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 - 2(OA)(OB)\cos\hat{AOB}$$

και επειδή $(OA)(OB)\cos\hat{AOB} = \vec{a} \cdot \vec{b}$, έχουμε τελικά:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2$$

Δηλαδή:

“Το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων είναι ίσο με το άθροισμα των γινομένων των ομώνυμων συντεταγμένων τους”.

Για παράδειγμα, το εσωτερικό γινόμενο των $\vec{a} = (-3, 4)$ και $\vec{b} = (2, -1)$ είναι:
 $\vec{a} \cdot \vec{b} = (-3) \cdot 2 + 4(-1) = -10$.

Με τη βοήθεια της αναλυτικής έκφρασης του εσωτερικού γινομένου θα αποδείξουμε ότι ισχύουν οι επόμενες ιδιότητες:

- $(\lambda \vec{\alpha}) \cdot \vec{\beta} = \vec{\alpha} \cdot (\lambda \vec{\beta}) = \lambda(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})$
- $\vec{\alpha} \cdot (\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} + \vec{\alpha} \cdot \vec{\gamma}$ (Επιμεριστική Ιδιότητα)
- $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta} \Leftrightarrow \lambda_1 \lambda_2 = -1$, όπου $\lambda_1 = \lambda_{\vec{\alpha}}$ και $\lambda_2 = \lambda_{\vec{\beta}}$, εφόσον $\vec{\alpha}, \vec{\beta} \nparallel y'y$

Πράγματι, αν $\vec{\alpha} = (x_1, y_1)$, $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ και $\vec{\gamma} = (x_3, y_3)$, τότε έχουμε:

- $(\lambda \vec{\alpha}) \cdot \vec{\beta} = (\lambda x_1, \lambda y_1) \cdot (x_2, y_2) = (\lambda x_1)x_2 + (\lambda y_1)y_2 = \lambda(x_1x_2 + y_1y_2) = \lambda(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})$

και

$$\vec{\alpha} \cdot (\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = (x_1, y_1) \cdot (x_2 + x_3, y_2 + y_3) = x_1(x_2 + x_3) + y_1(y_2 + y_3) = \lambda(x_1x_2 + y_1y_2) = \lambda(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}).$$

Άρα,

$$(\lambda \vec{\alpha}) \cdot \vec{\beta} = \vec{\alpha} \cdot (\lambda \vec{\beta}) = \lambda(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})$$

- $\vec{\alpha} \cdot (\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = (x_1, y_1) \cdot (x_2 + x_3, y_2 + y_3) = x_1(x_2 + x_3) + y_1(y_2 + y_3)$
 $= (x_1x_2 + x_1x_3) + (y_1y_2 + y_1y_3) = (x_1x_2 + y_1y_2) + (x_1x_3 + y_1y_3)$
 $= \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} + \vec{\alpha} \cdot \vec{\gamma}.$
- $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0 \Leftrightarrow x_1x_2 + y_1y_2 = 0 \Leftrightarrow y_1y_2 = -x_1x_2 \Leftrightarrow \frac{y_1}{x_1} \frac{y_2}{x_2} = -1 \Leftrightarrow \lambda_1 \lambda_2 = -1$

Συνημίτονο Γωνίας δύο Διανυσμάτων

Αν $\vec{\alpha} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ είναι δύο μη μηδενικά διανύσματα του επιπέδου που σχηματίζουν γωνία θ , τότε $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| |\vec{\beta}| \cos \theta$ και επομένως,

$$\cos \theta = \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{\alpha}| |\vec{\beta}|}.$$

Είναι όμως

$$\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = x_1x_2 + y_1y_2, \quad |\vec{\alpha}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \quad \text{και} \quad |\vec{\beta}| = \sqrt{x_2^2 + y_2^2}.$$

Επομένως,

$$\cos \theta = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

Για παράδειγμα, αν θ είναι η γωνία των διανυσμάτων $\vec{\alpha} = (1, 2)$ και $\vec{\beta} = (3, 1)$, τότε:

$$\cos \theta = \frac{1 \cdot 3 + 2 \cdot 1}{\sqrt{1^2 + 2^2} \cdot \sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{5}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ οπότε } \theta = \frac{\pi}{4}.$$

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Αν $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι δύο διανύσματα του επιπέδου, να αποδειχτεί ότι:

(i) $|\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}| \leq |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|$

(ii) $(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})^2 \leq \vec{\alpha}^2 \vec{\beta}^2$

Πότε ισχύουν οι ισότητες;

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(i) Αν θ είναι η γωνία των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$, τότε έχουμε:

$$|\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}| = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \cdot \cos \theta = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \cdot |\cos \theta| \leq |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|.$$

Η ισότητα ισχύει μόνο, αν $\cos \theta = \pm 1$, δηλαδή, μόνο αν $\vec{\alpha} // \vec{\beta}$.

(ii) Επίσης, έχουμε $(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})^2 = |\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}|^2 \leq (|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|)^2 = |\vec{\alpha}|^2 \cdot |\vec{\beta}|^2 = \vec{\alpha}^2 \cdot \vec{\beta}^2$.

Η ισότητα ισχύει, όπως και προηγουμένως, μόνο όταν $\vec{\alpha} // \vec{\beta}$.

2. Έστω δύο διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ που έχουν μέτρα $|\vec{\alpha}| = \sqrt{3}$, $|\vec{\beta}| = 1$ και σχηματίζουν γωνία $\varphi = \frac{\pi}{6}$. Να βρεθεί η γωνία των διανυσμάτων $\vec{x} = \vec{\alpha} + \vec{\beta}$ και $\vec{y} = \vec{\alpha} - \vec{\beta}$.

ΛΥΣΗ

Αν θ είναι η γωνία των $\vec{x}$ και $\vec{y}$, τότε $\cos \theta = \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{|\vec{x}| \cdot |\vec{y}|}$. Αρκεί, επομένως, να υπο-

λογίσουμε το $\vec{x} \cdot \vec{y}$ και τα μέτρα των $\vec{x}$, $\vec{y}$.

Έχουμε λοιπόν

- $\vec{x} \cdot \vec{y} = (\vec{\alpha} + \vec{\beta})(\vec{\alpha} - \vec{\beta}) = \vec{\alpha}^2 - \vec{\beta}^2 = |\vec{\alpha}|^2 - |\vec{\beta}|^2 = 3 - 1 = 2$.

- $|\vec{x}|^2 = \vec{x}^2 = (\vec{\alpha} + \vec{\beta})^2 = \vec{\alpha}^2 + \vec{\beta}^2 + 2\vec{\alpha}\vec{\beta}$
 $= |\vec{\alpha}|^2 + |\vec{\beta}|^2 + 2|\vec{\alpha}||\vec{\beta}|\cos \varphi$
 $= 3 + 1 + 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 7.$


- $|\vec{y}|^2 = \vec{y}^2 = (\vec{\alpha} - \vec{\beta})^2 = \vec{\alpha}^2 + \vec{\beta}^2 - 2\vec{\alpha}\vec{\beta}$
 $= |\vec{\alpha}|^2 + |\vec{\beta}|^2 - 2|\vec{\alpha}||\vec{\beta}|\cos \varphi$
 $= 3 + 1 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1.$

Αρα, $\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{7} \cdot 1} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$, οπότε $\theta \cong 41^\circ$

3. Να αποδειχτεί ότι $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \eta\mu\alpha\eta\mu\beta$, όπου $0 \leq \beta < \alpha \leq \pi$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αν στον τριγωνομετρικό κύκλο τα διανύσματα $\overrightarrow{OA}$ και $\overrightarrow{OB}$ σχηματίζουν με τον άξονα x γωνίες α και β αντιστοίχως, τότε θα είναι $\overrightarrow{OA} = (\sin\alpha, \eta\mu\alpha)$ και $\overrightarrow{OB} = (\sin\beta, \eta\mu\beta)$.



Επομένως, θα έχουμε:

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = |\overrightarrow{OA}| \cdot |\overrightarrow{OB}| \cdot \sin(\alpha - \beta) = 1 \cdot 1 \cdot \sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha - \beta)$$

και

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = (\sin\alpha, \eta\mu\alpha)(\sin\beta, \eta\mu\beta) = \sin\alpha \cdot \sin\beta + \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta.$$

Άρα,


$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cdot \sin\beta + \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta$$

Προβολή Διανύσματος σε Διάνυσμα

Έστω $\vec{a}$, $\vec{v}$ δύο διανύσματα του επιπέδου με $\vec{a} \neq \vec{0}$. Με αρχή ένα σημείο O παίρνουμε τα διανύσματα $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{OM} = \vec{v}$. Από το M φέρνουμε κάθετο στη διεύθυνση του $\overrightarrow{OA}$ και έστω M_1 το ίχνος της καθέτου.

Το διάνυσμα $\overrightarrow{OM_1}$ λέγεται **προβολή του $\vec{v}$ στο $\vec{a}$** και συμβολίζεται με $\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{v}$. Δηλαδή,

$$\overrightarrow{OM_1} = \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{v}.$$



Αποδεικνύεται ότι η προβολή του $\vec{v}$ πάνω στο $\vec{a}$ είναι ανεξάρτητη από την επιλογή του σημείου O .

Για το εσωτερικό γινόμενο των $\vec{a}$ και $\vec{v}$ έχουμε:

$$\vec{a} \cdot \vec{v} = \vec{a} \cdot (\overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{M_1M}) = \vec{a} \cdot \overrightarrow{OM_1} + \vec{a} \cdot \overrightarrow{M_1M} = \vec{a} \cdot \overrightarrow{OM_1} = \vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{v}$$

Επομένως:

$$\vec{a} \cdot \vec{v} = \vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{v}$$

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Να βρεθεί η προβολή του διανύσματος $\vec{v}$ πάνω στο διάνυσμα $\vec{a}$, αν

$$|\vec{a}| = \frac{1}{2}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{3} \text{ και η γωνία των διανυσμάτων } \vec{a} \text{ και } \vec{v} \text{ είναι ίση με } \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

ΛΥΣΗ

Έστω $\vec{v}_1 = \text{προβ}_{\vec{a}} \vec{v}$. Τότε θα ισχύει $\vec{v}_1 = \lambda \vec{a}$. Επειδή $\vec{a} \cdot \vec{v} = \vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}} \vec{v}$, έχουμε:

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{v} &= \vec{a} \cdot \vec{v}_1 \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{v} = \vec{a} \cdot \lambda \vec{a} \\ &\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{a}^2 \\ &\Leftrightarrow |\vec{a}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \varphi = \lambda \cdot |\vec{a}|^2 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \lambda \cdot \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow \lambda = 3 \end{aligned}$$

Άρα, $\vec{v}_1 = 3\vec{a}$.


2. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (3,1)$ και $\vec{v} = (1,2)$. Να αναλυθεί το $\vec{v}$ σε δύο κάθετες συνιστώσες, από τις οποίες η μία να είναι παράλληλη στο $\vec{a}$.

ΛΥΣΗ

Έστω ε η ευθεία η κάθετη στη διεύθυνση του $\vec{a}$. Από το πέρας M του $\vec{v}$ φέρνουμε τις κάθετες MM_1 και MM_2 στη διεύθυνση του $\vec{a}$ και στην ε αντίστοιχως και έστω $\overrightarrow{OM_1} = \vec{v}_1$ και $\overrightarrow{OM_2} = \vec{v}_2$.

Έχουμε

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2.$$



Το διάνυσμα $\vec{v}_1$ είναι η προβολή του $\vec{v}$ στο $\vec{a}$ και επειδή $\vec{v}_1 // \vec{a}$, υπάρχει $\lambda \in \mathbf{R}$, τέτοιο ώστε $\text{προβ}_{\vec{a}} \vec{v} = \lambda \vec{a} = (3\lambda, \lambda)$. Όμως $\vec{a} \cdot \vec{v} = \vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}} \vec{v}$ και επομένως έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} (3,1) \cdot (1,2) &= (3,1) \cdot (3\lambda, \lambda) \\ 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 &= 3 \cdot 3\lambda + 1 \cdot \lambda \\ 5 &= 10\lambda \\ \lambda &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Συνεπώς, $\vec{v}_1 = \frac{1}{2} \vec{a} = \frac{1}{2}(3,1) = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ και $\vec{v}_2 = \vec{v} - \vec{v}_1 = (1,2) - \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Αν $\vec{\alpha} = (-1, 3)$ και $\vec{\beta} = (2, 5)$, τότε
 - (i) Να βρείτε τα εσωτερικά γινόμενα $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}$, $(2\vec{\alpha}) \cdot (-3\vec{\beta})$ και $(\vec{\alpha} - \vec{\beta}) \cdot (3\vec{\alpha} + \vec{\beta})$
 - (ii) Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τους $\kappa, \lambda \in \mathbf{R}$, ώστε το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων $\vec{u} = (\kappa, \lambda)$ και $\vec{\beta}$ να είναι ίσο με μηδέν. Ποια η σχέση όλων των διανυσμάτων $\vec{u}$ στην περίπτωση αυτή;
2. Αν $\vec{u} = (1, 2)$, $\vec{v} = (4, 2)$ και $\vec{w} = (6, 0)$, να υπολογίσετε τις παραστάσεις:
 $\vec{u} \cdot (7\vec{v} + \vec{w})$, $|\vec{u}|(\vec{v} \cdot \vec{w})$, $|(\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w}|$ και $(|\vec{u}| \cdot \vec{v}) \cdot \vec{w}$.
3. Αν $\vec{\alpha} = (1, 0)$ και $\vec{\beta} = (1, 1)$, να βρείτε τον $\lambda \in \mathbf{R}$, ώστε:
 - (i) Τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\alpha} + \lambda\vec{\beta}$ να είναι κάθετα
 - (ii) Τα διανύσματα $\vec{\beta}$ και $\vec{\alpha} + \lambda\vec{\beta}$ να είναι κάθετα.
4. Να βρείτε τα διανύσματα που είναι κάθετα στο $\vec{u} = (3, -2)$ και έχουν μέτρο ίσο με 1.
5. Αν $|\vec{\alpha}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 3$ και $\widehat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{\pi}{3}$, να υπολογίσετε τον $\kappa \in \mathbf{R}$, ώστε τα διανύσματα $\vec{u} = 3\vec{\alpha} - \vec{\beta}$ και $\vec{v} = \kappa\vec{\alpha} + 2\vec{\beta}$ να είναι κάθετα.
6. Αν $\vec{\alpha} = (\kappa, 1)$ και $\vec{\beta} = (4, 3)$, να βρείτε τον $\kappa \in \mathbf{R}$ ώστε να ισχύει:
 - (i) $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0$
 - (ii) $\widehat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{\pi}{4}$
 - (iii) $\vec{\alpha} \parallel \vec{\beta}$.
7. Αν $|\vec{\alpha}| = |\vec{\beta}| = 1$ και $\widehat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{2\pi}{3}$, να υπολογίσετε τη γωνία των διανυσμάτων $\vec{u} = 2\vec{\alpha} + 4\vec{\beta}$ και $\vec{v} = \vec{\alpha} - \vec{\beta}$.
8. Αν τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι μη μηδενικά, να αποδείξετε ότι:

$$\vec{\alpha} \perp (\vec{\alpha} - \vec{\beta}) \Leftrightarrow \sin(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \frac{|\vec{\alpha}|}{|\vec{\beta}|}.$$
9. Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα $\vec{u} = |\vec{\alpha}| \cdot \vec{\beta} + |\vec{\beta}| \cdot \vec{\alpha}$ και $\vec{v} = |\vec{\alpha}| \cdot \vec{\beta} - |\vec{\beta}| \cdot \vec{\alpha}$ είναι κάθετα.

10. Να αποδείξετε ότι για δύο μη μηδενικά διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$, το διάνυσμα $\vec{v} = \vec{\beta}^2 \vec{\alpha} - (\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}) \vec{\beta}$ είναι κάθετο στο $\vec{\beta}$.

11. Δίνονται τα σημεία $A(3, -2)$, $B(6, -4)$, $\Gamma(1, 5)$ και $\Delta(-1, 2)$. Να υπολογίσετε


(i) Το εσωτερικό γινόμενο $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{\Gamma\Delta}$

(ii) Τι συμπεραίνετε για τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$;

12. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (2, -4)$ και $\vec{\beta} = (-8, 5)$. Να αναλύσετε το $\vec{\beta}$ σε δύο κάθετες συνιστώσες, από τις οποίες η μία να είναι παράλληλη προς το $\vec{\alpha}$.

13. Να υπολογίσετε τα μήκη των διαγωνίων ενός παραλληλογράμμου που κατασκευάζεται με τα διανύσματα $5\vec{\alpha} + 2\vec{\beta}$ και $\vec{\alpha} - 3\vec{\beta}$, αν $|\vec{\alpha}| = 2\sqrt{2}$, $|\vec{\beta}| = 3$ και $(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = 45^\circ$.

14. Για τα διανύσματα του διπλανού σχήματος να υπολογίσετε την παράσταση $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A\Gamma} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{\Gamma\Delta}$.



15. Να εξετάσετε πότε ισχύει:

(i) $|\vec{\alpha} + \vec{\beta}| = |\vec{\alpha}| + |\vec{\beta}|$

(ii) $||\vec{\alpha}| - |\vec{\beta}|| = |\vec{\alpha} + \vec{\beta}|$

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι μη μηδενικά και μη συγγραμμικά. Να αποδείξετε ότι για όλους τους πραγματικούς αριθμούς λ και μ ισχύει:

$$\lambda^2 \vec{\alpha}^2 + 2\lambda\mu(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}) + \mu^2 \vec{\beta}^2 \geq 0.$$

Πότε ισχύει το "=";

2. Να αποδείξετε ότι:

$$(i) |\vec{u} + \vec{v}|^2 + |\vec{u} - \vec{v}|^2 = 2|\vec{u}|^2 + 2|\vec{v}|^2 \quad (ii) \vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} |\vec{u} + \vec{v}|^2 - \frac{1}{4} |\vec{u} - \vec{v}|^2.$$

3. Δίνονται τα μη μηδενικά και μη συγγραμμικά διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$. Να αποδείξετε ότι:


- (i) Ο φορέας του διανύσματος $\vec{u} = |\vec{\beta}| \vec{\alpha} + |\vec{\alpha}| \vec{\beta}$ διχοτομεί τη γωνία των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$.
- (ii) Ο φορέας του διανύσματος $\vec{v} = |\vec{\beta}| \vec{\alpha} - |\vec{\alpha}| \vec{\beta}$ διχοτομεί την παραπληρωματική γωνία των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$.
4. Αν $|\vec{\alpha}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 1$, $|\vec{\gamma}| = 3$ και $2\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0}$, να υπολογίσετε τα:
- (i) $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}$, $\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma}$, $\vec{\gamma} \cdot \vec{\alpha}$
- (ii) $\sin(\hat{\vec{\alpha}}, \hat{\vec{\beta}})$, $\sin(\hat{\vec{\beta}}, \hat{\vec{\gamma}})$, $\sin(\hat{\vec{\gamma}}, \hat{\vec{\alpha}})$, και να αποδείξετε ότι $\vec{\alpha} = -2\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma} = 3\vec{\beta}$.
5. Αν τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (\kappa, \lambda)$ και $\vec{\beta} = (\mu, \nu)$ είναι κάθετα και έχουν μέτρα ίσα με τη μονάδα, να δείξετε ότι $(\kappa\nu - \lambda\mu)^2 = 1$.
6. Να αποδείξετε ότι $-1 \leq \frac{\alpha\gamma + \beta\delta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \sqrt{\gamma^2 + \delta^2}} \leq 1$.

7. Σε ημικύκλιο με διάμετρο AB και κέντρο O παίρνουμε σημείο M .

(i) Να εκφράσετε τα διανύσματα $\vec{MA}$ και $\vec{MB}$

ως συνάρτηση των $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$.

(ii) Να βρείτε το γινόμενο $\vec{MA} \cdot \vec{MB}$. Τι συμπεραίνετε για τη γωνία των διανυσμάτων $\vec{MA}$ και $\vec{MB}$; Ποια πρόταση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας έχει αποδειχτεί;




8. Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ τα δύο ύψη του BE και ΓZ τέμνονται στο H . Έστω $\vec{HA} = \vec{\alpha}$, $\vec{HB} = \vec{\beta}$ και $\vec{H\Gamma} = \vec{\gamma}$.

(i) Να εκφράσετε τα διανύσματα $\vec{AB}$, $\vec{A\Gamma}$ και $\vec{B\Gamma}$ ως συνάρτηση των $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$.


(ii) Να αποδείξετε ότι $\vec{\gamma} \cdot \vec{\alpha} = \vec{\gamma} \cdot \vec{\beta}$ και $\vec{\gamma} \cdot \vec{\beta} = \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}$.

(iii) Από το προηγούμενο ερώτημα προκύπτει ότι $\vec{\gamma} \cdot \vec{\alpha} = \vec{\beta} \cdot \vec{\alpha}$.




Με τη βοήθεια της ισότητας αυτής να δείξετε ότι $AH \perp B\Gamma$. Ποια πρόταση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας έχει αποδειχτεί;

9. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και εξωτερικώς αυτού κατασκευάζουμε τα τετράγωνα $ABEZ$ και $A\Gamma H\Theta$. Να εκφράσετε τα διανύσματα $\overrightarrow{B\Theta}$ και $\overrightarrow{Z\Gamma}$ ως συνάρτηση των $\vec{\beta}_1, \vec{\beta}_2, \vec{\gamma}_1, \vec{\gamma}_2$ και να υπολογίσετε το εσωτερικό γινόμενο $\overrightarrow{B\Theta} \cdot \overrightarrow{Z\Gamma}$. Τι συμπεραίνετε για τα τμήματα $B\Theta$ και ΓZ ;



10. Στο διπλανό σχήμα το $AB\Gamma\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο και τα B', Δ' οι προβολές του Γ στις AB και $A\Delta$ αντιστοίχως. Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{A\Delta} \cdot \overrightarrow{A\Delta'} = \overrightarrow{A\Gamma}^2$



11. Δίνεται κύκλος (O, R) και σημείο M του επιπέδου του. Αν μεταβλητή ευθεία που διέρχεται από το M τέμνει τον κύκλο στα A και B , να αποδείξετε ότι το γινόμενο $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ είναι σταθερό. (Το γινόμενο αυτό λέγεται *δύναμη του σημείου M ως προς τον κύκλο O*).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Αν υπάρχουν πραγματικοί αριθμοί κ, λ, μ με $|\kappa| + |\lambda| + |\mu| \neq 0$, τέτοιοι, ώστε

$$\kappa + \lambda + \mu = 0 \text{ και } \kappa \overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB} + \mu \overrightarrow{OG} = \vec{0}$$


να αποδείξετε ότι τα σημεία A, B και Γ είναι συνευθειακά και αντιστρόφως.

2. Αν για το σημείο M του επιπέδου ενός τριγώνου $AB\Gamma$ ισχύουν οι σχέσεις $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{A\Gamma}$ και $\overrightarrow{BM} = \lambda \overrightarrow{A\Gamma} + \mu \overrightarrow{BA}$, να αποδείξετε ότι το M είναι το μέσον της πλευράς $B\Gamma$.

3. Έστω O και A δύο σταθερά σημεία του επιπέδου με $|\overrightarrow{OA}| = 3$. Ποια γραμμική γράφουν τα σημεία M του επιπέδου για τα οποία είναι $\overrightarrow{OM} \cdot (\overrightarrow{OM} - 2\overrightarrow{OA}) = 7$;

4. Δίνονται δύο μη μηδενικά διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$. Αν υπάρχει $\lambda \in \mathbf{R}$, τέτοιος, ώστε $|\vec{\alpha} + \lambda\vec{\beta}| = 1$, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του παραλληλόγραμμου $OA\Gamma B$ με $\overrightarrow{OA} = \vec{\alpha}$ και $\overrightarrow{OB} = \vec{\beta}$ είναι μικρότερο ή ίσο του $|\vec{\beta}|$.
5. Έστω O το περίκεντρο τριγώνου $AB\Gamma$ (δηλαδή το σημείο για το οποίο ισχύει $OA = OB = O\Gamma$), και έστω, $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ τα διανύσματα θέσεως των κορυφών A , B και Γ αντιστοίχως με σημείο αναφοράς το O .
- (i) Να δείξετε ότι το σημείο H με διάνυσμα θέσεως $\overrightarrow{OH} = \vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma}$ είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου $AB\Gamma$.
- (ii) Να βρείτε το διάνυσμα θέσεως του βαρύκεντρου του τριγώνου $AB\Gamma$ με σημείο αναφοράς το O .
- (iii) Να αποδείξετε ότι το περίκεντρο O , το βαρύκεντρο G και το ορθόκεντρο H ενός τριγώνου $AB\Gamma$ είναι συνευθειακά σημεία και ότι G διαιρεί το τμήμα OH σε λόγο $\frac{1}{2}$.

6. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma A'$ και κύκλος κέντρου O που διέρχεται από την κορυφή A και τέμνει τις ευθείες AB , $A\Gamma$ και AA' στα B' , Γ' και A' αντιστοίχως. Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{A\Gamma} \cdot \overrightarrow{A\Gamma'}$.




7. Έστω ένα τρίγωνο $AB\Gamma$, G το κέντρο βάρους του και A , E τα σημεία που ορίζονται από τις ισότητες

$$\overrightarrow{BA} = \frac{1}{3} \overrightarrow{A\Gamma} \text{ και } \overrightarrow{\Gamma E} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}.$$

Αν I είναι το μέσο του AE , να αποδείξετε ότι το G είναι το μέσο του AI .

8. Στο διπλανό σχήμα τα $OAE\Delta$, $OBZ\Gamma$ και $A\Gamma H\Theta$ είναι τετράγωνα και τα K , A , M είναι τα κέντρα τους. Αφού βρείτε τις συντεταγμένες των K , A και M , να αποδείξετε ότι

$$|\overrightarrow{AK}| = |\overrightarrow{KM}| \text{ και } \overrightarrow{AK} \perp \overrightarrow{KM}$$



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1. Δίνεται ότι το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι ρόμβος. Καθεμία από τις παρακάτω ισότητες είναι σωστή ή λάθος. Αν είναι σωστή, κυκλώστε το γράμμα Σ, αν είναι λάθος κυκλώστε το Λ.

- | | |
|---|--|
| (i) $\overline{AB} = \overline{\Delta\Gamma}$ Σ Λ | (ii) $\overline{AB} = \overline{B\Delta}$ Σ Λ |
| (iii) $\overline{AB} = \overline{\Gamma\Delta}$ Σ Λ | (iv) $ \overline{AB} = \overline{\Delta\Gamma} $ Σ Λ |
| (v) $\overline{AB} = \overline{A\Delta}$ Σ Λ | (vi) $ \overline{AB} = \overline{B\Gamma} $ Σ Λ |

2. Αν A, B, Γ και Δ είναι τέσσερα σημεία, να συμπληρώσετε τις ισότητες:


- | | |
|--|--|
| (i) $\overline{AB} + \overline{B\Gamma} = \dots$ | (vi) $\overline{A\Gamma} + \overline{\Gamma\Delta} - \overline{B\Delta} = \dots$ |
| (ii) $\overline{AB} - \overline{\Delta B} = \dots$ | (vii) $\overline{\Gamma B} + \overline{B\Delta} - \overline{A\Delta} = \dots$ |
| (iii) $\overline{AB} + \overline{B\Gamma} + \overline{\Gamma\Delta} = \dots$ | (viii) $\overline{A\Delta} + \overline{\Delta B} + \overline{B\Delta} = \dots$ |
| (iv) $\overline{B\Delta} - \overline{\Gamma\Delta} = \dots$ | (ix) $\overline{AB} + \overline{B\Delta} - \overline{\Gamma\Delta} - \overline{A\Gamma} = \dots$ |
| (v) $\overline{AB} - \overline{\Delta B} + \overline{\Delta\Gamma} = \dots$ | |

3. Αν O είναι το σημείο τομής των διαγωνίων του παραλληλόγραμμου $AB\Gamma\Delta$, να συμπληρώσετε τις ισότητες:

- | | |
|---|---|
| (i) $2\overline{AB} + \overline{B\Delta} = \dots$ | (iv) $2\overline{A\Gamma} - \overline{B\Gamma} - 2\overline{AB} = \dots$ |
| (ii) $\frac{1}{2}\overline{A\Gamma} + \frac{1}{2}\overline{\Delta B} = \dots$ | (v) $\overline{AB} + \overline{A\Delta} + \overline{B\Gamma} + \overline{\Delta\Gamma} = \dots$ |
| (iii) $\overline{A\Gamma} + \overline{AO} - \overline{GO} = \dots$ | |

4. Για τα διανύσματα του διπλανού σχήματος να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.

- i) $|\overline{AM} + \overline{MB}| > |\overline{AN} + \overline{NB}|$
 ii) $|\overline{AM} + \overline{MB}| = |\overline{AN} + \overline{NB}|$
 iii) $|\overline{AM} + \overline{MB}| < |\overline{AN} + \overline{NB}|$



5. Σε ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο δίνεται το σημείο $A(-3, -2)$. Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

- (i) Συμμετρικό του A ως προς τον x' : $A_1(.,.,.)$
 (ii) Συμμετρικό του A ως προς τον $y'y$: $A_2(.,.,.)$
 (iii) Συμμετρικό του A ως προς την αρχή O : $A_3(.,.,.)$
 (iv) Συμμετρικό του A ως προς τη διχοτόμο της $x\hat{O}y$: $A_4(.,.,.)$

6. Δίνονται τα σημεία $A(3, 1)$, $B(6, 5)$, $\Gamma(-4, -2)$, $\Delta(3, -3)$ και $E(-3, 5)$. Να συνδέσετε με μια γραμμή κάθε διάνυσμα της πρώτης στήλης με τις συντεταγμένες του στη δεύτερη στήλη

<u>Διάνυσμα</u>	<u>Συντεταγμένες διανύσματος</u>
$\overline{AB}$	$(0, -4)$
$\overline{A\Gamma}$	$(3, 4)$
$\overline{AE}$	$(-7, 3)$
$\overline{A\Delta}$	$(-6, 4)$
$\overline{BE}$	$(-9, 0)$

7. Δίνονται τα σημεία $A(3, 2)$, $B(-4, 5)$, $\Gamma(-3, -2)$, $\Delta(3, -4)$. Να συνδέσετε με μια γραμμή κάθε τμήμα της πρώτης στήλης με τις συντεταγμένες του μέσου του στη δεύτερη στήλη.

<u>Τμήμα</u>	<u>Συντεταγμένες μέσου</u>
AB	$(0, 0)$
$B\Gamma$	$\left(-\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right)$
$\Gamma\Delta$	$\left(-\frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right)$
$A\Gamma$	$(0, -3)$

8. Να βάλετε σε κύκλο τον αριθμό που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

- (i) Δίνεται το διάνυσμα $\vec{a} = (3, -2)$ και τα σημεία $A(4, -1)$, $B(-2, 7)$, $\Gamma(0, 3)$ και $\Delta(1, 5)$. Ποιο από τα διανύσματα είναι ίσο με το $\vec{a}$:


1. $\overline{AB}$ 2. $\overline{A\Gamma}$ 3. $\overline{\Delta B}$ 4. $\overline{B\Delta}$ 5. $\overline{A\Gamma}$

(ii) Δίνεται το διάνυσμα $\vec{\alpha} = (3, -2)$. Ποιο από τα διανύσματα είναι παράλληλο με το $\vec{\alpha}$:

1. $\vec{\beta} = (8, 4)$ 2. $\vec{\gamma} = (-4, -2)$ 3. $\vec{\delta} = (-6, 3)$ 4. $\vec{\varepsilon} = (-6, 4)$

9. Δίνονται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ με κέντρο O και πλευρά α . Να βρείτε ως συνάρτηση του α τα εσωτερικά γινόμενα:

- (i) $\overline{AB} \cdot \overline{AD}$ (iv) $\overline{OA} \cdot \overline{OF}$
 (ii) $\overline{AB} \cdot \overline{AF}$ (v) $\overline{AB} \cdot \overline{AG}$
 (iii) $\overline{OA} \cdot \overline{OB}$ (vi) $\overline{AB} \cdot \overline{GA}$.



10. Τα διανύσματα $\vec{u}$ και $\vec{v}$ έχουν μέτρα 2 και 3 αντιστοίχως. Να βρείτε το γινόμενο $\vec{u} \cdot \vec{v}$, αν η γωνία των διανυσμάτων αυτών είναι: i) 0° ii) 30°
 iii) 60° iv) 90° v) 120° vi) 150° vii) 180° .

11. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση:


Αν $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w}$ και $\vec{u} \neq \vec{0}$, τότε Α. $\vec{v} = \vec{w}$ Β. $\vec{v} // \vec{w}$ Γ. $\vec{u} \perp \vec{v} - \vec{w}$ Δ. $\vec{u} \perp \vec{v} + \vec{w}$.

12. Να συνδέσετε με μια γραμμή κάθε ζεύγος διανυσμάτων της πρώτης στήλης με το είδος της γωνίας τους που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη.

<u>Διανύσματα</u>	<u>Γωνία</u>
1. $\vec{u} = (7, 5), \vec{v} = (-1, 2)$	ορθή
2. $\vec{u} = (-3, 4), \vec{v} = (2, -1)$	
3. $\vec{u} = (3, 5), \vec{v} = (6, 0)$	οξεία
4. $\vec{u} = (0, -1), \vec{v} = (-5, 4)$	
5. $\vec{u} = (-2, 3), \vec{v} = (3, 2)$	αμβλεία
6. $\vec{u} = (\kappa, \lambda), \vec{v} = (-\lambda, \kappa)$	

13. Για τα διανύσματα του παρακάτω σχήματος να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση:

- (i) $\overline{AB} \cdot \overline{AD} > \overline{AB} \cdot \overline{AF}$
 (ii) $\overline{AB} \cdot \overline{AD} < \overline{AB} \cdot \overline{AF}$
 (iii) $\overline{AB} \cdot \overline{AD} = \overline{AB} \cdot \overline{AF}$




2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Εισαγωγή


Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους αρχαίους γεωγράφους. Στην εφαρμογή αυτής της ιδέας στη Γεωμετρία στηρίζεται η έννοια της εξίσωσης μιας καμπύλης, δηλαδή της αλγεβρικής ισότητας που ικανοποιείται από τις συντεταγμένες των σημείων της καμπύλης (και μόνο αυτών). Η έννοια αυτή θεωρείται σήμερα τόσο απλή, ώστε η διδασκαλία της να αρχίζει από το Γυμνάσιο. Στην πραγματικότητα όμως η εξέλιξη της χρειάστηκε πολύ χρόνο και υπήρξε το αποτέλεσμα μιας σύνθεσης ανάμεσα στη Γεωμετρία και στην Άλγεβρα, με επαναστατικές συνέπειες για τα Μαθηματικά και τις Θετικές Επιστήμες. Η ανάγκη και τα πρώτα ίχνη ενός “συστήματος αναφοράς” εμφανίζονται στην αρχαία ελληνική Γεωμετρία κατά τη μελέτη των κωνικών τομών (δηλαδή της παραβολής, της υπερβολής και της έλλειψης, τις οποίες θα μελετήσουμε παρακάτω). Ο Απολλώνιος στο 1ο βιβλίο των “Κωνικών”, αφού ορίζει αυτές τις καμπύλες στερεομετρικά ως τομές του κώνου από ένα επίπεδο, χρησιμοποιεί δύο συγκεκριμένες ευθείες του σχήματος, για να αποδείξει χαρακτηριστικές ιδιότητες κάθε καμπύλης.

Για παράδειγμα, στην παραβολή του διπλανού σχήματος αποδεικνύει ότι αν φέρουμε την κάθετη KA (“τεταγμένως καταγόμενη”) από σημείο της καμπύλης προς τη διάμετρο ZH , τότε το τετράγωνο με πλευρά KA είναι ισοδύναμο με το ορθογώνιο που έχει πλευρές ZA , $Z\Theta$, όπου $Z\Theta$ ένα τμήμα κάθετο στην ZH στην κορυφή καμπύλης (το μήκος του οποίου προσδιορίζεται από το είδος του κώνου και από τη θέση του τέμνοντος επιπέδου).



Η σχέση $KL^2 = Z\Theta \cdot Z\Lambda$ “ισοδυναμεί” βέβαια με τη σύγχρονη εξίσωση $y^2 = 2px$ της παραβολής, όπου x, y οι συντεταγμένες των σημείων της ως προς ένα ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων με άξονες τον άξονα συμμετρίας της παραβολής και την κάθετη σ’ αυτόν στην κορυφή της.

Η βασική διαφορά ανάμεσα στην αρχαία και στη σύγχρονη μέθοδο βρίσκεται στο γεγονός ότι η τελευταία χρησιμοποιεί τη συμβολική αναπαράσταση των γεωμετρικών σχέσεων και αξιοποιεί την ευελιξία του αλγεβρικού λογισμού (που εκφράζεται με τη χρήση αρνητικών συντεταγμένων κτλ.). Αυτό το αποφασιστικό βήμα έγινε γύρω



στο 1630 από τους R. Descartes και P. Fermat, οι οποίοι επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν στη μελέτη δύσκολων προβλημάτων της αρχαίας ελληνικής Γεωμετρίας τη συμβολική Άλγεβρα που είχε δημιουργηθεί στη διάρκεια του 16ου αιώνα από τους Cardano, Viète κ.ά. Στα έργα των Descartes και Fermat δεν υπάρχουν οι άξονες συντεταγμένων ή οι εξισώσεις των καμπύλων που χρησιμοποιούμε σήμερα, αλλά περιγράφεται με συστηματικό τρόπο η διαδικασία αναγωγής ενός γεωμετρικού προβλήματος σε αλγεβρικό (ή αντίστροφα). Ιδιαίτερη επίδραση είχε το έργο του Descartes “La Géométrie” (1637), στο οποίο –ακριβώς για να γίνει πιο αποτελεσματική η χρήση του αλγεβρικού λογισμού στη Γεωμετρία– εισάγονται νέοι συμβολισμοί (όπως, για παράδειγμα, η εκθετική γραφή των δυνάμεων), που φέρνουν ουσιαστικά την Άλγεβρα στη σημερινή μορφή της.

Ύστερα από την πρώτη σύνθεση της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας, οι εξελίξεις υπήρξαν ραγδαίες και οδήγησαν στην κεντρική έννοια της σύγχρονης Αναλυτικής Γεωμετρίας:

“Η εξίσωση μιας καμπύλης, από βοηθητικό μέσο για τη λύση ενός γεωμετρικού προβλήματος, γίνεται μέσο ορισμού και αναπαράστασης αυτής της καμπύλης”.

Ο J. Wallis, στο βιβλίο του “Tractatus de sectionibus conicis” (1655), ορίζει την έλλειψη, την παραβολή και την υπερβολή τόσο με τον κλασικό τρόπο, ως τομές κώνου, όσο και με εξισώσεις 2ου βαθμού, ενώ ο I. Newton το 1676 χρησιμοποιεί με συστηματικό τρόπο δύο άξονες και αρνητικές συντεταγμένες, για να μελετήσει και να ταξινομήσει τις καμπύλες τρίτου βαθμού. Στην εργασία επίσης του Newton “Artis analyticae specimina vel geometria analytica” (που δημοσιεύτηκε το 1779) χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο όρος “Αναλυτική Γεωμετρία”. Οι εξελίξεις αυτές, που έλαβαν χώρα παράλληλα με τη δημιουργία του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού, διαμόρφωσαν ένα νέο κλάδο των Μαθηματικών. Ο 2ος τόμος του κλασικού έργου του L. Euler “Introductio in analysin infinitorum” (1748) αποτελεί ένα πλήρες διδακτικό εγχειρίδιο Αναλυτικής Γεωμετρίας, στο οποίο οι καμπύλες του επιπέδου και οι επιφάνειες του χώρου ορί-

ζονται και εξετάζονται αποκλειστικά μέσω των εξισώσεών τους ως προς ένα πλαγιογώνιο σύστημα συντεταγμένων.


2.1 ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ

Εξίσωση Γραμμής

Αν έχουμε μια εξίσωση με δύο αγνώστους, για παράδειγμα την $y = x^2$, τότε λύση της εξίσωσης αυτής λέγεται κάθε ζεύγος αριθμών (x, y) που την επαληθεύει. Έτσι, για παράδειγμα, τα ζεύγη $(1, 1)$, $(2, 4)$, $(3, 9)$, $(0, 0)$,

$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$, $(\sqrt{3}, 3)$ είναι λύσεις της $y = x^2$.

Αν τώρα σε ένα σύστημα συντεταγμένων παραστήσουμε με σημεία όλες τις λύσεις της εξίσωσης $y = x^2$, τότε θα προκύψει η γραμμή C , του διπλανού σχήματος που, όπως γνωρίζουμε από προηγούμενες τάξεις λέγεται παραβολή.



Επειδή οι συντεταγμένες (x, y) των σημείων $M(x, y)$ της παραβολής C , και μόνο αυτές, επαληθεύουν την εξίσωση $y = x^2$, γι' αυτό η εξίσωση $y = x^2$ λέγεται εξίσωση της παραβολής C . Γενικά:

Μια εξίσωση με δύο αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση μιας γραμμής C , όταν οι συντεταγμένες των σημείων της C , και μόνο αυτές, την επαληθεύουν.


Στη συνέχεια, αντί να λέμε, για παράδειγμα, “δίνεται η παραβολή C με εξίσωση $y = x^2$ ”, θα λέμε “δίνεται η παραβολή $C : y = x^2$ ” ή απλώς “δίνεται η παραβολή $y = x^2$ ”

Με τις εξισώσεις των γραμμών μπορούμε με αλγεβρικές μεθόδους να μελετήσουμε τις γεωμετρικές ιδιότητες των γραμμών αυτών ή να αντιμετωπίσουμε διάφορα άλλα συναφή προβλήματα. Αυτό είναι και το βασικό αντικείμενο της Αναλυτικής Γεωμετρίας.

Συντελεστής Διεύθυνσης Ευθείας


Η ευθεία γραμμή είναι η απλούστερη και η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γραμμή. Στην αναζήτηση της εξίσωσης μιας ευθείας θα μας διευκολύνει η έννοια του συντελεστή διεύθυνσης ευθείας.

• Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και ε μια ευθεία που τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο A .



Τη γωνία ω που διαγράφει ο άξονας $x'x$ όταν στραφεί γύρω από το A κατά τη θετική φορά μέχρι να συμπίψει με την ευθεία ε τη λέμε **γωνία που σχηματίζει η ε με τον άξονα $x'x$** . Αν η ευθεία ε είναι παράλληλη προς τον άξονα $x'x$, τότε λέμε ότι σχηματίζει με αυτόν γωνία $\omega = 0$. Σε κάθε περίπτωση για τη γωνία ω ισχύει $0^\circ \leq \omega < 180^\circ$ ή σε ακτίνια $0 \leq \omega < \pi$. Ως **συντελεστή διεύθυνσης** ή ως **κλίση** μιας ευθείας ε ορίζουμε την εφαπτομένη της γωνίας ω που σχηματίζει η ε με τον άξονα $x'x$. Προφανώς ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας είναι θετικός, αν η γωνία ω που σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ είναι οξεία και αρνητικός, αν είναι αμβλεία. Αν η ευθεία σχηματίζει με τον $x'x$ μηδενική γωνία, δηλαδή είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$, ο συντελεστής διεύθυνσης είναι ίσος με μηδέν. Στην περίπτωση που η γωνία της ευθείας ε με τον άξονα $x'x$ είναι 90° , δηλαδή η ευθεία ε είναι κάθετη στον άξονα $x'x$, δεν ορίζουμε συντελεστή διεύθυνσης για την ευθεία αυτή.


Όταν είναι γνωστά ένα σημείο μιας ευθείας και ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας, τότε μπορούμε να σχεδιάσουμε την ευθεία. Για παράδειγμα, για να σχεδιάσουμε την ευθεία που διέρχεται από το σημείο $A(-2,1)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -\frac{2}{3}$, αρκεί από το A



να κινηθούμε 3 μονάδες προς τα αριστερά και στη συνέχεια 2 μονάδες προς τα πάνω. Προσδιορίζουμε έτσι το σημείο $B(-5,3)$, οπότε η ζητούμενη ευθεία είναι η AB .

• Έστω τώρα ένα διάνυσμα $\vec{\delta}$ παράλληλο σε μια ευθεία ε . Αν φ και ω είναι οι γωνίες που σχηματίζουν το $\vec{\delta}$ και η ε με τον x' αντιστοίχως, τότε θα ισχύει $\varphi = \omega$ ή $\varphi = \pi + \omega$ και επομένως $\varepsilon\varphi\varphi = \varepsilon\varphi\omega$. Άρα:

“Όταν μια ευθεία και ένα διάνυσμα είναι παράλληλα, έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης”.



Αν είναι γνωστές οι συντεταγμένες δύο σημείων μιας μη κατακόρυφης ευθείας ε , δηλαδή μιας ευθείας που δεν είναι κάθετη στον άξονα x' , τότε μπορούμε να βρούμε και το συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας αυτής. Πράγματι, αν $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ είναι δύο σημεία της ευθείας ε , τότε ο συντελεστής διεύθυνσης της ε είναι ίσος με το συντελεστή διεύθυνσης του διανύσματος $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$, δηλαδή ίσος με $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Επομένως:

Ο συντελεστής διεύθυνσης λ μιας ευθείας που διέρχεται από τα σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$, με $x_1 \neq x_2$ είναι

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Για παράδειγμα, ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας που διέρχεται από τα

σημεία $A(1, -2)$ και $B(-1, 4)$ είναι $\lambda = \frac{4 - (-2)}{-1 - 1} = -3$.

Συνθήκες Καθετότητας και Παραλληλίας Ευθειών

Με τη βοήθεια του συντελεστή διεύθυνσης ευθείας, μπορούμε να διατυπώσουμε τις συνθήκες παραλληλίας και καθετότητας δύο ευθειών στο επίπεδο. Πράγματι, αν $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ είναι δύο ευθείες με αντίστοιχους συντελεστές διεύθυνσης λ_1, λ_2 και τα διανύσματα $\vec{\delta}_1$ και $\vec{\delta}_2$ είναι παράλληλα προς τις ε_1 και ε_2 αντιστοίχως, έχουμε τις ισοδυναμίες¹

$$\varepsilon_1 // \varepsilon_2 \Leftrightarrow \vec{\delta}_1 // \vec{\delta}_2 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2$$

και

$$\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2 \Leftrightarrow \vec{\delta}_1 \perp \vec{\delta}_2 \Leftrightarrow \lambda_1 \lambda_2 = -1.$$

Επομένως, αν οι ευθείες ε_1 και ε_2 έχουν συντελεστές διεύθυνσης λ_1 και λ_2 αντιστοίχως, τότε:

$$\varepsilon_1 // \varepsilon_2 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2$$


$$\text{και } \varepsilon_1 \perp \varepsilon_2 \Leftrightarrow \lambda_1 \lambda_2 = -1$$

Εξίσωση Ευθείας

Μια ευθεία στο επίπεδο καθορίζεται, όταν δίνονται ένα σημείο της και ο συντελεστής διεύθυνσής της ή δύο σημεία της. Θα βρούμε την εξίσωση της ευθείας σε καθεμιά από τις δύο αυτές περιπτώσεις.

- Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και $A(x_0, y_0)$ ένα σημείο του επιπέδου. Ζητάμε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από το A και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ .

Ένα σημείο $M(x, y)$ διαφορετικό του $A(x_0, y_0)$ ανήκει στην ε , αν και μόνο αν το διάνυσμα $\overline{AM}$ είναι παράλληλο στην ε , δηλαδή αν και μόνο αν το $\overline{AM}$ και η ε έχουν τον ίδιο



συντελεστή διεύθυνσης. Επειδή $\overline{AM} = (x - x_0, y - y_0)$, έχουμε $\lambda_{\overline{AM}} = \frac{y - y_0}{x - x_0}$.

Επομένως, το σημείο $M(x, y)$ ανήκει στην ε αν και μόνο αν $\frac{y - y_0}{x - x_0} = \lambda$ ή

¹ Με το συμβολισμό $\varepsilon_1 // \varepsilon_2$ εννοούμε ότι οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι παράλληλες ή συμπίπτουν.

$y - y_0 = \lambda(x - x_0)$. Η τελευταία εξίσωση επαληθεύεται και από το σημείο $A(x_0, y_0)$. Άρα η εξίσωση της ευθείας ε είναι:

$$y - y_0 = \lambda(x - x_0) \quad (1)$$


Για παράδειγμα, η ευθεία που διέρχεται από το σημείο $A(-1, 2)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -3$ έχει εξίσωση $y - 2 = -3(x + 1)$, δηλαδή $y = -3x - 1$.

• Έστω ε η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$.

Αν $x_1 \neq x_2$, τότε ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας είναι $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ και επομένως

η εξίσωση $y - y_0 = \lambda(x - x_0)$ γίνεται:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) \quad (2)$$



Οι εξισώσεις (1) και (2) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν η ευθεία ε είναι κατακόρυφη, αφού στην περίπτωση αυτή δεν ορίζεται ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας. Όμως η εξίσωση μιας κατακόρυφης ευθείας που διέρχεται από το σημείο $A(x_0, y_0)$ μπορεί να βρεθεί αμέσως, αφού κάθε σημείο της M έχει τετμημένη x_0 και άρα η εξίσωσή της είναι:


$$x = x_0$$

Για παράδειγμα, η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία $A(-3, 5)$ και $B(4, 1)$ έχει εξίσωση $y - 5 = \frac{1-5}{4+3}(x+3)$, η οποία μετά τις πράξεις γίνεται $y = -\frac{4}{7}x + \frac{23}{7}$ και η κατακόρυφη ευθεία που διέρχεται από το σημείο $A(-3, 5)$ έχει εξίσωση $x = -3$.

Ειδικές περιπτώσεις


• Η εξίσωση ευθείας που τέμνει τον άξονα y στο σημείο $A(0, \beta)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ είναι $y - \beta = \lambda(x - 0)$, η οποία τελικά γράφεται

$$y = \lambda x + \beta.$$




- Αν μια ευθεία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ , τότε η εξίσωσή της είναι $y - 0 = \lambda(x - 0)$ ή

$$y = \lambda x.$$




Έτσι, οι διχοτόμοι των γωνιών $x\hat{O}y$ και $y\hat{O}x'$ έχουν εξισώσεις $y = x$ και $y = -x$ αντιστοίχως.



- Τέλος, αν μια ευθεία διέρχεται από το σημείο $A(x_0, y_0)$ και είναι παράλληλη στον άξονα x' , δηλαδή είναι όπως λέμε μια οριζόντια ευθεία, έχει εξίσωση $y - y_0 = 0(x - x_0)$, δηλαδή


$$y = y_0.$$



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1.** Δίνεται τρίγωνο με κορυφές τα σημεία $A(-1,2)$, $B(1,5)$ και $\Gamma(4,1)$. Να βρεθούν οι εξισώσεις:

- Του ύψους που άγεται από την κορυφή A
- Της διαμέσου που άγεται από την κορυφή B
- Της μεσοκαθέτου της πλευράς AG .



ΛΥΣΗ

- (i) Επειδή $\lambda_{BG} = \frac{5-1}{1-4} = \frac{4}{-3} = -\frac{4}{3}$, ο συντελεστής

διεύθυνσης του ύψους του τριγώνου από το A είναι $\lambda = \frac{3}{4}$. Επομένως, η εξίσωση του ύψους είναι $y - 2 = \frac{3}{4}(x + 1)$ ή $y = \frac{3}{4}x + \frac{11}{4}$.

(ii) Το μέσον M του τμήματος AG έχει συντεταγμένες $\left(\frac{-1+4}{2}, \frac{2+1}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

Επομένως, ο συντελεστής διεύθυνσης της διαμέσου BM είναι $\lambda = \frac{\frac{3}{2} - 5}{\frac{3}{2} - 1} = -7$ και άρα

η εξίσωση της BM είναι $y - 5 = -7(x - 1)$, η οποία γράφεται ισοδύναμα $y = -7x + 12$.

(iii) Επειδή η ευθεία AG έχει συντελεστή διεύθυνσης $\frac{2-1}{-1-4} = -\frac{1}{5}$, η οποιαδήποτε κάθετος σε αυτήν έχει συντελεστή διεύθυνσης 5, επομένως η εξίσωση της μεσοκαθέτου είναι $y - \frac{3}{2} = 5\left(x - \frac{3}{2}\right)$ ή ισοδύναμα $y = 5x - 6$.


2. Δίνονται η ευθεία ε με εξίσωση $y = \frac{1}{2}x + 1$ και το σημείο $A(2, 1)$. Να βρεθούν οι συντεταγμένες του συμμετρικού του σημείου A ως προς την ευθεία ε .

ΛΥΣΗ

Αν $A'(\mu, \nu)$ είναι το συμμετρικό του A ως προς την ε , τότε το μέσον M του AA' ανήκει στην ε και το γινόμενο των συντελεστών διεύθυνσης των ε και AA' είναι -1 , αφού $\varepsilon \perp AA'$. Οι συντεταγμένες του μέσου M είναι $\left(\frac{\mu+2}{2}, \frac{\nu+1}{2}\right)$ και ο συντελεστής διεύθυνσης του AA' είναι $\frac{\nu-1}{\mu-2}$. Έτσι έχουμε το σύστημα

$$\begin{cases} \frac{\nu+1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu+2}{2} + 1 \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{\nu-1}{\mu-2} = -1 \end{cases}, \text{ το οποίο μετά την εκτέλεση των πράξεων γράφεται}$$

$$\begin{cases} \mu - 2\nu = -4 \\ 2\mu + \nu = 5 \end{cases}.$$



Από τη λύση του συστήματος αυτού βρίσκουμε $\mu = \frac{6}{5}$ και $\nu = \frac{13}{5}$. Επομένως, το συμμετρικό σημείο του A ως προς την ε είναι το $A'\left(\frac{6}{5}, \frac{13}{5}\right)$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε το συντελεστή διεύθυνσης:
 - (i) Της ευθείας, η οποία διέρχεται από τα σημεία $A(-1, 4)$ και $B(1, 6)$
 - (ii) Της ευθείας, η οποία τέμνει τους άξονες στα σημεία $\Gamma(-1, 0)$ και $\Delta(0, 2)$
 - (iii) Της ευθείας, η οποία διέρχεται από το O και είναι κάθετη στην $\Gamma\Delta$.
2. Να βρείτε τη γωνία, που σχηματίζουν με τον άξονα $x'x$ οι ευθείες που διέρχονται από τα σημεία:
 - (i) $A(-1, 4)$ και $B(1, 6)$ (ii) $A(-1, 3)$ και $B(0, 4)$
 - (iii) $A(1, 3)$ και $B(1, -1)$ (iv) $A(2, 3)$ και $B(-2, 3)$.
3. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $A(1, -1)$ και
 - (i) Είναι παράλληλη προς το διάνυσμα $\vec{\delta} = (3, -2)$
 - (ii) Είναι παράλληλη προς το διάνυσμα $\vec{\delta} = (0, 1)$
 - (iii) Σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία $\omega = \pi / 4$.
4. Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ με κορυφές $A(-1, 0)$, $B(3, 2)$ και $\Gamma(-3, 4)$. Να βρείτε:
 - (i) Τις εξισώσεις των υψών του
 - (ii) Τις εξισώσεις των μεσοκαθέτων των πλευρών του.
5. Να δείξετε ότι το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με κορυφές $A(3, 1)$, $B(5, 5)$, $\Gamma(1, 3)$ και $\Delta(-1, -1)$ είναι ρόμβος. Ποιες είναι οι εξισώσεις των διαγωνίων του;
6. Να δείξετε ότι τα σημεία $A(1, -1)$, $B(2, 0)$ και $\Gamma(-1, -3)$ είναι συνευθειακά.
7. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία $A(\sin\theta, \eta\mu\theta)$ και $B(\eta\mu\theta, \sin\theta)$, αν $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ και $\theta \neq \frac{\pi}{4}$. Για ποια τιμή του θ η ευθεία αυτή διέρχεται από την αρχή των αξόνων;
8. Δίνονται τα σημεία $A(2, 3)$, $B(-4, 5)$ και $\Gamma(3, -4)$. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από την κορυφή A και το κέντρο βάρους G του τριγώνου $AB\Gamma$.

Β' ΟΜΑΔΑΣ


1. Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών, που διέρχονται από το σημείο $A(-1, 2)$ και σχηματίζουν με τους άξονες ισοσκελές τρίγωνο.
2. Να βρείτε τις εξισώσεις των πλευρών και τις συντεταγμένες των κορυφών B και Γ του τριγώνου $AB\Gamma$, του οποίου τα δύο ύψη έχουν εξισώσεις $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ και $y = -x + 2$ αντιστοίχως και η κορυφή A έχει συντεταγμένες $(1, 4)$.
3. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $M(2, 1)$ και τέμνει τις ευθείες $y = x + 1$ και $y = -x + 1$ στα σημεία A και B αντιστοίχως, έτσι ώστε το M να είναι μέσο του AB .
4. Δίνονται τα σημεία $P(\kappa, 1/\kappa)$ και $Q(\lambda, 1/\lambda)$, με $\kappa, \lambda \neq 0$ και $\kappa \neq \lambda$.
 - (i) Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας PQ .
 - (ii) Αν η ευθεία PQ τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία A και B αντιστοίχως, να δείξετε ότι $AP = BQ$.
5. Να δείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας που τέμνει τους άξονες στα σημεία $A(\alpha, 0)$ και $B(0, \beta)$, με $\alpha, \beta \neq 0$, είναι η $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1$.
6. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη στην ευθεία $y = -\frac{2}{3}x - \frac{11}{3}$ και τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία A και B , ώστε το άθροισμα της τετμημένης του A και της τεταγμένης του B να είναι ίσο με 15.

2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

Η Εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$, με $A \neq 0$ ή $B \neq 0$

- Έστω ε μια ευθεία στο καρτεσιανό επίπεδο.


— Αν η ευθεία ε τέμνει τον άξονα yy' στο σημείο $\Sigma(0, \beta)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ , τότε θα έχει εξίσωση $y = \lambda x + \beta$, η οποία γράφεται $\lambda x + (-1)y + \beta = 0$



- Αν η ευθεία ε είναι κατακόρυφη και διέρχεται από το σημείο $P(x_0, y_0)$, τότε θα έχει εξίσωση $x = x_0$, η οποία γράφεται ισοδύναμα

$$x + 0 \cdot y + (-x_0) = 0.$$

Βλέπουμε, δηλαδή, ότι και στις δύο περιπτώσεις η εξίσωση της ευθείας ε παίρνει τη μορφή $Ax + By + \Gamma = 0$ με $A \neq 0$ ή $B \neq 0$.



- Αντιστρόφως, έστω η εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$ με $A \neq 0$ ή $B \neq 0$.

— Αν $B \neq 0$, τότε η εξίσωση γράφεται

$y = -\frac{A}{B}x - \frac{\Gamma}{B}$, που είναι εξίσωση ευθείας με συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -\frac{A}{B}$ και η οποία τέμνει τον άξονα yy' στο σημείο $\left(0, -\frac{\Gamma}{B}\right)$.

— Αν $B = 0$, τότε, λόγω της υπόθεσης, είναι $A \neq 0$ και η εξίσωση γράφεται

$x = -\frac{\Gamma}{A}$, που είναι εξίσωση ευθείας κάθετης στον άξονα $x'x$ στο σημείο του $P\left(-\frac{\Gamma}{A}, 0\right)$.

Σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις η εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$ με $A \neq 0$ ή $B \neq 0$ παριστάνει ευθεία. Αποδεικνύουμε, δηλαδή, ότι ισχύει το επόμενο θεώρημα:

ΘΕΩΡΗΜΑ

Κάθε ευθεία του επιπέδου έχει εξίσωση της μορφής

$$Ax + By + \Gamma = 0 \text{ με } A \neq 0 \text{ ή } B \neq 0 \quad (1)$$

και αντιστρόφως, κάθε εξίσωση της μορφής (1) παριστάνει ευθεία γραμμή.

Για παράδειγμα, η εξίσωση $2x + y - 6 = 0$ παριστάνει ευθεία. Η εξίσωση αυτή γράφεται στη μορφή $y = -2x + 6$ και βλέπουμε ότι έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -2$ και τέμνει τον άξονα yy' στο σημείο $(0, 6)$.

Διάνυσμα Παράλληλο ή Κάθετο σε Ευθεία

Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και ε μια ευθεία του επιπέδου με εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$. Είδαμε προηγουμένως ότι:

— Αν $B \neq 0$, τότε η ε έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -\frac{A}{B}$ και επομένως είναι παράλληλη προς το διάνυσμα $\vec{\delta} = (B, -A)$.

— Αν $B = 0$, τότε η ε είναι παράλληλη προς τον άξονα yy' και επομένως παράλληλη και πάλι προς το διάνυσμα $\vec{\delta} = (B, -A)$.

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ισχύει ότι:

Η ευθεία με εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$ είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{\delta} = (B, -A)$.


Όμως, το διάνυσμα $\vec{\delta} = (B, -A)$ είναι κάθετο στο διάνυσμα $\vec{n} = (A, B)$, αφού

$$\vec{\delta} \cdot \vec{n} = (B, -A) \cdot (A, B) = AB - AB = 0.$$

Επομένως:

Η ευθεία με εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$ είναι κάθετη στο διάνυσμα $\vec{n} = (A, B)$.

Για παράδειγμα, η ευθεία $2x - y + 4 = 0$ είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{\delta} = (-1, -2)$ και κάθετη στο διάνυσμα $\vec{n} = (2, -1)$.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Δίνεται η εξίσωση:

$$(x - 2y + 5) + \lambda(3x + 2y + 7) = 0 \quad (1), \text{ όπου } \lambda \in \mathbb{R}$$

(i) Να αποδειχτεί ότι

— Για κάθε τιμή της παραμέτρου λ η εξίσωση (1) παριστάνει ευθεία γραμμή
 — Όλες οι ευθείες που ορίζονται από την εξίσωση (1) (Οικογένεια ευθειών) διέρχονται από το ίδιο σημείο.

(ii) Ποια από τις παραπάνω ευθείες είναι κάθετη στην ευθεία $\zeta : y = 2x$;

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(i) Η εξίσωση (1) γράφεται ισοδύναμα

$$(1 + 3\lambda)x + (-2 + 2\lambda)y + (5 + 7\lambda) = 0. \quad (2)$$

Επειδή δεν υπάρχει τιμή του λ για την οποία να μηδενίζονται και ο συντελεστής του x και ο συντελεστής του y , η εξίσωση (2) παριστάνει ευθεία για κάθε τιμή του $\lambda \in \mathbf{R}$. Για να δείξουμε ότι όλες οι ευθείες της οικογένειας (1) διέρχονται από το ίδιο σημείο, αρκεί να βρούμε ένα σημείο $K(x_0, y_0)$ του οποίου οι συντεταγμένες να επαληθεύουν την (1) για όλες τις τιμές του λ . Το ζητούμενο σημείο θα είναι εκείνο του οποίου οι συντεταγμένες μηδενίζουν τις παραστάσεις $x - 2y + 5$ και $3x + 2y + 7$, δηλαδή η λύση του συστήματος

$$x - 2y + 5 = 0 \quad \text{και} \quad 3x + 2y + 7 = 0.$$

Από την επίλυση του συστήματος βρίσκουμε ότι $x_0 = -3$ και $y_0 = 1$. Επομένως, όλες οι ευθείες της οικογένειας (1) διέρχονται από το σημείο $K(-3, 1)$.

(ii) Έστω ε ευθεία της οικογένειας (1) που είναι κάθετη στην ευθεία ζ . Τότε θα ισχύει

$$\lambda_\varepsilon \cdot \lambda_\zeta = -1 \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon \cdot 2 = -1 \Leftrightarrow \lambda_\varepsilon = -\frac{1}{2} \quad (3)$$

όμως, λόγω της (2), ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ε είναι ίσος με

$$\lambda_\varepsilon = \frac{1+3\lambda}{2-2\lambda}.$$

Επομένως, από την (3) έχουμε

$$\frac{1+3\lambda}{2-2\lambda} = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow 2+6\lambda = -2+2\lambda \Leftrightarrow \lambda = -1,$$

οπότε η ευθεία ε θα έχει εξίσωση $-2x - 4y - 2 = 0$ που γράφεται

$$x + 2y + 1 = 0.$$

2. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με κορυφές $A(2,3)$, $B(4,1)$ και $\Gamma(5\lambda-1,\lambda)$, όπου $\lambda \in \mathbf{R}$ με $\lambda \neq 1$. Να αποδείξετε ότι το κέντρο βάρους του τριγώνου κινείται σε μια ευθεία, καθώς το λ μεταβάλλεται στο $\mathbf{R}$.

ΛΥΣΗ

Αν $G(x, y)$ το κέντρο βάρους του τριγώνου, τότε $x = \frac{2+4+5\lambda-1}{3} = \frac{5\lambda+5}{3}$ και

$$y = \frac{3+1+\lambda}{3} = \frac{\lambda+4}{3}. \text{ Έχουμε λοιπόν το σύστημα } \begin{cases} x = \frac{5\lambda+5}{3} \\ y = \frac{\lambda+4}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = 5\lambda+5 \\ 3y = \lambda+4 \end{cases}.$$

Απαλείφουμε το λ από τις εξισώσεις και βρίσκουμε $3x - 15y + 15 = 0$ ή ισοδύναμα $x - 5y + 5 = 0$. Άρα, το κέντρο βάρους του τριγώνου $AB\Gamma$ κινείται στην ευθεία $x - 5y + 5 = 0$.

3. Να βρεθεί η οξεία γωνία των ευθειών $\varepsilon_1 : y = x + 1$ και $\varepsilon_2 : y = -2x + 3$.

ΛΥΣΗ

Οι ευθείες ε_1 και ε_2 έχουν συντελεστές διεύθυνσης $\lambda_1 = 1$ και $\lambda_2 = -2$. Άρα, είναι παράλληλες προς τα διανύσματα $\vec{\delta}_1 = (1, 1)$ και $\vec{\delta}_2 = (1, -2)$. Επομένως, η οξεία γωνία θ των ευθειών ε_1 και ε_2 είναι ίση ή παραπληρωματική της γωνίας φ των διανυσμάτων $\vec{\delta}_1$ και $\vec{\delta}_2$. Όμως, είναι:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{\delta}_1 \cdot \vec{\delta}_2}{|\vec{\delta}_1| \cdot |\vec{\delta}_2|} = \frac{1 \cdot 1 + 1(-2)}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}} = \frac{-1}{\sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}.$$

Επομένως, $\cos \theta = \frac{\sqrt{10}}{10}$, οπότε $\theta \cong 72^\circ$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να αποδείξετε ότι για κάθε πραγματική τιμή του μ η εξίσωση $(\mu - 1)x + \mu y + \mu^2 = 0$ παριστάνει ευθεία γραμμή. Πότε η ευθεία αυτή είναι παράλληλη προς τον άξονα $x'x$, πότε προς τον $y'y$ και πότε διέρχεται από την αρχή των αξόνων;
2. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο $A(-2, 3)$ και είναι κάθετη στην ευθεία $2x - 3y + 6 = 0$. Ποιο είναι το σημείο τομής των δύο ευθειών;
3. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο τομής των ευθειών $2x - 5y + 3 = 0$ και $x - 3y - 7 = 0$ και είναι κάθετη στην ευθεία $4x + y = 1$.
4. Τα σημεία $A(-4, 6)$ και $\Gamma(-1, 1)$ είναι οι απέναντι κορυφές ενός παραλληλόγραμμου $AB\Gamma\Delta$. Οι πλευρές $B\Gamma$ και $\Gamma\Delta$ του παραλληλόγραμμου ανήκουν στις ευθείες με εξισώσεις $x + 3y = 2$ και $x - y + 2 = 0$ αντιστοίχως. Να υπολογίσετε:
 - (i) Τις συντεταγμένες της κορυφής Δ .
 - (ii) Το συνημίτονο της οξείας γωνίας των διαγωνίων του παραλληλόγραμμου.
5. Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbf{R}$, ώστε οι ευθείες $(\lambda - 1)x + \lambda y + 8 = 0$ και $\lambda x + 3y + 1 - 2\lambda = 0$ να είναι κάθετες.

6. Να βρείτε την τιμή του $\kappa \in \mathbf{R}$, ώστε η ευθεία $3x + 3y + \kappa = 0$ να διέρχεται από το σημείο τομής των ευθειών $3x + 4y + 6 = 0$ και $6x + 5y - 9 = 0$.

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να σχεδιάσετε τις γραμμές τις οποίες παριστάνουν οι εξισώσεις:
(i) $x^2 - y^2 + 4y - 4 = 0$ (ii) $x^2 - y^2 - 4x + 2y + 3 = 0$.
2. Να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες της μορφής
 $(2\alpha^2 + \alpha + 3)x + (\alpha^2 - \alpha + 1)y + (3\alpha + 1) = 0$, $\alpha \in \mathbf{R}$
διέρχονται από το ίδιο σημείο.
3. Να αποδείξετε ότι οι ευθείες $x + 4y = 5$, $3x - 2y = 1$ και $7x - 8y + 1 = 0$ διέρχονται από το ίδιο σημείο.
4. Να βρείτε την οξεία γωνία την οποία σχηματίζουν οι ευθείες $y = \mu x$ και $(1 + \mu)x = (1 - \mu)y$.
5. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και από το σημείο τομής των ευθειών $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1$ και $\frac{x}{\beta} + \frac{y}{\alpha} = 1$, με $\alpha, \beta \neq 0$ και $\alpha \neq \pm\beta$.
6. Δίνεται η ευθεία $3x + y = 3$ και το σημείο $A(1, 2)$. Να βρείτε τις συντεταγμένες της προβολής του A στην ευθεία αυτή.
7. Δίνεται η ευθεία $\varepsilon : \frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1$. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία είναι κάθετη στην ε στο σημείο που αυτή τέμνει τον άξονα $x'x$.


2.3 ΕΜΒΛΙΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Απόσταση Σημείου από Ευθεία

Έστω ε μια ευθεία του καρτεσιανού επιπέδου, με εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$ και $M_0(x_0, y_0)$ ένα σημείο εκτός αυτής. Θέλουμε να υπολογίσουμε την απόσταση

$d(M_0, \varepsilon)$ του σημείου M_0 από την ευθεία ε . Αν $M_1(x_1, y_1)$ είναι η προβολή του M_0 πάνω στην ε , τότε θα ισχύει

$$d(M_0, \varepsilon) = |\overline{M_0 M_1}| \quad (1)$$



Όμως το διάνυσμα $\overline{M_0 M_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0)$ είναι παράλληλο προς το $\vec{n} = (A, B)$, αφού και τα δύο είναι κάθετα στην ευθεία ε . Άρα, θα υπάρχει $\lambda \in \mathbf{R}$, τέτοιο, ώστε

$$\overline{M_0 M_1} = \lambda \vec{n} \quad (2)$$

οπότε, λόγω της (1), θα ισχύει

$$d(M_0, \varepsilon) = |\lambda \vec{n}| = |\lambda| \cdot |\vec{n}| = |\lambda| \cdot \sqrt{A^2 + B^2} \quad (3)$$

Επιπλέον, λόγω της (2), έχουμε $(x_1 - x_0, y_1 - y_0) = \lambda(A, B)$, οπότε

$$x_1 = x_0 + \lambda A \text{ και } y_1 = y_0 + \lambda B \quad (4)$$

Όμως το $M_1(x_1, y_1)$ ανήκει στην ε . Άρα, θα ισχύει

$$\begin{aligned} Ax_1 + By_1 + \Gamma &= 0 \stackrel{(4)}{\Leftrightarrow} A(x_0 + \lambda A) + B(y_0 + \lambda B) + \Gamma = 0 \\ &\Leftrightarrow (A^2 + B^2)\lambda + (Ax_0 + By_0 + \Gamma) = 0 \\ &\Leftrightarrow \lambda = -\frac{Ax_0 + By_0 + \Gamma}{A^2 + B^2}. \end{aligned}$$

Επομένως, λόγω της (3), θα έχουμε

$$d(M_0, \varepsilon) = \left| -\frac{Ax_0 + By_0 + \Gamma}{A^2 + B^2} \right| \cdot \sqrt{A^2 + B^2} = \frac{|Ax_0 + By_0 + \Gamma|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Αποδείξαμε δηλαδή ότι:

$$d(M_0, \varepsilon) = \frac{|Ax_0 + By_0 + \Gamma|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$


Για παράδειγμα, η απόσταση του σημείου $M_0(-1, 2)$ από την ευθεία $\varepsilon : 4x + 3y + 8 = 0$ είναι ίση με

$$d(M_0, \varepsilon) = \frac{|4(-1) + 3 \cdot 2 + 8|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{10}{5} = 2.$$

Υπολογισμός Εμβαδού

Έστω $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ και $\Gamma(x_3, y_3)$ τρία σημεία του καρτεσιανού επιπέδου. Θέλουμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. Αν $\Gamma\Delta$ είναι το ύψος του $AB\Gamma$ από την κορυφή Γ , τότε θα ισχύει

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} (AB) \cdot (\Gamma\Delta). \quad (1)$$



Το (AB) είναι η απόσταση των σημείων $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$. Επομένως,

$$(AB) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \quad (2)$$

Το $(\Gamma\Delta)$ είναι η απόσταση του σημείου Γ από την ευθεία AB . Για να την υπολογίσουμε, θα βρούμε πρώτα την εξίσωση της AB .

Η AB , αν δεν είναι παράλληλη προς τον άξονα $y'y$, θα έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, οπότε θα έχει εξίσωση

$$AB: \quad y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1),$$

η οποία γράφεται ισοδύναμα

$$AB: \quad (x_2 - x_1)(y - y_1) - (y_2 - y_1)(x - x_1) = 0. \quad (3)$$

Αν, όμως, η AB είναι παράλληλη προς τον άξονα $y'y$, τότε θα έχει εξίσωση $x = x_1$, η οποία παίρνει και αυτή τη μορφή (3).

Η εξίσωση (3), μετά την εκτέλεση των πράξεων, γράφεται

$$AB: \quad (y_1 - y_2)x + (x_2 - x_1)y + (x_1y_2 - x_2y_1) = 0. \quad (4)$$

Επομένως, η απόσταση $(\Gamma\Delta)$ του Γ από την ευθεία AB είναι ίση με

$$\begin{aligned} (\Gamma\Delta) &= \frac{^{(4)} |(y_1 - y_2)x_3 + (x_2 - x_1)y_3 + (x_1y_2 - x_2y_1)|}{\sqrt{(y_1 - y_2)^2 + (x_2 - x_1)^2}} \\ &= \frac{^{(3)} |(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (y_2 - y_1)(x_3 - x_1)|}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}. \end{aligned}$$

Άρα,

$$(\Gamma\Delta) = \frac{\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2}}. \quad (5)$$

Έτσι, η ισότητα (1), λόγω του (2) και (5), γράφεται

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}. \quad (6)$$

Όμως, η 1η γραμμή της ορίζουσας είναι οι συντεταγμένες του διανύσματος $\overrightarrow{AB}$ και η 2η γραμμή οι συντεταγμένες του διανύσματος $\overrightarrow{AG}$. Επομένως, η ορίζουσα αυτή είναι ίση με την ορίζουσα $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AG})$ των διανυσμάτων $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{AG}$. Έτσι, η σχέση (6) γράφεται

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AG})|$$

Για παράδειγμα, αν $A(0,1)$, $B(-1,0)$ και $\Gamma(3,-8)$ είναι οι κορυφές ενός τριγώνου $AB\Gamma$, τότε $\overrightarrow{AB} = (-1,-1)$ και $\overrightarrow{AG} = (3,-9)$, οπότε το εμβαδόν του $AB\Gamma$ είναι

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AG})| = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 3 & -9 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \cdot 12 = 6.$$

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Να αποδειχτεί ότι η απόσταση των ευθειών $\varepsilon_1 : y = \lambda x + \beta_1$ και $\varepsilon_2 : y = \lambda x + \beta_2$ δίνεται από τον τύπο

$$d(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = \frac{|\beta_1 - \beta_2|}{\sqrt{1 + \lambda^2}}.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η απόσταση των ε_1 και ε_2 είναι ίση με την απόσταση οποιουδήποτε σημείου της ευθείας ε_1 από την ευθεία ε_2 .

Για $x = 0$, από την πρώτη εξίσωση βρίσκουμε ότι $y = \beta_1$. Άρα, το σημείο $A(0, \beta_1)$

ανήκει στην ε_1 , οπότε έχουμε

$$\begin{aligned} d(\varepsilon_1, \varepsilon_2) &= d(A, \varepsilon_2) \\ &= \frac{|\lambda \cdot 0 - \beta_1 + \beta_2|}{\sqrt{\lambda^2 + 1}}, \text{ αφού } \varepsilon_2 : \lambda x - y + \beta_2 = 0 \\ &= \frac{|\beta_1 - \beta_2|}{\sqrt{1 + \lambda^2}} \end{aligned}$$

2. Θεωρούμε τα σημεία $A(-3,0)$, $B(-2,0)$ και $\Gamma(-4,2)$. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων $M(x,y)$ για τα οποία ισχύει: $(MB\Gamma) = 2(AB\Gamma)$

ΛΥΣΗ

Το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι ίσο με

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A\Gamma})| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \right| = 1,$$

ενώ του $(MB\Gamma)$ είναι ίσο με

$$(MB\Gamma) = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{B\Gamma}, \overrightarrow{BM})| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ x+2 & y \end{vmatrix} \right| = |x+y+2|$$


Επομένως, το $M(x,y)$ είναι σημείο του γεωμετρικού τόπου, αν και μόνο αν ισχύει

$$\begin{aligned} |x+y+2| = 2 &\Leftrightarrow x+y+2 = 2 \quad \text{ή} \quad x+y+2 = -2 \\ &\Leftrightarrow y = -x \quad \text{ή} \quad y = -x-4. \end{aligned}$$

Άρα, ο ζητούμενος γεωμετρικός τόπος αποτελείται από τις ευθείες

$$y = -x \quad \text{και} \quad y = -x-4,$$

οι οποίες είναι παράλληλες προς τη $B\Gamma$.



ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε την απόσταση του σημείου $A(-2,3)$ από την ευθεία

(i) $x + y + 1 = 0$

(ii) $y = 2x - 3$

(iii) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$

(iv) $5x + 3y + 1 = 0$

2. Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon_1 : 5x - 8y - 51 = 0$ και $\varepsilon_2 : 5x - 8y + 68 = 0$.
 - (i) Να δείξετε ότι $\varepsilon_1 // \varepsilon_2$
 - (ii) Να υπολογίσετε τις αποστάσεις της αρχής των αξόνων από τις ε_1 και ε_2
 - (iii) Να υπολογίσετε την απόσταση των ε_1 και ε_2 .
3. Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon_1 : 4x - 3y - 9 = 0$ και $\varepsilon_2 : 4x - 3y - 24 = 0$.
 - (i) Να δείξετε ότι $\varepsilon_1 // \varepsilon_2$
 - (ii) Να βρείτε ένα σημείο της ε_1 και στη συνέχεια να υπολογίσετε την απόσταση των ε_1 και ε_2 .
4. Ποιο σημείο της ευθείας $2x - 3y = 30$ ισαπέχει από τα σημεία $A(1,3)$ και $B(7,9)$;
5. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -3$ και απέχει από την αρχή των αξόνων απόσταση ίση με 5 μονάδες.
6. Η ευθεία $\varepsilon : 3x - 2y + 1 = 0$ είναι μεσοπαράλληλη δύο παράλληλων ευθειών ε_1 και ε_2 , που απέχουν 8 μονάδες. Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών αυτών.
7. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου με κορυφές:
 - (i) $A(0,0)$, $B(6,0)$, $\Gamma(4,3)$
 - (ii) $A(-2,4)$, $B(2,-6)$, $\Gamma(5,4)$
 - (iii) $A(1,2)$, $B(3,4)$, $\Gamma(-5,-4)$.
8. Δίνονται τα σημεία $A(5,1)$ και $B(1,3)$. Να βρείτε το σημείο M του άξονα $x'x$, για το οποίο το εμβαδόν του τριγώνου MAB είναι ίσο με 7.
9. Δίνονται τα σημεία $A(3,4)$ και $B(5,-2)$. Να βρείτε το σημείο M , τέτοιο, ώστε $MA = MB$ και $(MAB) = 10$.
10. Ενός παραλληλόγραμμου $AB\Gamma\Delta$ οι τρεις κορυφές του έχουν συντεταγμένες $(-3,1)$, $(-2,3)$ και $(4,-5)$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του παραλληλόγραμμου.

Β' ΟΜΑΔΑΣ


1. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και ισαπέχει από τα σημεία $A(-2,0)$ και $B(0,2)$.
2. Να βρείτε το σημείο του άξονα $x'x$, το οποίο ισαπέχει από την αρχή των αξόνων O και από την ευθεία $5x + 12y - 60 = 0$.
3. Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών οι οποίες διέρχονται από το σημείο $M(1,2)$ και σχηματίζουν με τους άξονες τρίγωνο με εμβαδόν $E = 4$.

4. Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών οι οποίες διέρχονται από την αρχή των αξόνων O και απέχουν από το σημείο $A(-1,3)$ απόσταση ίση με 1.
5. Να βρείτε τα σημεία της ευθείας $x - y + 2 = 0$, τα οποία απέχουν από την ευθεία $12x - 5y + 60 = 0$ απόσταση ίση με 1.
6. Να δείξετε ότι τα σημεία $A(\alpha, \beta)$, $B(\gamma, \delta)$ και $\Gamma(\alpha - \gamma, \beta - \delta)$ είναι συνευθειακά, αν και μόνο αν $\alpha\delta = \beta\gamma$.
7. Δίνονται τα σημεία $A(\alpha, 0)$ και $B(0, \beta)$, με $\alpha, \beta \neq 0$. Αν η μεσοκάθετος του AB τέμνει τους άξονες στα σημεία $P(p, 0)$ και $Q(0, q)$, να δείξετε ότι:
(i) $\alpha q + \beta p = 2pq$ (ii) $\alpha p + \beta q = 0$.
Στη συνέχεια να εκφράσετε τα p και q συναρτήσει των α και β .
8. Να βρείτε τις εξισώσεις των διχοτόμων των γωνιών που σχηματίζουν οι ευθείες $3x - 4y + 1 = 0$ και $5x + 12y + 4 = 0$.
9. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο τομής των ευθειών $x - y + 1 = 0$ και $2x - 3y + 5 = 0$ και απέχει από το σημείο $A(3, 2)$ απόσταση ίση με $\frac{7}{5}$.
10. Δίνονται τα σημεία $A(-1, -2)$ και $B(3, 1)$. Να βρείτε το σύνολο των σημείων M για τα οποία ισχύει $(MAB) = 8$

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία διέρχεται από το σημείο $M(1, 0)$ και τέμνει τις ευθείες $y = x + 2$ και $y = x$ στα σημεία A και B αντιστοίχως, έτσι, ώστε $(AB) = 2$.
2. Να αποδείξετε ότι οι ευθείες $\lambda x + (\lambda - 1)y = 2\lambda$ και $(\lambda + 1)x + \lambda y = 2\lambda + 1$ τέμνονται για όλες τις τιμές του $\lambda \in \mathbf{R}$. Ποιος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων τομής τους;

3. Αν οι τρεις ευθείες $\alpha_\kappa x + \beta_\kappa y = 1$, με $\kappa = 1, 2, 3$, διέρχονται από το ίδιο σημείο, να αποδείξετε ότι τα σημεία $(\alpha_\kappa, \beta_\kappa)$, $\kappa = 1, 2, 3$, είναι συγγραμμικά.
4. Να βρείτε την ευθεία η οποία συνδέει το σημείο $A(\alpha, \beta)$ με το σημείο τομής των ευθειών $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1$ και $\frac{x}{\beta} + \frac{y}{\alpha} = 1$, όπου $\alpha, \beta \neq 0$ και $\alpha \neq \pm\beta$.
5. Αν οι ευθείες $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1$ και $\frac{x}{A} + \frac{y}{B} = 1$ είναι παράλληλες με $A > \alpha$ και $\beta > 0$, να δείξετε ότι η απόσταση μεταξύ των ευθειών είναι $\frac{\beta(A-\alpha)}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$.
6. Να δείξετε ότι:
- Η εξίσωση $x^2 - 4xy + y^2 = 0$ παριστάνει δύο ευθείες.
 - Καθεμιά σχηματίζει με την $x - y = 0$ γωνία 30° .
7. Να βρείτε συνθήκη, ώστε:
- Η ευθεία $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ να ορίζει με τους άξονες ισοσκελές τρίγωνο
 - Ο άξονας $x'x$ να διχοτομεί τη γωνία των ευθειών με εξισώσεις $\varepsilon_1 : \alpha_1 x + \beta_1 y = 0$ και $\varepsilon_2 : \alpha_2 x + \beta_2 y = 0$.
8. Στο διπλανό σχήμα το $AB\Gamma\Delta$ είναι τετράγωνο ενώ τα EAB και $ZB\Gamma$ είναι ισόπλευρα τρίγωνα πλευράς $\alpha = 2$.
- Να βρείτε τις συντεταγμένες των E και Z .
 - Να αποδείξετε ότι τα σημεία Δ , E και Z είναι συνευθειακά.



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1. Σε καθέναν από τους παρακάτω ισχυρισμούς να κυκλώσετε το Α, αν είναι αληθής, και το Ψ, αν είναι ψευδής:
- Η ευθεία $y = -3x + 5$ σχηματίζει οξεία γωνία με τον άξονα $x'x$ Α Ψ
 - Οι ευθείες $x = 5$ και $y = -2$ είναι κάθετες Α Ψ
 - Η εξίσωση $(\alpha + 1)x + (\alpha^2 - 1)y + 10 = 0$, $\alpha \in \mathbf{R}$ παριστάνει πάντοτε ευθεία Α Ψ
 - Η ευθεία $3x + 4y - 1 = 0$ δε διέρχεται από την αρχή των αξόνων Α Ψ

- Η εξίσωση $y - 2 = \lambda(x - 3)$, $\lambda \in \mathbf{R}$ παριστάνει για τις διάφορες τιμές του λ όλες τις ευθείες που διέρχονται από το σημείο $A(3, 2)$. Α Ψ

2. Να αντιστοιχίσετε κάθε σημείο της πρώτης στήλης στην ευθεία της δεύτερης στήλης στην οποία ανήκει:

Σημείο	Ευθεία
$A(2,1)$	
$B(2,3)$	$y = 3$
$\Gamma(1,2)$	$x = 2$
$\Delta(0,3)$	$3x - 2y = 0$
$E(0,0)$	$2x - 5y = -8$
$Z(2,8)$	

3. Να κυκλώσετε τη σωστή κάθε φορά απάντηση:

- Οι ευθείες $2x - y - 4 = 0$ και $x - 3y + 3 = 0$ τέμνονται στο σημείο:
 $O(0,0)$ $A(2,0)$ $B(0,1)$ $\Gamma(3,2)$ $\Delta(1,1)$

- Αν η ευθεία $Ax + By + \Gamma = 0$ έχει συντελεστή διεύθυνσης, τότε συμπεραίνουμε ότι:

$$\Gamma = 0 \qquad A \neq 0 \qquad B \neq 0 \qquad A = 0$$

- Μια ευθεία κάθετη στην ευθεία $\varepsilon : y = x$ είναι η:

$$y = x + 5, \quad y = 2, \quad x + y = 8, \quad y = -2x, \quad x = -1.$$

4. Δίνεται η ευθεία $\varepsilon : y = 3x + 8$. Να γράψετε :

- Δύο ευθείες παράλληλες στην ε
- Δύο ευθείες κάθετες στην ε
- Την ευθεία την παράλληλη στην ε που διέρχεται από την αρχή των αξόνων
- Την ευθεία την κάθετη στην ε που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

5. Να κυκλώσετε την ευθεία που απέχει τη μεγαλύτερη απόσταση από την αρχή των αξόνων:

- $\varepsilon_1 : 3x - 10y - 1 = 0$ • $\varepsilon_2 : 3x - 10y - 6 = 0$
- $\varepsilon_3 : 3x - 10y - 9 = 0$ • $\varepsilon_4 : 3x - 10y + 6 = 0$.

6. Οι ευθείες $2x + y + 2 = 0$ και $2x - y + 2 = 0$, είναι:

A. Παράλληλες

B. Κάθετες

Γ. Συμμετρικές ως προς τον άξονα $x'x$

Δ. Συμμετρικές ως προς τον άξονα $y'y$.

3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

Εισαγωγή

Η μελέτη της έλλειψης, της παραβολής και της υπερβολής από τους Αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς φαίνεται ότι είχε αφετηρία τη σχέση αυτών των καμπύλων με ορισμένα προβλήματα γεωμετρικών κατασκευών, όπως, για παράδειγμα, το περίφημο πρόβλημα διπλασιασμού του κύβου:

“Δοθέντος ενός κύβου, να κατασκευαστεί ένας άλλος με διπλάσιο όγκο”.

Με αλγεβρικό συμβολισμό αυτό σημαίνει ότι αν a είναι η πλευρά του αρχικού κύβου, να κατασκευαστεί ένα ευθύγραμμο τμήμα x , που θα είναι η πλευρά του κύβου με όγκο $2a^3$, δηλαδή $x^3 = 2a^3$. Ο Πρόκλος (450 περίπου μ.Χ.) αναφέρει ότι ο Ιπποκράτης ο Χίος (430 περίπου π.Χ.) ήταν ο πρώτος που ανήγαγε το πρόβλημα διπλασιασμού του κύβου στην παρεμβολή δύο μέσων αναλόγων ανάμεσα στο a και το $2a$, δηλαδή στην κατασκευή δύο τμημάτων x και y , τέτοιων, ώστε

$$\frac{a}{x} = \frac{x}{y} = \frac{y}{2a} \quad (1)$$

(από τις αναλογίες αυτές προκύπτει εύκολα ότι $x^3 = 2a^3$, δηλαδή το x θα είναι η πλευρά του ζητούμενου κύβου).

Υπενθυμίζουμε εδώ ότι το πρόβλημα παρεμβολής μιας μέσης αναλόγου ανάμεσα σε δύο γνωστά τμήματα a, b (δηλαδή η κατασκευή τμήματος x τέτοιου, ώστε

$\frac{a}{x} = \frac{x}{b}$) λύνεται εύκολα με κανόνα και διαβήτη, δηλαδή με τη βοήθεια ευθείας


και κύκλου. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την παρεμβολή δύο μέσων αναλόγων η οποία απαιτεί τη χρησιμοποίηση διαφορετικών γεωμετρικών καμπύλων. Επειδή από τις αναλογίες (1) προκύπτει $x^2 = ay$ (2), $y^2 = 2ax$ (3) και $xy = 2a^2$ ή

$y = \frac{2a^2}{x}$ (4), συμπεραίνουμε ότι τα μήκη των τμημάτων x και y θα είναι οι συ-

ντεταγμένες του σημείου τομής δύο από τις τρεις καμπύλες (2), (3) και (4), που είναι αντιστοίχως δύο παραβολές και μία υπερβολή.

Η φράση “Μεναιχμείους κωνοτομείν τριάδας”, που αναφέρεται σε ένα επίγραμμα του Ερατοσθένη του Κυρηναίου (250 περίπου π.Χ.) σχετικό με το διπλασιασμό του κύβου, έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι οι τρεις αυτές καμπύλες ανακα-


λύφθηκαν από τον Μέναιχμο, εταίρο στην Ακαδημία του Πλάτωνα, γύρω στο 350 π.Χ. Στη μία από τις δύο λύσεις του Μέναιχμου, που αναφέρει ο Ευτόκιος ο Ασκαλωνίτης (550 περίπου μ.Χ.), οι καμπύλες κατασκευάζονται σύμφωνα με τα γεωμετρικά ισοδύναμα των (3) και (4). Για παράδειγμα, το M , ως σημείο της παραβολής, προσδιορίζεται, έτσι ώστε το τετράγωνο πλευράς MK να είναι ισοδύναμο προς ένα ορθογώνιο με πλευρές $2a$ και MA (δηλαδή $y^2 = 2ax$), ενώ ως σημείο της υπερβολής, έτσι ώστε το ορθογώνιο με πλευρές MA και MK να είναι ισοδύναμο προς ένα ορθογώνιο με πλευρές $2a$ και a (δηλαδή $xy = 2a^2$). Τέλος,





τα ζητούμενα τμήματα x, y προσδιορίζονται φέρνοντας τις κάθετες από το σημείο τομής των δύο καμπύλων πάνω στις ασύμπτωτες της υπερβολής (η μία από τις οποίες είναι ταυτόχρονα και άξονας συμμετρίας της παραβολής).

Γύρω στο 300 π.Χ., η υπερβολή, η παραβολή και η έλλειψη είχαν γίνει αντικείμενο συστηματικής μελέτης, ως οι τομές που δημιουργούνται στην επιφάνεια ενός κώνου από ένα επίπεδο κάθετο σε μια γενέτειρά του.

Ανάλογα με τη γωνία της κορυφής του κώνου οι καμπύλες αυτές ορίζονταν ως “οξυγωνίου κώνου τομή” (έλλειψη),





“ορθογωνίου κώνου τομή” (παραβολή) και “αμβλυγωνίου κώνου τομή” (υπερβολή). Οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται από τον Αρχιμήδη (287-212 π.Χ.) στα έργα του “Τετραγωνισμός ορθογωνίου κώνου τομής” και “Περί κωνοειδών και σφαιροειδών”. Αποκορύφωμα της θεωρητικής μελέτης των




τριών κωνικών τομών κατά την αρχαιότητα, υπήρξε το περίφημο έργο “Κωνικά” του Απολλωνίου του Περγαίου (250 περίπου π.Χ.), ο οποίος στηρίχτηκε σε προηγούμενα έργα του Αρισταίου και του Ευκλείδη, τα οποία όμως δε διασώθηκαν. Τα “Κωνικά” ήταν χωρισμένα σε 8 βιβλία, που περιείχαν μια άποψη γεωμετρική θεωρία των κωνικών τομών και ένα μεγάλο πλήθος νέων αποτελεσμάτων. Στα 7 πρώτα βιβλία που έχουν διασωθεί υπάρχουν 387 θεωρήματα ενώ στο 8ο, όπως

συνάγεται από μαρτυρία του Πάππου, υπήρχαν άλλα 100. Μια βασική καινοτομία του Απολλώνιου υπήρξε ο ορισμός των τριών καμπύλων διαμέσου τριών διαφορετικών τομών ενός κώνου, καθώς και η εισαγωγή των όρων “παραβολή”, “έλλειψη” και “υπερβολή”.

Τα ονόματα αυτά έχουν άμεση σχέση με το νέο τρόπο ορισμού των κωνικών τομών από τον Απολλώνιο, σύμφωνα με τον οποίο, σε κάθε τομή του κώνου από το επίπεδο αντιστοιχεί ένα σταθερό μήκος (παράμετρος), το οποίο εξαρτάται από το είδος του κώνου και από τη θέση του επιπέδου. Ο Απολλώνιος έδειξε ότι για κάθε καμπύλη τα δύο γραμμοσκιασμένα εμβαδά σε καθένα από τα διπλανά σχήματα είναι ίσα μεταξύ τους. Το ένα από αυτά είναι το τετράγωνο με πλευρά την κάθετη y από σημείο της καμπύλης προς



τον άξονα συμμετρίας της το άλλο είναι ένα ορθογώνιο με μια πλευρά την απόσταση x του ίχνους αυτής της κάθετης από την κορυφή της καμπύλης. Η σχέση της άλλης πλευράς του ορθογωνίου προς τη σταθερή παράμετρο της τομής είναι αυτή που καθορί-



ζει τη μορφή και το όνομα της καμπύλης. Αν η άλλη πλευρά ισούται (“παραβάλλεται”) προς την παράμετρο, τότε η καμπύλη είναι παραβολή. Αν η άλλη πλευρά είναι μικρότερη (“ελλείπει”) από την παράμετρο, η καμπύλη είναι έλλειψη, ενώ αν είναι μεγαλύτερη (“υπερβάλλει”), η καμπύλη είναι υπερβολή.

3.1 Ο ΚΥΚΛΟΣ

Εξίσωση Κύκλου


Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και C ο κύκλος με κέντρο το σημείο $O(0,0)$ και ακτίνα ρ . Γνωρίζουμε από τη Γεωμετρία ότι ένα σημείο

$M(x, y)$ ανήκει στον κύκλο C , αν και μόνο αν απέχει από το κέντρο του O απόσταση ίση με ρ , δηλαδή, αν και μόνο αν ισχύει:

$$(OM) = \rho \quad (1)$$

Όμως, $(OM) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Επομένως, η (1) γράφεται

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 + y^2} &= \rho \quad \text{ή, ισοδύναμα,} \\ x^2 + y^2 &= \rho^2. \end{aligned} \quad (2)$$



Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι συντεταγμένες των σημείων του κύκλου και μόνο αυτές επαληθεύουν την εξίσωση (2). Άρα, ο κύκλος με κέντρο το σημείο $O(0,0)$ και ακτίνα ρ έχει εξίσωση

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \quad (3)$$


Για παράδειγμα, ο κύκλος με κέντρο το σημείο $O(0,0)$ και ακτίνα $\rho = 1$ έχει εξίσωση $x^2 + y^2 = 1$. Ο κύκλος αυτός λέγεται **μοναδιαίος κύκλος**.

Παραμετρικές Εξισώσεις Κύκλου

Έστω ο κύκλος $C: x^2 + y^2 = \rho^2$ και ένα σημείο $M(x, y)$ του καρτεσιανού επιπέδου.

Αν το $M(x, y)$ ανήκει στον κύκλο C και $\varphi \in [0, 2\pi)$ είναι η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα $\overline{OM}$ με τον άξονα $x'x$, τότε, όπως γνωρίζουμε από την Τριγωνομετρία, θα ισχύουν οι σχέσεις:

$$x = \rho \cos \varphi \quad \text{και} \quad y = \rho \sin \varphi. \quad (1)$$



Αντιστρόφως, αν για τις συντεταγμένες x, y του M ισχύουν οι σχέσεις (1), τότε το σημείο M θα ανήκει στον κύκλο C , αφού

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi = \rho^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = \rho^2.$$

Επομένως, οι συντεταγμένες των σημείων $M(x, y)$ του κύκλου C και μόνον αυτές ικανοποιούν τις εξισώσεις

$$x = \rho \cos \varphi \quad \text{και} \quad y = \rho \sin \varphi, \quad \varphi \in [0, 2\pi)$$

Οι εξισώσεις αυτές λέγονται **παραμετρικές εξισώσεις** του κύκλου C .

Εφαπτομένη Κύκλου

Έστω ε η εφαπτομένη του κύκλου

$C: x^2 + y^2 = \rho^2$ σε ένα σημείο του $A(x_1, y_1)$.

Γνωρίζουμε από τη Γεωμετρία ότι ένα σημείο $M(x, y)$ ανήκει στην ε , αν και μόνο αν $OA \perp AM$, δηλαδή, αν και μόνο αν ισχύει

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AM} = 0. \quad (1)$$

Όμως $\overrightarrow{OA} = (x_1, y_1)$ και $\overrightarrow{AM} = (x - x_1, y - y_1)$.

Έτσι η (1) γράφεται διαδοχικά

$$x_1(x - x_1) + y_1(y - y_1) = 0$$

$$xx_1 + yy_1 = x_1^2 + y_1^2$$

$$xx_1 + yy_1 = \rho^2,$$


$$\text{αφού} \quad x_1^2 + y_1^2 = \rho^2.$$

Επομένως, η εφαπτομένη του κύκλου $x^2 + y^2 = \rho^2$ στο σημείο του $A(x_1, y_1)$ έχει εξίσωση

$$xx_1 + yy_1 = \rho^2$$

Για παράδειγμα, η εφαπτομένη του κύκλου $x^2 + y^2 = 1$ στο σημείο $A\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

έχει εξίσωση $x \frac{1}{2} + y \frac{\sqrt{3}}{2} = 1$, η οποία γράφεται $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$.




Η Εξίσωση $x^2 + y^2 + Ax + By + \Gamma = 0$

• Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και C ο κύκλος με κέντρο $K(x_0, y_0)$ και ακτίνα ρ . Ένα σημείο $M(x, y)$ ανήκει στον κύκλο C , αν και μόνο αν απέχει από το κέντρο του K απόσταση ίση με ρ , δηλαδή, αν και μόνο αν ισχύει

$$(KM) = \rho \quad (1)$$

Όμως, $(KM) = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$.



Επομένως, η σχέση (1) γράφεται:

$$\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} = \rho \quad \text{ή, ισοδύναμα,} \quad (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = \rho^2.$$

Άρα, ο κύκλος με κέντρο $K(x_0, y_0)$ και ακτίνα ρ έχει εξίσωση:

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = \rho^2 \quad (2)$$

Έτσι, για παράδειγμα, ο κύκλος με κέντρο $K(1, -3)$ και ακτίνα $\rho = 2$ έχει εξίσωση $(x-1)^2 + (y+3)^2 = \rho^2$.

- Αν τώρα εκτελέσουμε τις πράξεις, η εξίσωση (2) γράφεται

$$x^2 + y^2 - 2x_0x - 2y_0y + (x_0^2 + y_0^2 - \rho^2) = 0,$$

δηλαδή παίρνει τη μορφή

$$x^2 + y^2 + Ax + By + \Gamma = 0, \quad (3)$$

όπου $A = -2x_0$, $B = -2y_0$ και $\Gamma = x_0^2 + y_0^2 - \rho^2$.

Αντιστρόφως, κάθε εξίσωση της μορφής (3) γράφεται διαδοχικά:

$$(x^2 + Ax) + (y^2 + By) = -\Gamma$$

$$\left(x^2 + 2\frac{A}{2}x + \frac{A^2}{4}\right) + \left(y^2 + 2\frac{B}{2}y + \frac{B^2}{4}\right) = -\Gamma + \frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4}$$

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 = \frac{A^2 + B^2 - 4\Gamma}{4}.$$

Επομένως:

— Αν $A^2 + B^2 - 4\Gamma > 0$, η εξίσωση (3) παριστάνει κύκλο με κέντρο

$$K\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right) \text{ και ακτίνα } \rho = \frac{\sqrt{A^2 + B^2 - 4\Gamma}}{2}.$$

— Αν $A^2 + B^2 - 4\Gamma = 0$, η εξίσωση (3) παριστάνει ένα μόνο σημείο, το

$$K\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right).$$

— Αν $A^2 + B^2 - 4\Gamma < 0$, η εξίσωση (3) είναι αδύνατη, δηλαδή δεν υπάρχουν σημεία $M(x, y)$ των οποίων οι συντεταγμένες να την επαληθεύουν.

Αποδείξαμε λοιπόν ότι:

Κάθε κύκλος έχει εξίσωση της μορφής

$$x^2 + y^2 + Ax + By + \Gamma = 0, \quad \text{με} \quad A^2 + B^2 - 4\Gamma > 0 \quad (\text{I})$$

και αντιστρόφως κάθε εξίσωση της μορφής (I) παριστάνει κύκλο.

Η εξίσωση $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 12 = 0$, για παράδειγμα, γράφεται διαδοχικά

$$(x^2 - 4x) + (y^2 + 6y) = -12$$

$$(x^2 - 2 \cdot 2x + 2^2) + (y^2 + 2 \cdot 3y + 3^2) = -12 + 2^2 + 3^2$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 1^2.$$

Άρα, παριστάνει κύκλο με κέντρο $K(2, -3)$ και ακτίνα $\rho = 1$.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1.** Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτομένων του κύκλου $C : x^2 + y^2 = 5$ που διέρχονται από το σημείο $A(3, 1)$, και να αποδειχτεί ότι οι εφαπτόμενες αυτές είναι κάθετες.

ΛΥΣΗ

Έστω ε_1 μια εφαπτομένη του κύκλου C που διέρχεται από το σημείο A . Αν $M_1(x_1, y_1)$ είναι το σημείο επαφής, τότε η ε_1 θα έχει εξίσωση

$$xx_1 + yy_1 = 5 \quad (1)$$

και επειδή διέρχεται από το σημείο $A(3, 1)$, θα ισχύει


$$3x_1 + y_1 = 5. \quad (2)$$

Όμως, το σημείο $M_1(x_1, y_1)$ ανήκει στον κύκλο C . Άρα, θα ισχύει

$$x_1^2 + y_1^2 = 5. \quad (3)$$

Επομένως, οι συντεταγμένες (x_1, y_1) του M_1 είναι η λύση του συστήματος των εξισώσεων (2) και (3). Λύνουμε το σύστημα αυτό και βρίσκουμε δύο λύσεις:

$$(x_1, y_1) = (1, 2) \quad \text{ή} \quad (x_1, y_1) = (2, -1) \quad (4)$$



Άρα, υπάρχουν δύο εφαπτόμενες του C που διέρχονται από το σημείο $A(3,1)$, οι οποίες, λόγω των (1) και (4), έχουν εξισώσεις:

$$\varepsilon_1 : x + 2y = 5, \quad \varepsilon_2 : 2x - y = 5.$$

Επειδή οι συντελεστές διεύθυνσης των ε_1 και ε_2 είναι $\lambda_1 = -\frac{1}{2}$ και $\lambda_2 = 2$, οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι κάθετες.

2. Δίνονται οι κύκλοι $C_1 : (x-2)^2 + (y-3)^2 = 5^2$ και $C_2 : x^2 + (y+1)^2 = 3^2$.

(i) Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης ε του κύκλου C_1 στο σημείο $A(5,-1)$.

(ii) Να αποδειχτεί ότι η ε εφάπτεται και του κύκλου C_2 .

ΛΥΣΗ

Ο κύκλος C_1 έχει κέντρο $K(2,3)$ και ακτίνα 5, ενώ ο κύκλος C_2 έχει κέντρο $A(0,-1)$ και ακτίνα 3.

(i) Γνωρίζουμε από τη Γεωμετρία ότι ένα σημείο $M(x,y)$ ανήκει στην ε , αν και μόνο αν $AM \perp KA$, δηλαδή, αν και μόνο αν

$$\overrightarrow{KA} \cdot \overrightarrow{AM} = 0. \quad (1)$$

Όμως, $\overrightarrow{KA} = (3, -4)$ και $\overrightarrow{AM} = (x-5, y+1)$.

Έτσι, η (1) γράφεται διαδοχικά

$$3(x-5) - 4(y+1) = 0$$

$$3x - 4y - 19 = 0.$$


Άρα, η εξίσωση της ε είναι:

$$3x - 4y - 19 = 0. \quad (2)$$

(ii) Για να δείξουμε ότι η ε εφάπτεται του κύκλου C_2 , αρκεί να δείξουμε ότι η απόσταση του κέντρου $A(0,-1)$ του C_2 από την ε είναι ίση με την ακτίνα του C_2 , δηλαδή ίση με 3.

Έχουμε λοιπόν:

$$d(A, \varepsilon) = \frac{|3 \cdot 0 - 4(-1) - 19|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{15}{5} = 3.$$



ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου με κέντρο την αρχή των αξόνων σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - (i) Όταν διέρχεται από το σημείο $A(1, \sqrt{3})$
 - (ii) Όταν διέρχεται από το σημείο $A(\alpha - \beta, \alpha + \beta)$
 - (iii) Όταν εφάπτεται της ευθείας $x - y = 2$
 - (iv) Όταν εφάπτεται της ευθείας $\alpha x + \beta y = \alpha^2 + \beta^2$
2. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου $x^2 + y^2 = 5$ σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - (i) Όταν είναι παράλληλη στην ευθεία $y = 2x + 3$
 - (ii) Όταν είναι κάθετη στην ευθεία $y = \frac{1}{2}x$
 - (iii) Όταν διέρχεται από το σημείο $A(5, 0)$
3. Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόμενες του κύκλου $x^2 + y^2 = 2$ στα σημεία $A(1, 1)$, $B(-1, 1)$, $\Gamma(-1, -1)$ και $\Delta(1, -1)$ σχηματίζουν τετράγωνο με διαγώνιους τους άξονες $x'x$ και $y'y$. Ποιο είναι το εμβαδόν του τετραγώνου αυτού;
4. Να βρείτε την εξίσωση της χορδής του κύκλου $x^2 + y^2 = 4$ που έχει μέσο το σημείο $M(1, -1)$.
5. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - (i) Όταν έχει κέντρο $K(0, 1)$ και διέρχεται από το σημείο $A(\sqrt{3}, 0)$
 - (ii) Όταν έχει διάμετρο το τμήμα με άκρα $A(-1, 2)$ και $B(7, 8)$
 - (iii) Όταν έχει ακτίνα $\rho = 5$ και τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία $A(1, 0)$ και $B(7, 0)$
 - (iv) Όταν διέρχεται από τα σημεία $A(4, 0)$ και $B(8, 0)$ και έχει το κέντρο του στην ευθεία $y = x$
 - (v) Όταν τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία $A(4, 0)$ και $B(8, 0)$ και τον άξονα $y'y$ στα σημεία $\Gamma(0, -2)$ και $\Delta(0, \mu)$.
 - (vi) Όταν εφάπτεται του άξονα $x'x$ στο σημείο $A(3, 0)$ και διέρχεται από το σημείο $B(1, 2)$.
 - (vii) Όταν διέρχεται από την αρχή των αξόνων και εφάπτεται της ευθείας $3x + 4y = 12$ στο σημείο $A(0, 3)$.

6. Να βρείτε το κέντρο και η ακτίνα του κύκλου που έχει εξίσωση
 (i) $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$ (ii) $x^2 + y^2 - 10x + 12y - 20 = 0$
 (iii) $3x^2 + 3y^2 + 6x - 9y + 1 = 0$ (iv) $x^2 + y^2 - 4\alpha x + 10\beta y + 4\alpha^2 + 16\beta^2 = 0$.
7. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου
 (i) $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0$ στο σημείο του $A(1, -1)$
 (ii) $x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \alpha^2 - 3\beta^2 = 0$ στο σημείο του $A(\alpha, -\beta)$.
8. Να βρείτε τη σχετική θέση των κύκλων:
 $C_1 : x^2 + y^2 = 1$ και $C_2 : (x-1)^2 + y^2 = 4$.

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση
 $(x-\alpha)(x-\beta) + (y-\gamma)(y-\delta) = 0$
 παριστάνει τον περιγεγραμμένο κύκλο του τετραπλεύρου με κορυφές τα σημεία $A(\alpha, \gamma)$, $B(\beta, \gamma)$, $\Gamma(\beta, \delta)$, $\Delta(\alpha, \delta)$ και ότι οι $A\Gamma$ και $B\Delta$ είναι διάμετροι αυτού του κύκλου.
2. Να αποδείξετε ότι η ευθεία $x \sin \varphi + y \eta \mu \varphi = 4 \eta \mu \varphi - 2 \sigma \upsilon \nu \varphi + 4$ εφάπτεται του κύκλου $x^2 + y^2 + 4x - 8y + 4 = 0$.
3. Από ένα σημείο $M_0(x_0, y_0)$ εκτός του κύκλου $x^2 + y^2 = \rho^2$ φέρνουμε τις δύο εφαπτόμενές του. Αν M_1, M_2 είναι τα σημεία επαφής, να αποδείξετε ότι η χορδή M_1M_2 έχει εξίσωση $xx_0 + yy_0 = \rho^2$.
4. Έστω C ο κύκλος που έχει κέντρο την αρχή των αξόνων και διέρχεται από το σημείο $A(3\alpha, 0)$. Αν M είναι ένα οποιοδήποτε σημείο του C που δε βρίσκεται στον άξονα $x'x$, να αποδείξετε ότι το κέντρο βάρους G του τριγώνου OAM ανήκει στον κύκλο $(x-\alpha)^2 + y^2 = \alpha^2$.
5. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων M , από τα οποία οι εφαπτόμενες προς τον κύκλο $x^2 + y^2 = \rho^2$ είναι κάθετες.
6. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων M , των οποίων ο λόγος των αποστάσεων από τα σημεία $A(-3, 0)$ και $B(3, 0)$ είναι σταθερός και ίσος με 2.
7. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων M , των οποίων το τετράγωνο της απόστασης από την αρχή των αξόνων είναι ίσο με το τετραπλάσιο της απόστασης από την ευθεία $x = 1$.

8. Έστω το τρίγωνο με κορυφές $A(3,5)$, $B(2,-4)$ και $\Gamma(-5,-1)$. Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων M για τα οποία ισχύει $MA^2 + MB^2 + M\Gamma^2 = 107$ είναι κύκλος με κέντρο το κέντρο βάρους του τριγώνου $AB\Gamma$.
9. Να αποδείξετε ότι το σημείο τομής των ευθειών
 $x \sin \theta + y \sin \theta = \alpha$ και $x \sin \theta - y \sin \theta = \beta$
 ανήκει στον κύκλο



$$x^2 + y^2 = \alpha^2 + \beta^2$$

 για όλες τις τιμές του $\theta \in [0, 2\pi)$.
10. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των μέσων των χορδών του κύκλου $x^2 + y^2 = 25$, που διέρχονται από το σημείο $A(2,4)$.

3.2 Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ

Ορισμός Παραβολής



Έστω μια ευθεία δ και ένα σημείο E εκτός της δ . Ονομάζεται **παραβολή** με **εστία** το σημείο E και **διευθετούσα** την ευθεία δ ο γεωμετρικός τόπος C των σημείων του επιπέδου τα οποία ισαπέχουν από την E και τη δ (Σχ. α). Αν A είναι η προβολή της εστίας E στη διευθετούσα δ , τότε το μέσο K του EA είναι προφανώς σημείο της παραβολής και λέγεται **κορυφή** της.



Για να βρούμε ένα σημείο της παραβολής C , εργαζόμαστε ως εξής: Παίρνουμε ένα σημείο Π_1 της ημιευθείας KE (Σχ. β) και από το σημείο αυτό φέρνουμε την κάθετη στην KE και έστω M_1 ένα από τα σημεία τομής της κάθετης αυτής και του κύκλου με κέντρο το E και ακτίνα $\Pi_1 A$. Τότε, το σημείο M_1 είναι σημείο της παραβολής C . Πράγματι, αν P_1 είναι η ορθή προβολή του M_1 στη διευθετούσα δ , τότε θα ισχύει $(M_1 P_1) = (\Pi_1 A) = (M_1 E)$, δηλαδή $d(M_1, \delta) = d(M_1, E)$.

Εξίσωση Παραβολής

• Έστω C μια παραβολή με εστία E και διευθετούσα δ . Θα βρούμε την εξίσωση της παραβολής C ως προς σύστημα συντεταγμένων Oxy με αρχή O την κορυφή της παραβολής και άξονα $x'x$ την κάθετη από το E στην δ .



Αν στο σύστημα αυτό η τετμημένη της εστίας E είναι $\frac{p}{2}$, τότε η εξίσωση της διευθετούσας θα είναι $x = -\frac{p}{2}$.

Σύμφωνα με τον ορισμό της παραβολής, ένα σημείο $M(x, y)$ θα ανήκει στη C , αν και μόνο αν ισχύει

$$d(M, E) = d(M, \delta). \quad (1)$$

Είναι όμως

$$d(M, E) = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} \quad \text{και} \quad d(M, \delta) = \frac{\left|x + \frac{p}{2}\right|}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = \left|x + \frac{p}{2}\right|.$$

Έτσι, η σχέση (1) γράφεται διαδοχικά

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = \left|x + \frac{p}{2}\right|$$

$$\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2 = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2$$

$$x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4}$$

$$y^2 = 2px. \quad (2)$$

Επομένως, η εξίσωση της παραβολής C με εστία $E\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ και διευθετούσα

$\delta: x = -\frac{p}{2}$ είναι

$$y^2 = 2px$$

Για παράδειγμα, η παραβολή με εστία το σημείο $E(1,0)$ και διευθετούσα την ευθεία $x = -1$ έχει $p = 2$ και επομένως έχει εξίσωση $y^2 = 4x$.

Ο αριθμός p λέγεται **παράμετρος** της παραβολής και η $|p|$ παριστάνει την απόσταση της εστίας από τη διευθετούσα.



- Αν τώρα πάρουμε σύστημα συντεταγμένων Oxy με αρχή O την κορυφή της παραβολής και άξονα $y'y$ την κάθετη από το E στη δ και εργα-
στούμε όπως πριν, θα βρούμε ότι η παραβολή C έχει εξίσωση

$$x^2 = 2py$$

Η εξίσωση αυτή γράφεται ισοδύναμα $y = \frac{1}{2p}x^2$

και παριστάνει τη γραφική παράσταση της γνωστής μας από την Α' Λυκείου συνάρτησης

$$y = \alpha x^2, \text{ όπου } \alpha = \frac{1}{2p}$$



Για παράδειγμα, η εξίσωση $y = \frac{1}{4}x^2$ παριστάνει την παραβολή που έχει $p = 2$ και άρα έχει εστία το σημείο $E(0,1)$ και διευθετούσα την ευθεία $y = -1$.

Ιδιότητες Παραβολής

Έστω μια παραβολή

$$y^2 = 2px. \quad (1)$$

- Από την εξίσωση (1) προκύπτει ότι τα p και x (με $x \neq 0$) είναι ομόσημα. Άρα, κάθε φορά η παραβολή βρίσκεται στο ημιεπίπεδο που ορίζει ο άξονας $y'y$ και η εστία E . Επομένως, η παραβολή βρίσκεται στο ημιεπίπεδο που ορίζει η διευθετούσα δ και η εστία E .
- Αν το σημείο $M_1(x_1, y_1)$ είναι σημείο της παραβολής, δηλαδή, αν $y_1^2 = 2px_1$, τότε και το σημείο $M_2(x_1, -y_1)$ θα είναι σημείο της ίδιας παραβολής, αφού $(-y_1)^2 = 2px_1$. Αυτό σημαίνει ότι ο άξονας $x'x$ είναι άξονας συμμετρίας της παραβολής. Επομένως, η κάθετη από την εστία στη διευθετούσα είναι άξονας συμμετρίας της παραβολής και λέγεται **άξονας** της παραβολής.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Έστω η παραβολή $y^2 = 2px$ και μια ευθεία που διέρχεται από την εστία της και τέμνει την παραβολή στα σημεία M_1 και M_2 . Να αποδειχτεί ότι το γινόμενο των αποστάσεων των M_1 και M_2 από τον άξονα $x'x$ είναι σταθερό.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αν (x_1, y_1) και (x_2, y_2) είναι οι συντεταγμένες των M_1 και M_2 αντιστοίχως, τότε οι αποστάσεις των M_1 και M_2 από τον άξονα $x'x$ θα είναι ίσες με $|y_1|$ και $|y_2|$ αντιστοίχως. Επομένως, αρκεί να δείξουμε ότι το $|y_1| |y_2|$ είναι σταθερό. Επειδή τα σημεία (x_1, y_1) , (x_2, y_2) ανήκουν στην παραβολή $y^2 = 2px$, θα ισχύει

$$y_1^2 = 2px_1 \text{ και } y_2^2 = 2px_2.$$



Επομένως, οι συντεταγμένες των σημείων M_1 και M_2 θα είναι

$$\left(\frac{y_1^2}{2p}, y_1\right) \text{ και } \left(\frac{y_2^2}{2p}, y_2\right)$$

αντιστοίχως.

Όμως, τα σημεία $E\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, $M_1\left(\frac{y_1^2}{2p}, y_1\right)$, $M_2\left(\frac{y_2^2}{2p}, y_2\right)$ είναι συνευθειακά.

Επομένως: $\overline{EM_1} // \overline{EM_2}$, οπότε έχουμε διαδοχικά:

$$\det(\overline{EM_1}, \overline{EM_2}) = 0$$

$$\begin{vmatrix} \frac{y_1^2}{2p} - \frac{p}{2} & y_1 \\ \frac{y_2^2}{2p} - \frac{p}{2} & y_2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\frac{(y_1^2 - p^2)y_2}{2p} - \frac{(y_2^2 - p^2)y_1}{2p} = 0$$

$$y_1^2 y_2 - y_2^2 y_1 - p^2 y_2 + p^2 y_1 = 0$$

$$y_1 y_2 (y_1 - y_2) = -p^2 (y_1 - y_2)$$

$$y_1 y_2 = -p^2, \quad \text{αφού } y_1 \neq y_2.$$

Άρα $|y_1| \cdot |y_2| = |y_1 y_2| = p^2$. (σταθερό)

Εφαπτομένη Παραβολής

- Έστω μια παραβολή C με εξίσωση


$$y^2 = 2px \quad (1)$$

και ένα σταθερό της σημείο $M_1(x_1, y_1)$.

Έστω επιπλέον μια μη κατακόρυφη ευθεία ζ που διέρχεται από το $M_1(x_1, y_1)$ και τέμνει την παραβολή και σε ένα άλλο σημείο $M_2(x_2, y_2)$.

Τότε η ζ θα έχει συντελεστή διεύθυνσης

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



και επειδή διέρχεται από το σημείο $M_1(x_1, y_1)$, θα έχει εξίσωση

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1). \quad (2)$$

Επειδή τα σημεία $M_1(x_1, y_1)$, $M_2(x_2, y_2)$ ανήκουν στην παραβολή, οι συντεταγμένες τους θα επαληθεύουν την εξίσωση (1). Άρα, θα ισχύει

$$y_1^2 = 2px_1 \quad \text{και} \quad y_2^2 = 2px_2,$$

οπότε θα έχουμε διαδοχικά

$$\begin{aligned} y_2^2 - y_1^2 &= 2p(x_2 - x_1) \\ (y_2 - y_1)(y_2 + y_1) &= 2p(x_2 - x_1) \\ \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} &= \frac{2p}{y_2 + y_1}. \end{aligned}$$

Έτσι, η εξίσωση (2) θα πάρει τη μορφή

$$y - y_1 = \frac{2p}{y_2 + y_1} (x - x_1),$$

δηλαδή τη μορφή

$$(y_2 + y_1)(y - y_1) = 2p(x - x_1). \quad (3)$$

Ας υποθέσουμε τώρα ότι το σημείο $M_2(x_2, y_2)$, κινούμενο πάνω στην παραβολή C , τείνει να συμπίπτει με το σημείο $M_1(x_1, y_1)$. Τότε το y_2 τείνει να γίνει ίσο με y_1 , οπότε η εξίσωση (3) της τέμνουσας ζ τείνει να πάρει τη μορφή

$$(y_1 + y_1)(y - y_1) = 2p(x - x_1),$$

δηλαδή τη μορφή

$$y_1(y - y_1) = p(x - x_1). \quad (4)$$

Η εξίσωση αυτή παριστάνει την ευθεία ε , που είναι η *οριακή θέση* της τέμνουσας ζ , καθώς το M_2 τείνει να συμπίπτει με το M_1 . Η ευθεία ε λέγεται **εφαπτομένη** της παραβολής στο σημείο M_1 . Η εξίσωση της εφαπτομένης γράφεται διαδοχικά:

$$\begin{aligned} y_1 y - y_1^2 &= px - px_1 \\ y y_1 - 2px_1 &= px - px_1 \\ y y_1 &= px + px_1 \\ y y_1 &= p(x + x_1). \end{aligned}$$

Επομένως, η εφαπτομένη της παραβολής $y^2 = 2px$ στο σημείο της $M_1(x_1, y_1)$ έχει εξίσωση

$$yy_1 = p(x + x_1)$$

Για παράδειγμα, η εφαπτομένη της παραβολής $y^2 = 4x$ στο σημείο της $M_1(2, 1)$ έχει εξίσωση $y \cdot 2 = 2(x + 1)$, η οποία γράφεται $y = x + 1$.

- Αν μια παραβολή έχει εξίσωση

$$x^2 = 2py,$$

τότε η εφαπτομένη της στο σημείο $M_1(x_1, y_1)$ έχει εξίσωση

$$xx_1 = p(y + y_1).$$

Ανακλαστική Ιδιότητα Παραβολής

Μια σπουδαία ιδιότητα της παραβολής, γνωστή ως *ανακλαστική ιδιότητα* είναι η εξής:

Η κάθετη στην εφαπτομένη μιας παραβολής στο σημείο επαφής M_1 διχοτομεί τη γωνία που σχηματίζουν η ημιευθεία M_1E και η ημιευθεία M_1N_1 , που είναι ομόρροπη της OE , όπου E είναι η εστία της παραβολής.


ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω ε η εφαπτομένη της παραβολής στο $M_1(x_1, y_1)$ και N_1 το σημείο τομής της με τον άξονα $x'x$. Για να δείξουμε ότι $\varphi_1 = \varphi_2$, αρκεί να δείξουμε ότι $\omega_1 = \omega_2$ ή ισοδύναμα ότι

$$(EM_1) = (EN_1).$$

Πράγματι, επειδή η ε έχει εξίσωση $yy_1 = p(x + x_1)$, το N_1 θα έχει συντεταγμένες $(-x_1, 0)$, οπότε θα ισχύει

$$(EM_1) = \sqrt{\left(x_1 - \frac{p}{2}\right)^2 + y_1^2} \quad \text{και} \quad (EN_1) = \left|\frac{p}{2} + x_1\right|.$$




Επομένως, έχουμε:

$$\begin{aligned}(EM_1) &= \sqrt{\left(x_1 - \frac{p}{2}\right)^2 + y_1^2} = \sqrt{\left(x_1 - \frac{p}{2}\right)^2 + 2px_1} \\ &= \sqrt{\left(x_1 + \frac{p}{2}\right)^2} = \left|x_1 + \frac{p}{2}\right| = (EN_1). \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Η χρήση της παραπάνω ιδιότητας γίνεται στα παραβολικά τηλεσκόπια, στα ραντάρ, στα φανάρια των αυτοκινήτων, στους προβολείς των οδοντιάτρων κτλ. Συγκεκριμένα:

- Όλες οι ακτίνες φωτός που προσπίπτουν στο παραβολικό κάτοπτρο παράλληλα προς τον άξονά του, ανακλώμενες, συγκεντρώνονται στην εστία.
- Στα φανάρια των αυτοκινήτων που έχουν παραβολικά κάτοπτρα οι λαμπτήρες βρίσκονται στην εστία τους. Έτσι, οι φωτεινές ακτίνες, ανακλώμενες στο κάτοπτρο, εξέρχονται παράλληλα προς τον άξονά του.



ΣΧΟΛΙΟ

Σύμφωνα με την προηγούμενη απόδειξη, για να φέρουμε την εφαπτομένη μιας παραβολής σε ένα σημείο της $M_1(x_1, y_1)$, αρκεί να ενώσουμε το σημείο $N_1(-x_1, 0)$ με το $M_1(x_1, y_1)$.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- *1.** Έστω η παραβολή $C : y^2 = 2px$ και $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ οι εφαπτόμενες της παραβολής από ένα σημείο $M_0(x_0, y_0)$ με $x_0 \neq 0$. Αν M_1, M_2 είναι τα σημεία επαφής των $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ με την παραβολή C , να αποδειχτεί ότι
- (i) Η ευθεία M_1M_2 έχει εξίσωση $yy_0 = p(x + x_0)$
 - (ii) Η ευθεία M_1M_2 διέρχεται από την εστία, αν και μόνο αν το M_0 ανήκει στη διευθετούσα της παραβολής.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(i) Αν (x_1, y_1) και (x_2, y_2) είναι οι συντεταγμένες των σημείων M_1 και M_2 , τότε οι εφαπτόμενες ε_1 και ε_2 θα έχουν εξισώσεις:

$$\varepsilon_1 : yy_1 = p(x + x_1)$$

$$\varepsilon_2 : yy_2 = p(x + x_2)$$

και επειδή οι ε_1 και ε_2 διέρχονται από το $M_0(x_0, y_0)$, θα ισχύουν

$$y_0 y_1 = p(x_0 + x_1) \quad \text{και} \quad y_0 y_2 = p(x_0 + x_2).$$

Επομένως, οι συντεταγμένες των M_1 και M_2 θα επαληθεύουν την εξίσωση

$$y_0 y = p(x_0 + x) \quad (1)$$

Άρα, η (1) θα είναι η εξίσωση της χορδής $M_1 M_2$.


(ii) Λόγω της (i), η ευθεία $M_1 M_2$ διέρχεται από την εστία $E\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, αν και μόνο αν οι συντεταγμένες της E επαληθεύουν την εξίσωση της $yy_0 = p(x + x_0)$, δηλαδή, αν και μόνο αν ισχύει $y_0 \cdot 0 = p\left(x_0 + \frac{p}{2}\right)$ ή ισοδύναμα

$$x_0 = -\frac{p}{2},$$

που συμβαίνει, αν και μόνο αν το σημείο $M_0(x_0, y_0)$ ανήκει στη διευθετούσα $x = -\frac{p}{2}$ της παραβολής.

ΣΧΟΛΙΟ

Η ευθεία $M_1 M_2$ λέγεται *πολική* του σημείου M_0 ως προς την παραβολή C , ενώ το σημείο M_0 λέγεται *πόλος* της $M_1 M_2$ ως προς την C . Παρατηρούμε ότι η εξίσωση της πολικής ενός σημείου $M_0(x_0, y_0)$ ως προς την παραβολή $C : y^2 = 2px$ έχει τη μορφή που θα είχε η εφαπτομένη της C στο σημείο $M_0(x_0, y_0)$, αν αυτό ανήκε στην C .



2. Έστω η παραβολή $y^2 = 2px$ και η εφαπτομένη της ε σε ένα σημείο της $M_1(x_1, y_1)$, η οποία τέμνει τη διευθετούσα της παραβολής στο σημείο M_2 . Να αποδειχτεί ότι $M_1\hat{E}M_2 = 90^\circ$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η εξίσωση της ε είναι

$$yy_1 = p(x + x_1). \quad (1)$$

Επειδή το σημείο $M_1(x_1, y_1)$ είναι σημείο της παραβολής, ισχύει $y_1^2 = 2px_1$, οπότε $x_1 = \frac{y_1^2}{2p}$.

Άρα, οι συντεταγμένες του M_1 είναι

$$\left(\frac{y_1^2}{2p}, y_1 \right).$$

Έτσι, η εξίσωση (1) γράφεται

$$yy_1 = p \left(x + \frac{y_1^2}{2p} \right) \quad \text{ή} \quad 2yy_1 = 2px + y_1^2. \quad (2)$$

Επομένως, οι συντεταγμένες του M_2 θα είναι η λύση του συστήματος

$$\begin{cases} x = -\frac{p}{2} \\ 2yy_1 = 2px + y_1^2 \end{cases}.$$

Από την επίλυση του συστήματος αυτού βρίσκουμε ότι οι συντεταγμένες του M_2 είναι


$$\left(-\frac{p}{2}, \frac{y_1^2 - p^2}{2y_1} \right).$$

Έτσι, έχουμε

$$\overline{EM_1} = \left(\frac{y_1^2}{2p} - \frac{p}{2}, y_1 \right) = \left(\frac{y_1^2 - p^2}{2p}, y_1 \right) \quad \text{και} \quad \overline{EM_2} = \left(-\frac{p}{2} - \frac{p}{2}, \frac{y_1^2 - p^2}{2y_1} \right) = \left(-p, \frac{y_1^2 - p^2}{2y_1} \right)$$

$$\text{οπότε} \quad \overline{EM_1} \cdot \overline{EM_2} = -\frac{y_1^2 - p^2}{2} + \frac{y_1^2 - p^2}{2} = 0.$$

Άρα, $\overline{EM_1} \perp \overline{EM_2}$, οπότε $M_1\hat{E}M_2 = 90^\circ$.



ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρεθεί η εξίσωση της παραβολής που έχει κορυφή την αρχή των αξόνων και άξονα συμμετρίας τον άξονα $x'x$ σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - (i) Όταν έχει εστία το σημείο $E(-1,0)$
 - (ii) Όταν έχει διευθετούσα την ευθεία $x = \frac{1}{2}$
 - (iii) Όταν διέρχεται από το σημείο $A(1,2)$.
2. Να βρεθεί η εστία και η διευθετούσα της παραβολής με εξίσωση:
 - (i) $y^2 = 8x$ (ii) $y^2 = -8x$
 - (iii) $y = \frac{1}{4}x^2$ (iv) $y = -\frac{1}{4}x^2$
 - (v) $y^2 = 4\alpha x$ (vi) $y = \frac{1}{4\alpha}x^2$.
3. Δίνεται η παραβολή $y^2 = 2px$. Να αποδειχτεί ότι η κορυφή της παραβολής είναι το πλησιέστερο στην εστία σημείο της.
4. Να βρεθούν οι συντεταγμένες των σημείων A και B της παραβολής $y = \frac{1}{4}x^2$, που έχουν την ίδια τεταγμένη και ισχύει $\widehat{AOB} = 90^\circ$.
5. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης της παραβολής $y = \frac{1}{4}x^2$ σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - (i) Όταν είναι παράλληλη στην ευθεία $y = x + 1$
 - (ii) Όταν είναι κάθετη στην ευθεία $y = -2x$
 - (iii) Όταν διέρχεται από το σημείο $A(0,-1)$.
6. Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόμενες της παραβολής $y = \frac{1}{4}x^2$ στα σημεία $A(4,4)$ και $B\left(-1, \frac{1}{4}\right)$ τέμνονται κάθετα και πάνω στη διευθετούσα της.

Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να αποδειχτεί ότι ο κύκλος $(x-3)^2 + y^2 = 8$ εφάπτεται της παραβολής $y^2 = 4x$. (Δηλαδή, έχουν τις ίδιες εφαπτόμενες στα κοινά σημεία τους).

2. Έστω η παραβολή $y^2 = 12x$. Αν η εφαπτομένη της παραβολής στο σημείο $A(1, 2\sqrt{3})$ τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο B , να αποδειχτεί ότι το τρίγωνο EAB είναι ισόπλευρο.
3. Έστω η παραβολή $y^2 = 4x$. Αν η εφαπτομένη της παραβολής στο σημείο $A(3, 2\sqrt{3})$ τέμνει τη διευθετούσα στο σημείο B , να αποδειχτεί ότι ο κύκλος με διάμετρο AB εφάπτεται στον άξονα $x'x$ στην εστία της παραβολής.
4. Έστω M ένα σημείο της παραβολής $y^2 = 2px$. Να αποδειχτεί ότι ο κύκλος με διάμετρο EM , όπου E η εστία της παραβολής, εφάπτεται στον άξονα $y'y$.
5. Έστω η παραβολή $y^2 = 2px$ και η εφαπτομένη της ε σε ένα σημείο $A(x_1, y_1)$ αυτής. Αν η ευθεία OA τέμνει τη διευθετούσα της παραβολής στο σημείο B , να αποδειχτεί ότι $BE \parallel \varepsilon$.
6. Αν η εφαπτομένη της παραβολής $y^2 = 2px$ στο σημείο της A τέμνει τη διευθετούσα στο σημείο B και τον άξονα $y'y$ στο σημείο K , να αποδειχτεί ότι
(i) $\hat{AEB} = 90^\circ$, (ii) $EK \perp AB$ και (iii) $(EK)^2 = (KA)(KB)$.
7. Έστω η παραβολή $y^2 = 2px$ και ένα σημείο της $A(x_1, y_1)$. Φέρνουμε την εφαπτομένη της παραβολής στο A , που τέμνει τον άξονα $x'x$ στο B και την παράλληλη από το A στον άξονα $x'x$, που τέμνει τη διευθετούσα στο Γ . Να αποδειχτεί ότι το τετράπλευρο $AEB\Gamma$ είναι ρόμβος με κέντρο στον άξονα $y'y$.
8. Δίνονται οι παραβολές $C_1 : y^2 = 2px$ και $C_2 : x^2 = 2py$
(i) Να αποδείξετε ότι οι C_1 και C_2 τέμνονται στα σημεία $O(0,0)$ και $A(2p, 2p)$
(ii) Αν οι εφαπτόμενες των C_1 και C_2 στο A τέμνουν τις C_2 και C_1 στα σημεία B και Γ αντιστοίχως, να αποδείξετε ότι η $B\Gamma$ είναι κοινή εφαπτομένη των C_1 και C_2 .

3.3 Η ΕΛΛΕΙΨΗ

Ορισμός Έλλειψης


Έστω E' και E δύο σημεία ενός επιπέδου. Ονομάζεται **έλλειψη** με **εστίες** τα σημεία E' και E ο γεωμετρικός τόπος C των σημείων του επιπέδου των οποίων το άθροισμα των αποστάσεων από τα E' και E είναι σταθερό και μεγαλύτερο του $E'E$. Το σταθερό αυτό άθροισμα το συμβολίζουμε, συνήθως, με $2a$ και την

απόσταση των εστιών E' και E με 2γ . Η απόσταση $E'E$ ονομάζεται **εστιακή απόσταση** της έλλειψης.


Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό:

α) Ένα σημείο M του επιπέδου είναι σημείο της έλλειψης, αν και μόνο αν

$$(ME') + (ME) = 2\alpha$$



β) Ισχύει $(E'E) < (ME') + (ME)$, δηλαδή $2\gamma < 2\alpha$ οπότε $\gamma < \alpha$. Αν $\gamma = 0$, τότε τα σημεία E', E συμπίπτουν, οπότε η έλλειψη γίνεται κύκλος με κέντρο το E και ακτίνα α .




Για να βρούμε ένα σημείο της έλλειψης C , εργαζόμαστε ως εξής:

Παίρνουμε ένα τμήμα KA μήκους 2α και ένα οποιοδήποτε σημείο του Σ . Με κέντρα τα E' και E και ακτίνες $\rho' = (K\Sigma)$ και $\rho = (A\Sigma)$, αντιστοίχως, γράφουμε δύο κύκλους, οι οποίοι τέμνονται στα σημεία M και M' . Τα σημεία M και M' είναι σημεία της έλλειψης, γιατί ισχύει $(ME') + (ME) = \rho' + \rho = 2\alpha$ και $(ME') + (ME) = \rho' + \rho = 2\alpha$.

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε οσαδήποτε σημεία της έλλειψης.

Πρακτικά μπορούμε να σχεδιάσουμε την έλλειψη ως εξής: Παίρνουμε ένα σχοινί μήκους 2α και στερεώνουμε τα άκρα του στις εστίες E' και E . Αν τώρα με ένα μολύβι διατηρούμε το σχοινί τεντωμένο, τότε αυτό, κατά την κίνησή του, θα διαγράψει την έλλειψη.




Εξίσωση Έλλειψης

• Έστω μια έλλειψη C με εστίες E' και E . Θα βρούμε την εξίσωση της έλλειψης ως προς σύστημα συντεταγμένων Oxy με άξονα των x την ευθεία $E'E$ και άξονα των y τη μεσοκάθετο του $E'E$.

Αν $M(x, y)$ είναι ένα σημείο της έλλειψης C , τότε θα ισχύει

$$(ME') + (ME) = 2\alpha. \quad (1)$$



Επειδή $(E'E) = 2\gamma$, οι εστίες E' και E θα

έχουν συντεταγμένες $(-\gamma, 0)$ και $(\gamma, 0)$ αντιστοίχως. Επομένως,

$$(ME') = \sqrt{(x+\gamma)^2 + y^2} \quad \text{και} \quad (ME) = \sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2}.$$

Έτσι, η σχέση (1) γράφεται

$$\sqrt{(x+\gamma)^2 + y^2} + \sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} = 2\alpha,$$

από την οποία έχουμε διαδοχικά:

$$\sqrt{(x+\gamma)^2 + y^2} = 2\alpha - \sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2}$$

$$(x+\gamma)^2 + y^2 = 4\alpha^2 + (x-\gamma)^2 + y^2 - 4\alpha\sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2}$$

$$x^2 + \gamma^2 + 2\gamma x + y^2 = 4\alpha^2 + x^2 + \gamma^2 - 2\gamma x + y^2 - 4\alpha\sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2}$$

$$\alpha\sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} = \alpha^2 - \gamma x \quad (2)$$

$$\alpha^2(x^2 + \gamma^2 - 2\gamma x + y^2) = (\alpha^2 - \gamma x)^2$$

$$\alpha^2 x^2 + \alpha^2 \gamma^2 - 2\alpha^2 \gamma x + \alpha^2 y^2 = \alpha^4 + \gamma^2 x^2 - 2\alpha^2 \gamma x$$

$$(\alpha^2 - \gamma^2)x^2 + \alpha^2 y^2 = \alpha^2(\alpha^2 - \gamma^2)$$

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\alpha^2 - \gamma^2} = 1. \quad (3)$$

Επειδή $\alpha > \gamma$, είναι $\alpha^2 - \gamma^2 > 0$, οπότε αν θέσουμε $\beta = \sqrt{\alpha^2 - \gamma^2}$, η εξίσωση (3) παίρνει τη μορφή

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1. \quad (4)$$

Αποδεικνύεται και το *αντίστροφο*, δηλαδή ότι κάθε σημείο $M(x, y)$, του οποίου οι συντεταγμένες επαληθεύουν την εξίσωση (4), είναι σημείο της έλλειψης C . Επομένως, η εξίσωση της έλλειψης C με εστίες τα σημεία $E'(-\gamma, 0)$, $E(\gamma, 0)$ και σταθερό άθροισμα 2α είναι

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1, \text{ όπου } \beta = \sqrt{\alpha^2 - \gamma^2}$$

Για παράδειγμα, η εξίσωση της έλλειψης με εστίες τα σημεία $E'(-4, 0)$, $E(4, 0)$ και σταθερό άθροισμα $2\alpha = 10$ είναι


$$\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1, \text{ αφού } \beta = \sqrt{\alpha^2 - \gamma^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3.$$

• Αν τώρα πάρουμε σύστημα συντεταγμένων Oxy με άξονα των x τη μεσοκάθετο του $E'E$ και άξονα των y την ευθεία $E'E$ και εργαστούμε όπως πριν, θα βρούμε ότι η εξίσωση της έλλειψης C είναι

$$\frac{x^2}{\beta^2} + \frac{y^2}{\alpha^2} = 1, \text{ όπου } \beta = \sqrt{\alpha^2 - \gamma^2}$$

Για παράδειγμα, η έλλειψη με εστίες $E'(0, -4)$, $E(0, 4)$ και σταθερό άθροισμα $2\alpha = 10$ είναι

$$\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{5^2} = 1, \text{ αφού } \beta = \sqrt{\alpha^2 - \gamma^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3.$$




Ιδιότητες Έλλειψης

Έστω μια έλλειψη

$$C: \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1, \text{ όπου } \beta = \sqrt{\alpha^2 - \gamma^2}$$

• Αν $M_1(x_1, y_1)$ είναι ένα σημείο της έλλειψης C , τότε τα σημεία $M_2(x_1, -y_1)$, $M_3(-x_1, y_1)$ και $M_4(-x_1, -y_1)$ ανήκουν στην C , αφού οι συντεταγμένες τους επαλη-



θεύουν την εξίσωσή της. Αυτό σημαίνει ότι η παραπάνω έλλειψη έχει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ άξονες συμμετρίας και την αρχή των αξόνων κέντρο συμμετρίας. Επομένως, η ευθεία που ενώνει τις εστίες E', E της έλλειψης και η μεσοκάθετος του $E'E$ είναι άξονες συμμετρίας της έλλειψης, ενώ το μέσο O του $E'E$ είναι κέντρο συμμετρίας της. Το σημείο O λέγεται **κέντρο** της έλλειψης.

• Από την εξίσωση της έλλειψης για $y=0$ βρίσκουμε $x=\pm\alpha$, ενώ για $x=0$ βρίσκουμε $y=\pm\beta$. Επομένως, η έλλειψη C τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία $A'(-\alpha, 0)$ και $A(\alpha, 0)$, ενώ τον άξονα $y'y$ στα σημεία $B'(0, -\beta)$ και $B(0, \beta)$. Τα σημεία A', A, B', B λέγονται **κορυφές** της έλλειψης, ενώ τα ευθύγραμμα τμήματα $A'A$ και $B'B$, τα οποία έχουν μήκη $(A'A)=2\alpha$ και $(B'B)=2\beta$, λέγονται **μεγάλος άξονας** και **μικρός άξονας** αντιστοίχως. Το ευθύγραμμο τμήμα που ορίζουν δύο οποιαδήποτε συμμετρικά ως προς O σημεία M_1 και M_4 της έλλειψης λέγεται **διάμετρος** της έλλειψης. Αποδεικνύεται ότι

$$2\beta \leq (M_1M_4) \leq 2\alpha,$$

δηλαδή ότι κάθε διάμετρος της έλλειψης είναι μεγαλύτερη ή ίση από το μικρό άξονα και μικρότερη ή ίση από το μεγάλο άξονα της έλλειψης.

• Τέλος, από την εξίσωση της έλλειψης, έχουμε

$$\frac{x^2}{\alpha^2} = 1 - \frac{y^2}{\beta^2} \leq 1$$

οπότε

$$x^2 - \alpha^2 \leq 0$$

και άρα

$$-\alpha \leq x \leq \alpha.$$

Ομοίως

$$-\beta \leq y \leq \beta.$$

Άρα, η έλλειψη περιέχεται στο ορθογώνιο που ορίζουν οι ευθείες $x=-\alpha$, $x=\alpha$ και $y=-\beta$, $y=\beta$.

Εκκεντρότητα Έλλειψης

Μια παράμετρος που καθορίζει τη μορφή της έλλειψης είναι η εκκεντρότητα της έλλειψης. Ονομάζουμε **εκκεντρότητα** της έλλειψης $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και τη συμβο-

λίζουμε με ε , το λόγο $\varepsilon = \frac{\gamma}{\alpha} < 1$. Επειδή $\gamma = \sqrt{\alpha^2 - \beta^2}$, είναι $\varepsilon = \frac{\sqrt{\alpha^2 - \beta^2}}{\alpha}$, οπότε


$$\varepsilon^2 = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha^2} = 1 - \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^2 \text{ και άρα}$$

$$\frac{\beta}{\alpha} = \sqrt{1 - \varepsilon^2}. \quad (1)$$


Επομένως, όσο μεγαλώνει η εκκεντρότητα τόσο μικραίνει ο λόγος $\frac{\beta}{\alpha}$ και κατά συνέπεια τόσο πιο επιμήκης γίνεται η έλλειψη (Σχ. α).

Όταν το ε τείνει στο μηδέν, τότε ο λόγος $\frac{\beta}{\alpha}$ τείνει στο 1 και επομένως η έλλειψη τείνει να γίνει κύκλος. Όταν, όμως, το ε τείνει στη μονάδα, τότε ο λόγος $\frac{\beta}{\alpha}$ τείνει στο 0 και επομένως η έλλειψη τείνει να εκφυλιστεί σε ευθύγραμμο τμήμα.

Οι ελλείψεις που έχουν την ίδια εκκεντρότητα, άρα ίδιο λόγο $\frac{\beta}{\alpha}$, λέγονται **όμοιες** (Σχ. β).



(α)



(β)

Είναι γνωστό από την Αστρονομία ότι οι τροχιές των πλανητών γύρω από τον Ήλιο είναι ελλείψεις, των οποίων τη μία εστία κατέχει ο Ήλιος. Οι εκκεντρότητες των τροχιών αυτών είναι οι εξής:

Πλανήτης	εκκεντρότητα	Πλανήτης	εκκεντρότητα
Ερμής	0,206	Κρόνος	0,051
Αφροδίτη	0,007	Ουρανός	0,046
Γη	0,017	Ποσειδώνας	0,005
Αρης	0,093	Πλούτωνας	0,250
Δίας	0,049		

Παραμετρικές Εξισώσεις Έλλειψης

Έστω η έλλειψη $C: \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και ένα σημείο $M(x, y)$ του καρτεσιανού επιπέδου.

— Αν το $M(x, y)$ ανήκει στην έλλειψη C , τότε θα ισχύει $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, οπότε θα έχουμε

$$\left(\frac{x}{\alpha}\right)^2 + \left(\frac{y}{\beta}\right)^2 = 1.$$

Επομένως, το σημείο $N\left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta}\right)$ θα ανήκει στο μοναδιαίο κύκλο, οπότε θα υπάρ-

χει γωνία $\varphi \in [0, 2\pi)$, τέτοια, ώστε $\frac{x}{\alpha} = \sigma\upsilon\nu\varphi$ και $\frac{y}{\beta} = \eta\mu\varphi$, δηλαδή

$$x = \alpha \sigma\upsilon\nu\varphi \text{ και } y = \beta \eta\mu\varphi. \quad (1)$$

— Αντιστρόφως, αν ισχύουν οι (1) για κάποια γωνία $\varphi \in [0, 2\pi)$, τότε το σημείο $M(x, y)$ θα ανήκει στην έλλειψη C , αφού


$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = \frac{\alpha^2 \sigma\upsilon\nu^2\varphi}{\alpha^2} + \frac{\beta^2 \eta\mu^2\varphi}{\beta^2} = \sigma\upsilon\nu^2\varphi + \eta\mu^2\varphi = 1.$$

Επομένως, οι συντεταγμένες των σημείων $M(x, y)$ της έλλειψης C και μόνο αυτές ικανοποιούν τις εξισώσεις

$$x = \alpha \sigma\upsilon\nu\varphi \quad \text{και} \quad y = \beta \eta\mu\varphi, \quad \varphi \in [0, 2\pi).$$

Οι εξισώσεις αυτές λέγονται **παραμετρικές εξισώσεις** της έλλειψης C . Σύμφωνα με τις παραμετρικές εξισώσεις το σημείο $M(\alpha \sigma\upsilon\nu\varphi, \beta \eta\mu\varphi)$ της έλλειψης προσδιορίζεται ως εξής:

Γράφουμε τους κύκλους C_1 και C_2 με κέντρο O και ακτίνες β και α αντίστοιχως και φέρνουμε μια ημιευθεία Ot , έτσι ώστε $(Ox, Ot) = \varphi$. Αν η ημιευθεία Ot τέμνει τους C_1 και C_2 στα σημεία M_1 και M_2 αντίστοιχως και οι



παράλληλες από τα M_1, M_2 προς τους άξονες $x'x, y'y$, αντιστοίχως, τέμνονται στο σημείο M , τότε το M θα ανήκει στην έλλειψη C . Πράγματι, το σημείο M_1 θα έχει συντεταγμένες $(\beta \sigma \nu \varphi, \beta \eta \mu \varphi)$, ενώ το M_2 θα έχει συντεταγμένες $(\alpha \sigma \nu \varphi, \alpha \eta \mu \varphi)$. Άρα, οι συντεταγμένες του M θα είναι $(\alpha \sigma \nu \varphi, \beta \eta \mu \varphi)$.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Έστω ο κύκλος $x^2 + y^2 = a^2$, $a > 0$ και ένα σημείο του M_1 , του οποίου η ορθή προβολή στον άξονα $x'x$ είναι το σημείο M_2 . Πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα M_1M_2 ορίζουμε ένα σημείο M , τέτοιο, ώστε να ισχύει $\frac{(M_2M)}{(M_2M_1)} = \frac{\beta}{\alpha}$, $0 < \beta < \alpha$.

Να αποδειχτεί ότι αν το M_1 κινείται στον κύκλο, το M κινείται στην έλλειψη $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω (x_1, y_1) οι συντεταγμένες του M_1 και (x, y) οι συντεταγμένες του M . Επει-

δή $\frac{(M_2M)}{(M_2M_1)} = \frac{\beta}{\alpha}$, έχουμε $\frac{y}{y_1} = \frac{\beta}{\alpha}$, οπότε

$$y_1 = \frac{\alpha}{\beta} y. \quad (1)$$


Επειδή, επιπλέον η M_1M_2 είναι κάθετη στον άξονα $x'x$ θα ισχύει

$$x_1 = x. \quad (2)$$

Όμως, το σημείο $M_1(x_1, y_1)$ ανήκει στον κύκλο $x^2 + y^2 = a^2$. Επομένως, ισχύει $x_1^2 + y_1^2 = a^2$, οπότε, λόγω των σχέσεων (1) και (2), έχουμε

$$x^2 + \left(\frac{\alpha}{\beta} y \right)^2 = a^2 \Leftrightarrow x^2 + \frac{\alpha^2 y^2}{\beta^2} = a^2 \Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1.$$

Άρα, το σημείο $M(x, y)$ ανήκει στην έλλειψη $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$.




Εφαπτομένη Έλλειψης

- Έστω μια έλλειψη C με εξίσωση

$$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$$

και ένα σημείο της $M_1(x_1, y_1)$. Η **εφαπτομένη** της έλλειψης C στο σημείο $M_1(x_1, y_1)$ ορίζεται με τρόπο ανάλογο προς εκείνο με τον οποίο ορίστηκε η εφαπτομένη της παραβολής και αποδεικνύεται ότι έχει εξίσωση

$$\frac{xx_1}{\alpha^2} + \frac{yy_1}{\beta^2} = 1$$



Για παράδειγμα, η εφαπτομένη της έλλειψης $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ στο σημείο

της $M_1(2, \sqrt{3})$ έχει εξίσωση $\frac{x \cdot 2}{16} + \frac{y \sqrt{3}}{4} = 1$, η οποία γράφεται ισοδύναμα

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{6}x + \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

- Αν μια έλλειψη έχει εξίσωση


$$\frac{y^2}{\alpha^2} + \frac{x^2}{\beta^2} = 1,$$

τότε η εφαπτομένη της στο σημείο $M_1(x_1, y_1)$ έχει εξίσωση

$$\frac{yy_1}{\alpha^2} + \frac{xx_1}{\beta^2} = 1.$$


- Όπως η παραβολή έτσι και η έλλειψη έχει ανάλογη ανακλαστική ιδιότητα. Συγκεκριμένα:

Η κάθετη στην εφαπτομένη μιας έλλειψης στο σημείο επαφής M διχοτομεί τη γωνία $E'\hat{M}E$, όπου E', E οι εστίες της έλλειψης.



Σύμφωνα με την ιδιότητα αυτή ένα ηχητικό κύμα ή μια φωτεινή ακτίνα που ξεκινούν από τη μία εστία μιας έλλειψης, ανακλώμενα σε αυτήν, διέρχονται από την άλλη εστία.

Η ιδιότητα αυτή χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό ορισμένων τύπων οπτικών οργάνων και στην κατασκευή των λεγόμενων “στοών με ειδική ακουστική”. Οι στοές αυτές είναι αίθουσες με ελλειπτική οροφή, στις οποίες ένα πρόσωπο που ψιθυρίζει στη μια εστία μπορεί να ακουστεί στην άλλη εστία. Ακόμη, η ανακλαστική ιδιότητα της έλλειψης βρίσκει σπουδαία εφαρμογή σε μια ιατρική μέθοδο που λέγεται *λιθοθρυψία*. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ως εξής: Στη μια εστία της έλλειψης τοποθετείται ένα ηλεκτρόδιο εκπομπής υπερήχων, ενώ ο ασθενής τοποθετείται σε τέτοια θέση, ώστε το νεφρό του να είναι στην άλλη εστία. Τότε οι πέτρες του νεφρού κονιοροτοποιούνται από τους ανακλώμενους υπερήχους.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Δίνονται η έλλειψη $C_1 : \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και ο κύκλος $C_2 : x^2 + y^2 = \alpha^2$. Αν

$M_1(x_1, y_1)$ είναι ένα σημείο της C_1 και $M_2(x_2, y_2)$ το σημείο του C_2 με $x_2 = x_1 \neq 0$, να αποδειχτεί ότι η εφαπτομένη ε_1 της έλλειψης C_1 στο σημείο M_1 και η εφαπτομένη ε_2 του κύκλου C_2 στο σημείο M_2 τέμνονται πάνω στον άξονα $x'x$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η εξίσωση της ε_1 είναι

$$\frac{xx_1}{\alpha^2} + \frac{yy_1}{\beta^2} = 1 \quad (1)$$


και της ε_2 είναι

$$xx_1 + yy_2 = \alpha^2. \quad (2)$$

Για $y=0$, από την (1) βρίσκουμε $x = \frac{\alpha^2}{x_1}$,

ενώ από τη (2) βρίσκουμε $x = \frac{\alpha^2}{x_1}$. Άρα, και η ε_1 και η ε_2 τέμνουν τον x' στο ίδιο

σημείο, το $M\left(\frac{\alpha^2}{x_1}, 0\right)$.



ΣΧΟΛΙΟ

Σύμφωνα με την εφαρμογή αυτή, για να φέρουμε την εφαπτομένη ε_1 της έλλειψης C_1 στο σημείο M_1 , φέρνουμε την εφαπτομένη ε_2 του κύκλου C_2 στο σημείο M_2 και στη συνέχεια ενώνουμε το σημείο τομής M των ε_2 και x' με το σημείο M_1 . Η MM_1 είναι η ζητούμενη εφαπτομένη.

2. Έστω C η έλλειψη με εστίες τα σημεία $E'(-\gamma, 0)$ και $E(\gamma, 0)$ και μεγάλο άξονα $2a$. Να αποδειχτεί ότι ο λόγος των αποστάσεων οποιουδήποτε σημείου $M(x, y)$ της έλλειψης από την εστία $E(\gamma, 0)$ και την ευθεία $\delta : x = \frac{\alpha^2}{\gamma}$ είναι σταθερός και ίσος με την εκκεντρότητα της έλλειψης.

Ομοίως, για την εστία $E'(-\gamma, 0)$ και την ευθεία $\delta' : x = -\frac{\alpha^2}{\gamma}$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Επειδή το $M(x, y)$ ανήκει στην έλλειψη C , θα ισχύει

$$(ME') + (ME) = 2a. \quad (1)$$


Επομένως, όπως είδαμε στην απόδειξη της εξίσωσης της έλλειψης, θα έχουμε

$$\alpha \sqrt{(x - \gamma)^2 + y^2} = \alpha^2 - \gamma x \quad (2)$$

Η ισότητα αυτή γράφεται διαδοχικά:

$$\begin{aligned}\sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} &= \alpha - \frac{\gamma}{\alpha}x \\ \sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} &= \frac{\gamma}{\alpha} \left(\frac{\alpha^2}{\gamma} - x \right).\end{aligned}\quad (3)$$

Όμως,



$$\sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} = d(M, E) \quad \text{και} \quad \frac{\alpha^2}{\gamma} - x = d(M, \delta).$$

Επομένως, η (3) γράφεται

$$d(M, E) = \frac{\gamma}{\alpha} d(M, \delta)$$

ή ισοδύναμα

$$\frac{d(M, E)}{d(M, \delta)} = \frac{\gamma}{\alpha} = \varepsilon < 1.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε την εξίσωση της έλλειψης σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- (i) Όταν έχει εστίες τα σημεία $E'(-4, 0)$ και $E(4, 0)$ και μεγάλο άξονα 10
- (ii) Όταν έχει εστίες τα σημεία $E'(0, -5)$ και $E(0, 5)$ και μεγάλο άξονα 26
- (iii) Όταν έχει εστίες τα σημεία $E'(-12, 0)$ και $E(12, 0)$ και εκκεντρότητα $\frac{12}{13}$
- (iv) Όταν έχει εστίες τα σημεία $E'(-4, 0)$ και $E(4, 0)$ και διέρχεται από το

$$\text{σημείο } M\left(4, \frac{9}{5}\right)$$

- (v) Όταν έχει κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων, εστίες στον άξονα

$$x'x \text{ και διέρχεται από τα σημεία } M_1(1, 1) \text{ και } M_2\left(2, \frac{1}{2}\right).$$

2. Να βρείτε τα μήκη των αξόνων, τις εστίες και την εκκεντρότητα των ελλείψεων:

- (i) $x^2 + 4y^2 = 4$ (ii) $169x^2 + 144y^2 = 24336$.

3. Να εγγράψετε στην έλλειψη $4x^2 + y^2 = 4$ τετράγωνο με πλευρές παράλληλες προς τους άξονες.
4. Αν E', E είναι οι εστίες και $B'B$ ο μικρός άξονας της έλλειψης $x^2 + 2y^2 = 4$, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $EBB'E'$ είναι τετράγωνο.
5. Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόμενες μιας έλλειψης στα άκρα μιας διαμέτρου της είναι παράλληλες. (Διάμετρος μιας έλλειψης λέγεται το τμήμα που συνδέει δύο σημεία της έλλειψης και διέρχεται από την αρχή των αξόνων).
6. Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτομένων της έλλειψης $3x^2 + y^2 = 4$, οι οποίες:
 - (i) είναι παράλληλες προς την ευθεία $y = -3x + 1$
 - (ii) είναι κάθετες στην ευθεία $y = \frac{1}{2}x$
 - (iii) διέρχονται από το σημείο $M(0, 4)$.
7. Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόμενες της έλλειψης $x^2 + 4y^2 = 100$ στα σημεία της $M_1(4\sqrt{5}, \sqrt{5})$, $M_2(-4\sqrt{5}, \sqrt{5})$, $M_3(-4\sqrt{5}, -\sqrt{5})$ και $M_4(4\sqrt{5}, -\sqrt{5})$ σχηματίζουν τετράγωνο με διαγώνιους τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να αποδείξετε ότι το σημείο $M\left(\frac{\alpha(1-t^2)}{1+t^2}, \frac{2\beta t}{1+t^2}\right)$ ανήκει στην έλλειψη $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ για όλες τις τιμές του $t \in \mathbf{R}$.
2. Να αποδείξετε ότι το σημείο τομής των ευθειών $\alpha y = \lambda\beta(\alpha + x)$ και $\lambda\alpha y = \beta(\alpha - x)$, $0 < \beta < \alpha$, ανήκει στην έλλειψη $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ για όλες τις τιμές του $\lambda \in \mathbf{R}^*$.
3. Αν $M(x, y)$ είναι ένα σημείο της έλλειψης $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, να αποδείξετε ότι $(ME') = \alpha + \varepsilon x$ και $(ME) = \alpha - \varepsilon x$.
4. Αν d, d' είναι οι αποστάσεις των σημείων $\Gamma(0, \gamma)$ και $\Gamma'(0, -\gamma)$ από την εφαπτομένη της έλλειψης $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ σε ένα σημείο της $M_1(x_1, y_1)$, να αποδείξετε ότι $d^2 + d'^2 = 2\alpha^2$.

5. Έστω $M_1(x_1, y_1)$, $M_2(x_2, y_2)$ δύο σημεία της έλλειψης $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και τα σημεία $N_1(\varepsilon x_1, 0)$ και $N_2(\varepsilon x_2, 0)$. Να αποδείξετε ότι $(M_1 N_2) = (M_2 N_1)$.
6. Έστω η έλλειψη $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και ένα σημείο της M . Έστω επιπλέον, ο κύκλος $x^2 + y^2 = \alpha^2$ και το σημείο του N , που έχει την ίδια τετμημένη με το M . Από το M φέρνουμε παράλληλη προς την ON , που τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία Γ και Δ αντιστοίχως. Να αποδείξετε ότι $M\Gamma = \beta$ και $M\Delta = \alpha$.
7. Έστω ε και ε' οι εφαπτόμενες της έλλειψης $C : \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, $0 < \beta < \alpha$ στις κορυφές της $A(\alpha, 0)$ και $A'(-\alpha, 0)$, αντιστοίχως, και ζ η εφαπτομένη της C σε ένα σημείο της $M_1(x_1, y_1)$. Αν η ζ τέμνει τις ε και ε' στα σημεία Γ και Γ' , αντιστοίχως, να αποδείξετε ότι:
- (i) $(A\Gamma)(A'\Gamma') = \beta^2$
- (ii) ο κύκλος με διάμετρο το $\Gamma\Gamma'$ διέρχεται από τις εστίες της έλλειψης.
8. Έστω η έλλειψη $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και η εφαπτομένη στο σημείο της $M_1(x_1, y_1)$. Αν η εφαπτομένη τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία $\Gamma(p, 0)$ και $\Delta(0, q)$, να αποδείξετε ότι $\frac{\alpha^2}{p^2} + \frac{\beta^2}{q^2} = 1$.

3.4 Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ

Ορισμός Υπερβολής

Έστω E' και E δύο σημεία ενός επιπέδου. Ονομάζεται **υπερβολή** με εστίες τα σημεία E' και E ο γεωμετρικός τόπος C των σημείων του επιπέδου των οποίων η απόλυτη τιμή της διαφοράς των αποστάσεων από τα E' και E είναι σταθερή και μικρότερη του $(E'E)$. Την απόλυτη τιμή της διαφοράς των αποστάσεων κάθε σημείου της υπερβολής από τις εστίες την παριστάνουμε συνήθως με $2a$, ενώ την απόσταση των εστιών με 2γ . Η απόσταση $E'E$ ονομάζεται **εστιακή απόσταση** της υπερβολής.



Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό:

α) Ένα σημείο M είναι σημείο της υπερβολής, αν και μόνο αν

$$|(ME') - (ME)| = 2\alpha.$$

β) Ισχύει $|(ME') - (ME)| < (E'E)$ δηλαδή $2\alpha < 2\gamma$, οπότε $\alpha < \gamma$.

Για να βρούμε σημεία της υπερβολής C , εργαζόμαστε ως εξής: Παίρνουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα KA μήκους 2α και ένα οποιοδήποτε σημείο Σ της ημιευθείας KA εκτός του ευθύγραμμου τμήματος KA . Με κέντρα E' και E και ακτίνες $\rho' = (K\Sigma)$ και $\rho = (A\Sigma)$, αντιστοίχως, γράφουμε κύκλους οι οποίοι τέμνονται στα σημεία M και M' . Τα σημεία M και M' είναι σημεία της υπερβολής, γιατί ισχύει $(ME') - (ME) = (K\Sigma) - (A\Sigma) = (KA) = 2\alpha$. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να κατασκευάσουμε οσαδήποτε σημεία της υπερβολής.



Εξίσωση Υπερβολής

• Έστω C μια υπερβολή με εστίες E' και E . Θα βρούμε την εξίσωση της C ως προς σύστημα συντεταγμένων Oxy με άξονα των x την ευθεία $E'E$ και άξονα των y τη μεσοκάθετη του $E'E$.

Αν $M(x, y)$ είναι ένα σημείο της υπερβολής C , τότε θα ισχύει


$$|(ME') - (ME)| = 2\alpha, \quad (1)$$

Επειδή $(E'E) = 2\gamma$, οι εστίες E' και E θα έχουν συντεταγμένες $(-\gamma, 0)$ και $(\gamma, 0)$ αντιστοίχως. Επομένως,

$$(ME') = \sqrt{(x + \gamma)^2 + y^2} \quad \text{και} \quad (ME) = \sqrt{(x - \gamma)^2 + y^2}$$

Έτσι η σχέση (1) γράφεται

$$\left| \sqrt{(x + \gamma)^2 + y^2} - \sqrt{(x - \gamma)^2 + y^2} \right| = 2\alpha$$



από την οποία έχουμε διαδοχικά:

$$(x+\gamma)^2 + y^2 + (x-\gamma)^2 + y^2 - 2\sqrt{(x+\gamma)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} = 4\alpha^2$$

$$\sqrt{(x+\gamma)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x-\gamma)^2 + y^2} = x^2 + y^2 + \gamma^2 - 2\alpha^2$$

$$[(x^2 + y^2 + \gamma^2) + 2\gamma x] \cdot [(x^2 + y^2 + \gamma^2) - 2\gamma x] = [(x^2 + y^2 + \gamma^2) - 2\alpha^2]^2$$

$$(x^2 + y^2 + \gamma^2)^2 - 4\gamma^2 x^2 = (x^2 + y^2 + \gamma^2)^2 + 4\alpha^4 - 4\alpha^2(x^2 + y^2 + \gamma^2)$$

$$\alpha^2 x^2 - \gamma^2 x^2 + \alpha^2 y^2 = \alpha^4 - \alpha^2 \gamma^2$$

$$(\alpha^2 - \gamma^2)x^2 + \alpha^2 y^2 = \alpha^2(\alpha^2 - \gamma^2)$$

$$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\gamma^2 - \alpha^2} = 1. \quad (1)$$

Επειδή $\gamma > \alpha$, είναι $\gamma^2 - \alpha^2 > 0$, οπότε, αν θέσουμε $\beta = \sqrt{\gamma^2 - \alpha^2}$, η εξίσωση (1) παίρνει τη μορφή

$$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1. \quad (2)$$

Αποδεικνύεται και το *αντίστροφο*, δηλαδή ότι κάθε σημείο $M(x, y)$ του οποίου οι συντεταγμένες επαληθεύουν την εξίσωση (2) είναι σημείο της υπερβολής C . Επομένως, η εξίσωση της υπερβολής C με εστίες τα σημεία $E'(-\gamma, 0)$, $E(\gamma, 0)$, και σταθερή διαφορά 2α είναι


$$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1, \text{ όπου } \beta = \sqrt{\gamma^2 - \alpha^2}$$

Για παράδειγμα, η εξίσωση της υπερβολής με εστίες τα σημεία $E'(-13, 0)$, $E(13, 0)$ και σταθερή διαφορά $2\alpha = 24$ είναι

$$\frac{x^2}{12^2} - \frac{y^2}{5^2} = 1, \text{ αφού } \beta = \sqrt{\gamma^2 - \alpha^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5$$

- Αν τώρα πάρουμε σύστημα συντεταγμένων Oxy με άξονα των y την ευθεία $E'E$ και άξονα των x τη μεσοκάθετο του $E'E$ και εργαστούμε όπως πριν, θα βρούμε ότι η εξίσωση της υπερβολής C είναι:

$$\frac{y^2}{\alpha^2} - \frac{x^2}{\beta^2} = 1, \quad \text{όπου} \quad \beta = \sqrt{\gamma^2 - \alpha^2}.$$



Για παράδειγμα, η εξίσωση της υπερβολής με εστίες τα σημεία $E'(0, -13)$, $E(0, 13)$ και σταθερή διαφορά $2\alpha = 24$, είναι


$$\frac{y^2}{12^2} - \frac{x^2}{5^2} = 1, \quad \text{αφού} \quad \beta = \sqrt{\gamma^2 - \alpha^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5.$$

- Τέλος, αν είναι $\alpha = \beta$, τότε η υπερβολή λέγεται **ισοσκελής** και η εξίσωσή της γράφεται: $x^2 - y^2 = \alpha^2$.

Ιδιότητες Υπερβολής

Έστω μια υπερβολή C , η οποία ως προς ένα σύστημα συντεταγμένων Oxy έχει εξίσωση $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, όπου $\beta = \sqrt{\gamma^2 - \alpha^2}$.

- Αν $M_1(x_1, y_1)$ είναι ένα σημείο της υπερβολής C , τότε και τα σημεία $M_2(x_1, -y_1)$, $M_3(-x_1, y_1)$ και $M_4(-x_1, -y_1)$ ανήκουν στην C , αφού οι συντεταγμένες τους επαληθεύουν την εξίσωσή της. Αυτό σημαίνει ότι η υπερβολή C έχει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ άξονες συμμετρίας και την αρχή των αξόνων κέντρο συμμετρίας. Επομένως, η ευθεία που ενώνει τις εστίες E', E της υπερβολής και η μεσοκάθετη του $E'E$ είναι άξονες συμμετρίας της υπερβολής, ενώ το μέσο O του $E'E$ είναι κέντρο συμμετρίας της. Το σημείο O λέγεται **κέντρο** της υπερβολής.



• Από την εξίσωση της υπερβολής για $y = 0$ βρίσκουμε $x = \pm\alpha$. Συνεπώς, η υπερβολή τέμνει τον άξονα x' στα σημεία $A'(-\alpha, 0)$, και $A(\alpha, 0)$. Τα σημεία αυτά λέγονται **κορυφές** της υπερβολής. Από την ίδια εξίσωση για $x = 0$ προκύπτει η εξίσωση $y^2 = -\beta^2$, η οποία είναι αδύνατη στο $\mathbf{R}$. Επομένως, **η υπερβολή C δεν τέμνει τον άξονα $y'y$.**

• Τέλος, από την εξίσωση της υπερβολής, έχουμε

$$\frac{x^2}{\alpha^2} = 1 + \frac{y^2}{\beta^2} \geq 1,$$

οπότε

$$x^2 - \alpha^2 \geq 0$$

και άρα

$$x \leq -\alpha \quad \text{ή} \quad x \geq \alpha.$$

Επομένως, τα σημεία της υπερβολής C βρίσκονται έξω από την ταινία των ευθειών $x = -\alpha$ και $x = \alpha$, πράγμα που σημαίνει ότι η υπερβολή αποτελείται από δύο χωριστούς κλάδους.


Ασύμπτωτες Υπερβολής

• Έστω μια υπερβολή C με εξίσωση

$$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1 \quad (1)$$

και μια ευθεία ε με εξίσωση

$$y = \lambda x,$$



δηλαδή μια ευθεία που περνάει από την αρχή των αξόνων.

Η ευθεία ε έχει με την υπερβολή C κοινά σημεία, αν και μόνο αν το σύστημα

$$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1 \quad \text{και} \quad y = \lambda x \quad (1)$$

έχει λύση. Η πρώτη εξίσωση του συστήματος (1), λόγω της δεύτερης, γράφεται διαδοχικά

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{\lambda^2 x^2}{\beta^2} &= 1 \\ \beta^2 x^2 - \lambda^2 \alpha^2 x^2 &= \alpha^2 \beta^2 \\ (\beta^2 - \lambda^2 \alpha^2) x^2 &= \alpha^2 \beta^2. \end{aligned} \quad (2)$$

Έτσι το σύστημα (1) έχει λύση, αν και μόνο αν η (2) έχει λύση, δηλαδή αν και μόνο αν $\beta^2 - \lambda^2 \alpha^2 > 0$ ή, ισοδύναμα, αν και μόνο αν


$$|\lambda| < \frac{\beta}{\alpha}. \quad (3)$$

Επομένως, η ευθεία $y = \lambda x$ έχει με την υπερβολή κοινά σημεία, και μάλιστα δύο, μόνο όταν $|\lambda| < \frac{\beta}{\alpha}$. Άρα, όλα τα σημεία της υπερβολής C θα περιέχονται στις γωνίες των ευθειών

$$y = -\frac{\beta}{\alpha}x \quad \text{και} \quad y = \frac{\beta}{\alpha}x,$$

στις οποίες βρίσκεται ο άξονας $x'x$.

Ας θεωρήσουμε τώρα ένα σημείο $M(x, y)$ της υπερβολής με $x > 0$ και $y > 0$. Αποδεικνύεται ότι όταν το x αυξάνει απεριόριστα, η απόσταση MP του M από την ευθεία $y = \frac{\beta}{\alpha}x$ τείνει προς το μηδέν. Έτσι, το άνω τεταρτημόριο του δεξιού κλάδου της υπερβολής πλησιάζει



όλο και περισσότερο την ευθεία $y = \frac{\beta}{\alpha}x$, χωρίς ποτέ να συμπίπτει με αυτή. Γι' αυτό την ευθεία $y = \frac{\beta}{\alpha}x$ τη λέμε *ασύμπτωτο* του δεξιού κλάδου της υπερβολής. Λόγω συμμετρίας της υπερβολής ως προς τον άξονα $x'x$, ο δεξιός κλάδος της θα έχει ασύμπτωτο και την ευθεία $y = -\frac{\beta}{\alpha}x$, οπότε, λόγω συμμετρίας της υπερβολής και ως προς τον άξονα $y'y$, ο αριστερός κλάδος της θα έχει ασύμπτωτες τις ίδιες ευθείες. Άρα, οι **ασύμπτωτες** της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ είναι οι ευθείες

$$y = \frac{\beta}{\alpha}x, \quad y = -\frac{\beta}{\alpha}x$$


Είναι φανερό ότι οι ασύμπτωτες της υπερβολής είναι οι διαγώνιες του ορθογώνιου $KLMN$ με κορυφές τα σημεία $K(\alpha, \beta)$, $L(\alpha, -\beta)$, $M(-\alpha, -\beta)$ και $N(-\alpha, \beta)$. Το ορθογώνιο αυτό λέγεται **ορθογώνιο βάσης** της υπερβολής. Για παράδειγμα, οι

ασύμπτωτες της υπερβολής $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ είναι οι ευθείες $y = 2x$ και $y = -2x$.

- Αν η υπερβολή C έχει εξίσωση $\frac{y^2}{\alpha^2} - \frac{x^2}{\beta^2} = 1$,

τότε οι ασύμπτωτες της είναι ευθείες:

$$y = \frac{\alpha}{\beta}x \quad \text{και} \quad y = -\frac{\alpha}{\beta}x.$$



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ένας μνημονικός κανόνας για να βρίσκουμε κάθε φορά τις ασύμπτωτες μιας υπερβολής είναι ο εξής:

Παραγοντοποιούμε το πρώτο μέλος της εξίσωσης της υπερβολής και εξισώνουμε κάθε παράγοντα με μηδέν. Για παράδειγμα, έστω η υπερβολή $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$. Επειδή

$$x^2 - \frac{y^2}{4} = \left(x - \frac{y}{2}\right)\left(x + \frac{y}{2}\right).$$

οι ασύμπτωτες της υπερβολής είναι οι ευθείες

$$x - \frac{y}{2} = 0 \quad \text{και} \quad x + \frac{y}{2} = 0,$$

δηλαδή οι

$$y = 2x \quad \text{και} \quad y = -2x.$$

Εκκεντρότητα Υπερβολής


Όπως στην έλλειψη έτσι και στην υπερβολή μία παράμετρος που καθορίζει το σχήμα της είναι η εκκεντρότητα. Ονομάζουμε **εκκεντρότητα** της υπερβολής

$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, και τη συμβολίζουμε με ε , το λόγο $\varepsilon = \frac{\gamma}{\alpha} > 1$. Επειδή $\gamma = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$,

είναι $\varepsilon = \frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}{\alpha}$, οπότε $\varepsilon^2 = 1 + \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^2$ και άρα,

$$\frac{\beta}{\alpha} = \sqrt{\varepsilon^2 - 1}. \quad (1)$$

Επομένως, η εκκεντρότητα ε προσδιορίζει το συντελεστή διεύθυνσης της ασυμπτώτου της, δηλαδή χαρακτηρίζει το ορθογώνιο βάσης, άρα τη μορφή της ίδιας της υπερβολής. Όσο η εκκεντρότητα μικραίνει και τείνει να γίνει ίση με 1, ο λόγος $\frac{\beta}{\alpha}$, άρα και το β , μικραίνει και τείνει να γίνει ίσο με 0. Κατά συνέπεια, όσο πιο μικρή είναι η εκκεντρότητα της υπερβολής τόσο πιο επιμηκες είναι το ορθογώνιο βάσης και κατά συνέπεια τόσο πιο κλειστή είναι η υπερβολή.



Στην περίπτωση της ισοσκελούς υπερβολής είναι $\alpha = \beta$, οπότε $\varepsilon = \sqrt{2}$.


Εφαπτομένη Υπερβολής

- Έστω μια υπερβολή με εξίσωση

$$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1 \quad (1)$$

και ένα σημείο $M_1(x_1, y_1)$ αυτής.

Η **εφαπτομένη** της υπερβολής στο σημείο $M_1(x_1, y_1)$ ορίζεται με τρόπο ανάλογο προς εκείνο με τον οποίο ορίστηκε η εφαπτομένη της έλλειψης και αποδεικνύεται ότι έχει εξίσωση



$$\frac{xx_1}{\alpha^2} - \frac{yy_1}{\beta^2} = 1$$

Έτσι, για παράδειγμα, η εφαπτομένη της υπερβολής $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ στο σημείο $M_1(4, \sqrt{3})$ έχει εξίσωση $\frac{x \cdot 4}{4} - y \cdot \sqrt{3} = 1$, η οποία γράφεται ισοδύναμα $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - \frac{\sqrt{3}}{3}$.

- Αν μια υπερβολή έχει εξίσωση



$$\frac{y^2}{\alpha^2} - \frac{x^2}{\beta^2} = 1,$$

τότε η εφαπτομένη της στο σημείο $M_1(x_1, y_1)$ θα έχει εξίσωση

$$\frac{yy_1}{\alpha^2} - \frac{xx_1}{\beta^2} = 1.$$

- Όπως η έλλειψη έτσι και η υπερβολή έχει ανάλογη ανακλαστική ιδιότητα. Συγκεκριμένα:

Η εφαπτομένη μιας υπερβολής σε ένα σημείο της M διχοτομεί τη γωνία $E'ME$, όπου E', E οι εστίες της υπερβολής.



Επομένως, μια φωτεινή ακτίνα, κατευθυνόμενη προς τη μία εστία της υπερβολής, όταν ανακλάται στην επιφάνεια αυτής, διέρχεται από την άλλη εστία, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η ιδιότητα αυτή της υπερβολής σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ιδιότητες των άλλων κωνικών τομών βρίσκει εφαρμογή στην κατασκευή των ανακλαστικών τηλεσκοπίων, καθώς και στη ναυσιπλοΐα για τον προσδιορισμό του στίγματος των πλοίων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Να αποδειχτεί ότι το γινόμενο των αποστάσεων ενός σημείου $M_1(x_1, y_1)$ της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ από τις ασύμπτωτες είναι σταθερό.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω $M_1(x_1, y_1)$ ένα σημείο της υπερβολής. Τότε θα ισχύει $\frac{x_1^2}{\alpha^2} - \frac{y_1^2}{\beta^2} = 1$ ή, ισοδύναμα,

$$\beta^2 x_1^2 - \alpha^2 y_1^2 = \alpha^2 \beta^2. \quad (1)$$

Οι ασύμπτωτες ε_1 και ε_2 της υπερβολής έχουν εξισώσεις $y = \frac{\beta}{\alpha}x$ και $y = -\frac{\beta}{\alpha}x$, ή ισοδύναμα

$$\beta x - \alpha y = 0 \quad \text{και} \quad \beta x + \alpha y = 0 \quad (2)$$

αντιστοίχως. Επομένως, το γινόμενο των αποστάσεων του M_1 από τις $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ είναι ίσο με

$$\begin{aligned} d(M_1, \varepsilon_1) \cdot d(M_1, \varepsilon_2) &= \frac{|\beta x_1 - \alpha y_1|}{\sqrt{\beta^2 + \alpha^2}} \cdot \frac{|\beta x_1 + \alpha y_1|}{\sqrt{\beta^2 + \alpha^2}} \\ &= \frac{|\beta^2 x_1^2 - \alpha^2 y_1^2|}{\beta^2 + \alpha^2} \\ &\stackrel{(1)}{=} \frac{\alpha^2 \beta^2}{\alpha^2 + \beta^2}, \quad \text{που είναι σταθερό.} \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε την εξίσωση της υπερβολής σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - (i) Όταν έχει εστίες τα σημεία $E'(-13,0)$, $E(13,0)$ και κορυφές τα σημεία $A(5,0)$ και $A'(-5,0)$
 - (ii) Όταν έχει εστίες τα σημεία $E'(0,-10)$, $E(0,10)$ και εκκεντρότητα $\frac{5}{3}$
 - (iii) Όταν έχει εστίες τα σημεία $E'(-\sqrt{5},0)$, $E(\sqrt{5},0)$ και διέρχεται από το σημείο $M(2\sqrt{2},1)$

- (iv) Όταν έχει ασύμπτωτες τις ευθείες $y = \frac{4}{3}x$ και $y = -\frac{4}{3}x$ και διέρχεται από το σημείο $M(3\sqrt{2}, 4)$.
2. Να βρείτε τις εστίες, την εκκεντρότητα και τις ασύμπτωτες της υπερβολής:
- $9x^2 - 16y^2 = 144$,
 - $x^2 - y^2 = 4$,
 - $144x^2 - 25y^2 = 3600$.
3. Να βρείτε την εκκεντρότητα της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, της οποίας η ασύμπτωτη $y = \frac{\beta}{\alpha}x$ σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 30° .
4. Αν η εφαπτομένη της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ στην κορυφή $A(\alpha, 0)$ τέμνει την ασύμπτωτη $y = \frac{\beta}{\alpha}x$ στο σημείο Γ , να αποδείξετε ότι $(OE) = (O\Gamma)$.
5. Έστω η υπερβολή $C: \frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, ε η εφαπτομένη της σε ένα σημείο $M_1(x_1, y_1)$ και ζ η κάθετη της ε στο M_1 . Αν η ε διέρχεται από το σημείο $M_2(0, -\beta)$ και η ζ διέρχεται από το σημείο $M_3(2\alpha\sqrt{2}, 0)$, να αποδείξετε ότι η εκκεντρότητα της υπερβολής είναι ίση με $\sqrt{2}$.
6. Να αποδείξετε ότι κάθε ευθεία που είναι παράλληλη προς μια από τις ασύμπτωτες της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ τέμνει την υπερβολή σε ένα μόνο σημείο. Ποιο είναι το σημείο τομής της ευθείας $2x - y = 1$ και της υπερβολής $4x^2 - y^2 = 1$;
7. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της υπερβολής $x^2 - 4y^2 = 12$ οι οποίες:
- είναι παράλληλες προς την ευθεία $y = x + 1$
 - είναι κάθετες στην ευθεία $y = -\frac{4}{\sqrt{3}}x$
 - διέρχονται από το σημείο $M(3, 0)$

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Αν E_1 είναι η προβολή της εστίας E της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ πάνω στην ασύμπτωτη $y = \frac{\beta}{\alpha}x$, να αποδείξετε ότι
(i) $(OE_1) = \alpha$, (ii) $(EE_1) = \beta$.

2. Έστω ε και ε' οι εφαπτόμενες της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ στις κορυφές της A και A' . Αν Γ και Γ' είναι τα σημεία στα οποία μια τρίτη εφαπτομένη της υπερβολής τέμνει τις ε και ε' , αντιστοίχως, να αποδείξετε ότι
(i) $(A\Gamma)(A'\Gamma') = \beta^2$ και
(ii) ο κύκλος με διάμετρο το $\Gamma\Gamma'$ διέρχεται από τις εστίες της υπερβολής.

3. Έστω $M_1(x_1, y_1)$ και $M_2(x_2, y_2)$ δύο σημεία του δεξιού κλάδου της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$. Αν η ευθεία M_1M_2 τέμνει τις ασύμπτωτες στα σημεία $M_3(x_3, y_3)$ και $M_4(x_4, y_4)$, να αποδείξετε ότι $(M_1M_3) = (M_2M_4)$.

4. Από ένα σημείο $M_1(x_1, y_1)$ της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ φέρνουμε παράλληλες προς τις ασύμπτωτες. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του σχηματιζόμενου παραλληλόγραμμου είναι σταθερό.

5. Να αποδείξετε ότι το συνημίτονο μιας από τις γωνίες των ασυμπτώτων της υπερβολής $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ δίνεται από τον τύπο $\text{συν}\varphi = \frac{2 - \varepsilon^2}{\varepsilon^2}$.

6. Έστω οι υπερβολές

$$C_1 : \frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1 \quad \text{και} \quad C_2 : \frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = \rho^2, \quad \rho > 1.$$

Αν A'_1, A_1 και A'_2, A_2 είναι οι κορυφές των C_1 και C_2 αντιστοίχως, να αποδείξετε ότι από το A_2 δεν άγονται εφαπτόμενες στη C_1 , ενώ από το A_1 άγονται εφαπτόμενες της C_2 .

3.5 Η ΕΞΙΣΩΣΗ $Ax^2 + By^2 + \Gamma x + \Delta y + E = 0$


Μεταφορά Αξόνων

Η εξίσωση ενός κύκλου με ακτίνα ρ έχει την απλή μορφή $x^2 + y^2 = \rho^2$, αν η αρχή του συστήματος συντεταγμένων $O(0,0)$ είναι το κέντρο του κύκλου. Αν όμως το κέντρο του κύκλου δεν είναι η αρχή των αξόνων αλλά το σημείο $O'(x_0, y_0)$, τότε η εξίσωσή του έχει την πιο σύνθετη μορφή $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \rho^2$. Αυτό δείχνει ότι η μορφή της εξίσωσης μιας καμπύλης εξαρτάται από τη σχετική θέση της καμπύλης και των αξόνων.

Ας υποθέσουμε ότι σε ένα επίπεδο έχουμε μια καμπύλη και την εξίσωσή της ως προς ένα σύστημα συντεταγμένων Oxy . Θα αναζητήσουμε την εξίσωση της ίδιας καμπύλης ως προς ένα “νέο” σύστημα συντεταγμένων, του οποίου η αρχή θα είναι το σημείο $O'(x_0, y_0)$ και οι άξονες $X'OX$ και $Y'OY$ θα είναι παράλληλοι και ομόρροποι προς τους άξονες του “παλιού” συστήματος. Λέμε στην περίπτωση αυτή ότι το σύστημα $O'XY$ έχει προκύψει με **παράλληλη μεταφορά των αξόνων** του συστήματος Oxy .

Έστω λοιπόν x και y οι συντεταγμένες ενός σημείου M ως προς το παλιό σύστημα, και X και Y οι συντεταγμένες του ίδιου σημείου ως προς το νέο σύστημα. Έχουμε

$$\begin{aligned}\overline{OM} &= \overline{OO'} + \overline{O'M} \\ (x, y) &= (x_0, y_0) + (X, Y) \\ (x, y) &= (x_0 + X, y_0 + Y).\end{aligned}$$




Επομένως, $x = x_0 + X$ και $y = y_0 + Y$ ή, ισοδύναμα,

$X = x - x_0, \quad Y = y - y_0$

Έτσι για παράδειγμα, αν οι συντεταγμένες ενός σημείου M ως προς ένα καρτεσιανό σύστημα είναι $(4, -3)$ και η αρχή $O(0,0)$ μετακινηθεί με τη μεταφορά των αξόνων στο σημείο $O'(-1, 2)$, τότε οι νέες συντεταγμένες του M είναι $X = 4 - (-1) = 5$ και $Y = -3 - 2 = -5$.

Έστω επίσης η εξίσωση $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$, που παριστάνει κύκλο με κέντρο $K(2, -1)$ και ακτίνα $\rho = 3$. Αν με μια παράλληλη μεταφορά των αξόνων η αρχή $O(0,0)$ μετακινηθεί στο κέντρο του κύκλου, τότε οι καινούριες συντεταγμένες

(X, Y) ενός σημείου M του κύκλου είναι $X = x - 2$ και $Y = y - (-1) = y + 1$. Επομένως η εξίσωση του κύκλου ως προς το νέο σύστημα αξόνων έχει την απλούστερη μορφή $X^2 + Y^2 = 9$.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Να εξεταστεί τι παριστάνει στο επίπεδο καθεμιά από τις εξισώσεις:

(i) $y^2 - 4y - 8x - 4 = 0$

(ii) $9x^2 + 4y^2 - 72x - 24y + 144 = 0$

(iii) $9x^2 - 16y^2 - 36x - 96y - 252 = 0$.

ΛΥΣΗ

(i) Έχουμε διαδοχικά:

$$y^2 - 4y - 8x - 4 = 0 \quad (1)$$

$$y^2 - 4y = 8x + 4$$

$$y^2 - 2 \cdot 2y + 2^2 = 8x + 4 + 2^2$$


$$(y - 2)^2 = 8(x + 1)$$

$$(y - 2)^2 = 2 \cdot 4(x + 1).$$

Αν θέσουμε $x + 1 = X$ και $y - 2 = Y$, δηλαδή αν κάνουμε παράλληλη μεταφορά των αξόνων και τοποθετήσουμε τη νέα αρχή στο σημείο $O'(-1, 2)$, τότε η εξίσωση παίρνει τη μορφή

$$Y^2 = 2 \cdot 4X.$$

Επομένως, η εξίσωση (1) παριστάνει παραβολή με κορυφή το σημείο $O'(-1, 2)$ και άξονα την ευθεία $Y = 0$, δηλαδή την ευθεία $y = 2$.



(ii) Έχουμε διαδοχικά

$$9x^2 + 4y^2 - 72x - 24y + 144 = 0 \quad (1)$$

$$9(x^2 - 8x) + 4(y^2 - 6y) = -144$$

$$9(x^2 - 2 \cdot 4 \cdot x + 4^2) + 4(y^2 - 2 \cdot 3 \cdot y + 3^2) = 9 \cdot 4^2 + 4 \cdot 3^2 - 144$$


$$9(x-4)^2 + 4(y-3)^2 = 36$$

$$\frac{(x-4)^2}{2^2} + \frac{(y-3)^2}{3^2} = 1.$$

Αν θέσουμε $x - 4 = X$ και $y - 3 = Y$, δηλαδή αν κάνουμε παράλληλη μεταφορά των αξόνων και τοποθετήσουμε τη νέα αρχή στο σημείο $O'(4,3)$, τότε η εξίσωση παίρνει τη μορφή

$$\frac{X^2}{2^2} + \frac{Y^2}{3^2} = 1$$

Επομένως, η εξίσωση (1) παριστάνει έλλειψη με κέντρο το σημείο $O'(4,3)$ και με $\alpha = 3$, $\beta = 2$ και $\gamma = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$. Τα άκρα του μεγάλου άξονα ως προς το νέο σύστημα είναι τα σημεία $(X,Y) = (0,3)$ και $(X,Y) = (0,-3)$, οπότε, λόγω των σχέσεων $x - 4 = X$ και $y - 3 = Y$, ως προς το αρχικό σύστημα, είναι τα σημεία $A(4,6)$ και $A'(4,0)$. Ανάλογα βρίσκουμε ότι τα άκρα του μικρού άξονα είναι τα σημεία $B(2,3)$ και $B'(6,3)$. Επίσης, οι εστίες είναι τα σημεία $E(4,3\sqrt{5})$, $E'(4,-3\sqrt{5})$.



(iii) Έχουμε διαδοχικά

$$9x^2 - 16y^2 - 36x - 96y - 252 = 0 \quad (1)$$

$$9(x^2 - 4x) - 16(y^2 + 6y) = 252$$

$$9(x-2)^2 - 16(y+3)^2 = 144$$

$$\frac{(x-2)^2}{4^2} - \frac{(y+3)^2}{3^2} = 1.$$

Αν θέσουμε $x - 2 = X$ και $y + 3 = Y$, δηλαδή αν κάνουμε παράλληλη μεταφορά των αξόνων και τοποθετήσουμε τη νέα αρχή στο σημείο $O'(2, -3)$, τότε η εξίσωση παίρνει τη μορφή

$$\frac{X^2}{4^2} - \frac{Y^2}{3^2} = 1.$$

Επομένως, η εξίσωση (1) παριστάνει υπερβολή με κέντρο το σημείο $O'(2, -3)$. Με ανάλογο τρόπο, όπως στην περίπτωση (ii), βρίσκουμε ότι η υπερβολή αυτή έχει

$$\alpha = 4, \quad \beta = 3, \quad \gamma = 5$$

Άρα, η υπερβολή έχει κορυφές τα σημεία $A(6,-3)$ και $A'(-2,-3)$ και εστίες $E(7, -3)$ και $E'(-3, -3)$.

Γενικά, με κατάλληλη μεταφορά αξόνων, μπορούμε να διαπιστώσουμε αν μια εξίσωση της μορφής $Ax^2 + By^2 + \Gamma x + \Delta y + E = 0$ παριστάνει κωνική τομή και να βρούμε το είδος και τα στοιχεία της.

Σχετική Θέση Ευθείας και Κωνικής

Ας θεωρήσουμε μία ευθεία $y = \lambda x + \beta$ και μία κωνική τομή $Ax^2 + By^2 + \Gamma x + \Delta y + E = 0$.

Η ευθεία ε και η κωνική C έχουν το πολύ δύο κοινά σημεία, αφού το σύστημα

$$\begin{cases} y = \lambda x + \beta & (1) \\ Ax^2 + By^2 + \Gamma x + \Delta y + E = 0 & (2) \end{cases}$$


έχει το πολύ δύο διακεκριμένες λύσεις.

Για την επίλυση του συστήματος θέτουμε στη (2), όπου $y = \lambda x + \beta$, οπότε προκύπτει μια δευτεροβάθμια εξίσωση.

— Αν η εξίσωση αυτή έχει δύο ρίζες άνισες ή μια απλή ρίζα (όταν είναι 1ου βαθμού), τότε η ευθεία και η κωνική τέμνονται.

— Αν η εξίσωση έχει δύο ρίζες ίσες, δηλαδή αν είναι 2ου βαθμού με διακρίνουσα $\Delta = 0$, τότε αποδεικνύεται ότι η ευθεία εφάπτεται της κωνικής.

— Τέλος, αν η εξίσωση δεν έχει ρίζες, τότε η ευθεία και η κωνική δεν έχουν κοινά σημεία.



Για παράδειγμα, έστω η ευθεία $y = 2x$ και η παραβολή $y = x^2 + 1$. Αν στην εξίσωση της παραβολής θέσουμε όπου $y = 2x$, βρίσκουμε τη δευτεροβάθμια εξίσωση $x^2 - 2x + 1 = 0$, η οποία έχει τη διπλή ρίζα $x = 1$. Άρα, η ευθεία εφάπτεται της κωνικής και το σημείο επαφής είναι το $M(1,2)$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να αποδείξετε ότι καθεμιά από τις παρακάτω εξισώσεις παριστάνει παραβολή, για την οποία να βρείτε τις συντεταγμένες της κορυφής και της εστίας:

(i) $y^2 - 8x + 8 = 0$

(ii) $x^2 + 4x - 16y + 4 = 0$

(iii) $y^2 + 4y + 8x - 28 = 0$

(iv) $x^2 - 8x + 6y - 8 = 0$.

2. Να αποδείξετε ότι καθεμιά από τις παρακάτω εξισώσεις παριστάνει έλλειψη, για την οποία να βρείτε τις συντεταγμένες του κέντρου, των κορυφών και των εστιών.

(i) $9x^2 + 25y^2 - 36x - 189 = 0$

(ii) $x^2 + 4x + 16y^2 = 0$

(iii) $4x^2 + 9y^2 - 32x - 36y + 64 = 0$

(iv) $9x^2 + 16y^2 + 54x - 32y - 47 = 0$.

3. Να αποδείξετε ότι καθεμιά από τις παρακάτω εξισώσεις παριστάνει υπερβολή, για την οποία να βρείτε τις συντεταγμένες του κέντρου, των κορυφών και των εστιών:

(i) $21x^2 - 4y^2 + 84x - 32y - 64 = 0$

(ii) $2y^2 - 3x^2 - 8y + 6x - 1 = 0$.

4. Να βρεθεί η τιμή του $\kappa \in \mathbf{R}$, για την οποία η παραβολή $y = x^2 - \kappa x + 2$ εφάπτεται της ευθείας $y = x - 2$.

5. Να βρείτε τις κοινές εφαπτόμενες του κύκλου $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ και της παραβολής $y^2 = 4x$.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Δίνεται η εξίσωση

$$x^2 + y^2 - 2\lambda x - 1 = 0 \quad (1), \quad \text{όπου} \quad \lambda \in \mathbf{R}.$$

- (i) Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή του λ η (1) παριστάνει κύκλο του οποίου ζητείται να βρεθεί το κέντρο και η ακτίνα.
- (ii) Να αποδείξετε ότι όλοι οι κύκλοι C_λ που ορίζονται από την (1) για τις διάφορες τιμές του λ διέρχονται από δύο σταθερά σημεία. Ποια είναι η εξίσωση της κοινής χορδής όλων αυτών των κύκλων;

2. Δίνονται οι κύκλοι $C_1 : x^2 + y^2 = 1$ και $C_2 : (x-2)^2 + y^2 = 2^2$ και η ευθεία $y = \lambda x + \beta$, όπου $\lambda, \beta \in \mathbf{R}$.
- Ποιες είναι οι αποστάσεις των κέντρων των κύκλων C_1 και C_2 από την ευθεία;
 - Για ποιες τιμές των λ και β η ευθεία εφάπτεται και στους δύο κύκλους;
 - Να αποδείξετε ότι οι κοινές εφαπτόμενες των κύκλων C_1 και C_2 τέμνονται πάνω στον άξονα $x'x$ και σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 60° .
3. Μια ευθεία $y = \lambda x + \beta$, με $\lambda \neq 0$, τέμνει την παραβολή $y^2 = 4x$ σε δύο σημεία A και B .
- Να αποδείξετε ότι οι συντεταγμένες του μέσου M του AB είναι $\left(\frac{2-\lambda\beta}{\lambda^2}, \frac{2}{\lambda}\right)$.
 - Να βρείτε την εξίσωση της γραμμής πάνω στην οποία βρίσκεται το M , όταν
 - $\lambda = 1$ και το β μεταβάλλεται
 - $\beta = 0$ και το λ μεταβάλλεται.
4. Δίνεται η έλλειψη $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, με $\alpha > \beta > 0$ και το σημείο $\Sigma(0, 2\beta)$. Μια ευθεία με συντελεστή διεύθυνσης λ διέρχεται από το σημείο Σ και τέμνει τις εφαπτόμενες, στα άκρα του μεγάλου άξονα της έλλειψης, στα σημεία M και M' .
- Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου με διάμετρο MM' συναρτήσει του λ .
 - Για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbf{R}$ ο κύκλος αυτός διέρχεται από τις εστίες της έλλειψης;
5. Δίνεται η έλλειψη $\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$. Να βρείτε την εξίσωση της υπερβολής η οποία έχει τις ίδιες εστίες με την έλλειψη και εφάπτεται στην ευθεία $y = x + 1$.
6. Έστω τα διανύσματα $\overrightarrow{OA_1} = (4, 0)$ και $\overrightarrow{OA_2} = (1, 0)$ του καρτεσιανού επιπέδου. Αν τα διανύσματα αρχίσουν, συγχρόνως, να περιστρέφονται με την ίδια γωνιακή ταχύτητα αλλά με αντίθετη φορά, να αποδείξετε ότι το πέρας M της συνισταμένης τους διαγράφει έλλειψη.
7. Δίνονται οι ημιευθείες $\delta_1 : y = 2x$ και $\delta_2 : y = -2x$, $x \in (0, +\infty)$ και μια ευθεία ε η οποία τις τέμνει στα σημεία M_1 και M_2 αντιστοίχως.
- Να βρείτε τις συντεταγμένες των M_1 και M_2 συναρτήσει των συντεταγμένων του μέσου M του ευθύγραμμου τμήματος M_1M_2 .
 - Να αποδείξετε ότι όταν η ευθεία ε κινείται, έτσι ώστε το τρίγωνο OM_1M_2 να έχει σταθερό εμβαδόν και ίσο με 2, τότε το M κινείται στον ένα κλάδο μίας σταθερής υπερβολής.

8. Δίνονται οι ελλείψεις $C_1 : \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και $C_2 : \alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 = 1$ με $0 < \beta < \alpha$.

Η ημιευθεία $y = (\epsilon\phi\theta)x$, $x > 0$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ τέμνει την C_1 στο σημείο $\Gamma_1(x_1, y_1)$

και την C_2 στο σημείο $\Gamma_2(x_2, y_2)$.

Αν λ_1 είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της C_1 στο σημείο Γ_1 και λ_2 είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της C_2 στο σημείο Γ_2 , να αποδείξετε ότι το γινόμενο $\lambda_1 \lambda_2$ είναι ίσο με $(\epsilon\phi\theta)^{-2}$.

9. Δίνεται η έλλειψη $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$.

(i) Η εφαπτομένη της έλλειψης στο σημείο που η διχοτόμος του πρώτου τεταρτημόριου τέμνει την έλλειψη έχει κλίση $-\frac{1}{2}$. Να βρείτε την εκκεντρότητα της έλλειψης.

(ii) Έστω M το σημείο του πρώτου τεταρτημόριου στο οποίο η ευθεία $y = \lambda x$, $\lambda > 0$ τέμνει την παραπάνω έλλειψη. Αν μ είναι η κλίση της εφαπτομένης της έλλειψης στο σημείο M , τότε να εκφράσετε το γινόμενο $\lambda\mu$ ως συνάρτηση των ημιαξόνων α, β .

10. (i) Δίνονται ένας κύκλος C_1 με κέντρο K και ακτίνα R και μια ευθεία ϵ που δεν έχει κανένα κοινό σημείο με τον κύκλο C_1 . Να αποδείξετε ότι τα κέντρα των κύκλων C , που εφάπτονται της ϵ και του κύκλου C_1 εξωτερικά, ανήκουν σε σταθερή παραβολή.

(ii) Δίνονται δύο κύκλοι C_1 και C_2 , με κέντρα K_1 και K_2 και ακτίνες R_1 και R_2 αντιστοίχως, από τους οποίους ο C_2 είναι εσωτερικός του C_1 . Να αποδείξετε ότι τα κέντρα των κύκλων C , που εφάπτονται εσωτερικά του C_1 και εξωτερικά του C_2 , ανήκουν σε σταθερή έλλειψη.

(iii) Δίνονται δύο κύκλοι C_1 και C_2 , με κέντρα K_1 και K_2 και ακτίνες R_1 και R_2 , αντιστοίχως, που βρίσκονται ο ένας εκτός του άλλου. Να αποδείξετε ότι τα κέντρα του κύκλου C που εφάπτονται εξωτερικά και των δύο κύκλων C_1 και C_2 ανήκουν σε κλάδο σταθερής υπερβολής.

11. Δίνεται η έλλειψη $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ και το σημείο της $M(\alpha \sin\phi, \beta \eta\mu\phi)$.

(i) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της έλλειψης στο σημείο M .

(ii) Να αποδείξετε ότι το γινόμενο των αποστάσεων των εστιών E και E' από την εφαπτομένη είναι σταθερό.

(iii) Για ποια τιμή του ϕ το εμβαδόν του τριγώνου που ορίζει η εφαπτομένη με τους άξονες γίνεται ελάχιστο;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-11 να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση:

1. Ο κύκλος $(x - \alpha)^2 + y^2 = \alpha^2$

- A) εφάπτεται στον x'
- B) διέρχεται από το σημείο $A(0, \alpha)$
- Γ) εφάπτεται στον $y'y$.

2. Η ευθεία $y = x + 1$ και ο κύκλος $x^2 + y^2 = 1$

- A) τέμνονται
- B) εφάπτονται
- Γ) δεν έχουν κοινά σημεία.

3. Έστω οι κύκλοι $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ και $(x - 2)^2 + y^2 = 4$. Το σημείο $M(1, 1)$ είναι

- A) εσωτερικό του ενός κύκλου και εξωτερικό του άλλου
- B) σημείο και των δύο κύκλων
- Γ) εσωτερικό και των δύο κύκλων
- Δ) εξωτερικό και των δύο κύκλων.

4. Έστω ο κύκλος με παραμετρικές εξισώσεις:


$$x = 2\sigma\upsilon\nu\varphi, \quad y = 2\eta\mu\varphi, \quad \text{όπου} \quad \varphi \in [0, 2\pi).$$

Το σημείο $A(1, \sqrt{3})$ είναι

- A) εσωτερικό του κύκλου
- B) εξωτερικό του κύκλου
- Γ) σημείο του κύκλου.

5. Στο διπλανό σχήμα η δ είναι η διευθετούσα και το E είναι η εστία της παραβολής $y^2 = 2px$. Το μήκος της χορδής AB είναι ίσο με:

- A) $AB = \frac{p}{2}$, B) $AB = p$, Γ) $AB = 2p$,
- Δ) $AB = 4p$.




6. Στο διπλανό σχήμα τα σημεία E', E είναι οι

εστίες της έλλειψης $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Το μήκος του BE είναι

- A) μεγαλύτερο του a ,
B) μικρότερο του a ,
Γ) ίσο με a .



7. Στο ίδιο σχήμα αν το τρίγωνο BEE' είναι ισόπλευρο, τότε η εκκεντρότητα της έλλειψης είναι ίση με

- A) $\varepsilon = \frac{1}{2}$, B) $\varepsilon = 2$, Γ) $\varepsilon = 1$, Δ) $\varepsilon = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

8. Αν οι ελλείψεις $\frac{x^2}{6^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$ και $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1$, $\alpha > 2$ είναι όμοιες, τότε

- A) $\alpha = 6$, B) $\alpha = 12$, Γ) $\alpha = 3$, Δ) $\alpha = 4$.

9. Δίνεται η έλλειψη με παραμετρικές εξισώσεις

$$x = 5\sin\varphi \quad \text{και} \quad y = 4\eta\mu\varphi, \quad \varphi \in [0, 2\pi).$$

Το σημείο $M(7,0)$ είναι

- A) εσωτερικό της έλλειψης, B) εξωτερικό της έλλειψης,
Γ) σημείο της έλλειψης.


10. Οι υπερβολές $\frac{x^2}{4^2} - \frac{y^2}{3^2} = 1$ και $\frac{y^2}{3^2} - \frac{x^2}{4^2} = 1$ έχουν

- A) ίδιες ασύμπτωτες και ίδια εκκεντρότητα,
B) διαφορετικές ασύμπτωτες και ίδια εκκεντρότητα,
Γ) ίδιες ασύμπτωτες και διαφορετική εκκεντρότητα,
Δ) διαφορετικές ασύμπτωτες και διαφορετικές εκκεντρότητες.

11. Στο διπλανό σχήμα το $KAMN$ είναι το ορθογώνιο βάσης της υπερβολής

$$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1. \text{ Το μήκος } OK \text{ είναι}$$

- A) μεγαλύτερο του γ
B) ίσο με γ
Γ) μικρότερο του γ .



12. Έστω ο κύκλος $(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 = \rho^2$, $\alpha, \beta, \rho > 0$. Να συνδέσετε με μια γραμμή τα δεδομένα της πρώτης στήλης με τα αντίστοιχά τους στη δεύτερη στήλη

Ο κύκλος διέρχεται από την αρχή των αξόνων	$\alpha = \beta = \rho$
Ο κύκλος έχει το κέντρο του στον άξονα $x'x$	$\alpha = 0$
Ο κύκλος έχει το κέντρο του στον άξονα $y'y$	$\alpha^2 + \beta^2 = \rho^2$
Ο κύκλος εφάπτεται στον άξονα $x'x$	$\beta = 0$
Ο κύκλος εφάπτεται στον άξονα $y'y$	$\alpha = \beta \neq \rho$
Ο κύκλος εφάπτεται και στους δύο άξονες.	$\rho = \alpha$
	$\rho = \beta$
	$\alpha = \beta = 0$

13. Να συνδέσετε με μια γραμμή τα δεδομένα της πρώτης στήλης με τα αντίστοιχά τους στη δεύτερη στήλη

<u>Εξίσωση</u>	<u>Κωνική</u>
$9x^2 - y^2 = 0$	Έλλειψη
$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 6 = 0$	Υπερβολή
$y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$	Παραβολή
$4x^2 + y^2 - 8x + 2y + 4 = 0$	Ζεύγος Ευθειών
$x^2 - y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$	Κύκλος

14. Να συνδέσετε με μια γραμμή τα δεδομένα της πρώτης στήλης με τα αντίστοιχά τους στη δεύτερη στήλη

<u>Εκκεντρότητα</u>	<u>Κωνική</u>
$\frac{\sqrt{2}}{2}$	Κύκλος
0	Ισοσκελής υπερβολή
$\frac{4}{5}$	Υπερβολή
$\frac{5}{4}$	Έλλειψη
$\sqrt{2}$	